



Cursus Intégré  
2004-2005

Rappels de statistique mathématique  
*Énoncé et corrigé des travaux dirigés n° 1 à*  
*8*

Guillaume Lacôte

 Bureau **E03**

✉ [Guillaume.Lacote@ensae.fr](mailto:Guillaume.Lacote@ensae.fr)

☞ <http://ensae.no-ip.com/SE222/>

---

# Table des matières

<b>1 Travaux Dirigés n°1</b>	<b>1</b>
Exercice 1 . . . . .	1
Exercice 2 . . . . .	3
Exercice 3 . . . . .	6
Exercice 4 . . . . .	8
<b>2 Travaux Dirigés n°2</b>	<b>12</b>
Exercice 1 . . . . .	12
Exercice 2 . . . . .	16
Exercice 3 . . . . .	20
Exercice 4 . . . . .	28
<b>3 Travaux Dirigés n°3</b>	<b>32</b>
Exercice 1 . . . . .	32
Exercice 2 . . . . .	36
Exercice 3 . . . . .	42
<b>4 Travaux Dirigés n°4</b>	<b>45</b>
Exercice 1 . . . . .	45
Exercice 2 . . . . .	47
Exercice 3 . . . . .	50
<b>5 Travaux Dirigés n°5</b>	<b>54</b>
Exercice 1 . . . . .	54
Exercice 2 . . . . .	61
Exercice 3 . . . . .	68
<b>6 Travaux Dirigés n°6</b>	<b>77</b>
Exercice 1 . . . . .	77
Exercice 2 . . . . .	87
Exercice 3 . . . . .	94
<b>7 Travaux Dirigés n°7</b>	<b>99</b>
Exercice 1 . . . . .	99
Exercice 2 . . . . .	102
Exercice 3 . . . . .	105
Exercice 4 . . . . .	109

<b>8 Travaux Dirigés n°8</b>	<b>117</b>
Exercice 1 . . . . .	117
Exercice 2 . . . . .	118
Exercice 3 . . . . .	122
Exercice 4 . . . . .	126
Exercice 5 . . . . .	131

# 1 Travaux Dirigés n°1

## Énoncé de l'exercice 1

On dispose d'observations  $Y_i$  relatives au comportement de remboursement ou de non-remboursement d'emprunteurs :

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si l'emprunteur } i \text{ rembourse son crédit} \\ 0 & \text{si l'emprunteur } i \text{ est défaillant} \end{cases}$$

Afin de modéliser ce phénomène, on suppose l'existence d'une variable aléatoire  $Y_i^*$  normale, d'espérance  $m$  et de variance  $\sigma^2$ , qu'on appellera "capacité de remboursement de l'individu  $i$ ", telle que :

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si } Y_i^* \geq 0 \\ 0 & \text{si } Y_i^* < 0 \end{cases}$$

☞ Q1 On note  $\Phi$  la fonction de répartition de la loi  $\mathcal{N}(0, 1)$ .

Exprimer la loi de  $Y_i$  en fonction de  $\Phi$ .

☞ Q2 Les paramètres  $m$  et  $\sigma^2$  sont-ils identifiables ?

## Corrigé de l'exercice 1

☞ Q1 Par définition  $Y_i^* \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ ,  
donc  $\frac{Y_i^* - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$   
et par suite

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y_i^* \geq 0) &= \mathbb{P}\left(\frac{Y_i^* - m}{\sigma} \geq -\frac{m}{\sigma}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(-\frac{m}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{m}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

puisque la distribution de la loi normale est symétrique. Ainsi

$$Y_i \sim \mathcal{B}\left(1, \Phi\left(\frac{m}{\sigma}\right)\right)$$

☞ Q2 Le couple  $(m, \sigma^2)$  n'est clairement pas identifiable, car

$$\mathcal{B}\left(1, \Phi\left(\frac{m}{\sigma}\right)\right) = \mathcal{B}\left(1, \Phi\left(\frac{2m}{2\sigma}\right)\right)$$

En revanche, le rapport  $\frac{m}{\sigma}$  l'est (en vertu du théorème de factorisation).

★  
★ ★

## Enoncé de l'exercice 2

Un système  $S$  fonctionne en utilisant deux machines de types différents. Les durées de vie  $X_1$  et  $X_2$  des deux machines suivent des lois exponentielles de paramètres  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$ . Les variables aléatoires  $X_1$  et  $X_2$  sont supposées indépendantes.

☞ Q1 Montrer que

$$X \sim \mathcal{E}(\lambda) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(X > x) = \exp(-\lambda x)$$

☞ Q2 Calculer la probabilité pour que le système ne tombe pas en panne avant la date  $t$ .  
En déduire la loi de la durée de vie  $Z$  du système.

Calculer la probabilité pour que la panne du système soit due à une défaillance de la machine 1.

☞ Q3 On dispose de  $n$  systèmes  $S_1, \dots, S_n$  identiques dont on observe les durées de vie  $Z_1, \dots, Z_n$ .

(a) Ecrire le modèle statistique correspondant et la vraisemblance des observations.

A-t-on suffisamment d'information pour estimer  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  ?

(b) Si on observe à la fois les durées de vie des systèmes et la cause de la défaillance (machine 1 ou 2), écrire le modèle statistique correspondant et la vraisemblance des observations.

A-t-on alors suffisamment d'information pour estimer  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  ?

☞ Q4 Dans cette question, on considère un seul système  $S$  utilisant une machine de type 1 et une machine de type 2, mais on suppose que l'on dispose d'un stock de  $n_1$  machines de type 1, de durées de vie  $X_1^1, \dots, X_1^{n_1}$ , et d'un stock de  $n_2$  machines de type 2, de durées de vie  $X_2^1, \dots, X_2^{n_2}$ . Quand une machine tombe en panne, on la remplace par une machine du même type, tant que le stock de machines de ce type n'est pas épuisé. Quand cela arrive, on dit que le système  $S$  lui-même est en panne. On note toujours  $Z$  la durée de vie du système.

Le cas  $n_1 = n_2 = 0$  correspond donc à la première question (pas de stock).

(a) Donner la loi de la somme de  $n$  variables indépendantes qui suivent une loi exponentielle de même paramètre  $\lambda$ .

(b) Ecrire  $Z$  en fonction des  $X_j^i$  et en déduire  $P(Z \geq t)$  en fonction de certaines lois gamma, dont on précisera les paramètres.

On note alors  $N$  le nombre de machines (des deux types) sorties du stocks quand le système tombe en panne, et  $Z_0$  la durée écoulée avant la première panne d'une machine. On note  $Z_i$  la durée écoulée entre la  $i$ -ème panne et la  $(i + 1)$ -ème panne. La durée de vie totale du système est donc :

$$Z = \sum_{i=0}^N Z_i$$

La  $(N + 1)$ -ème panne est donc la panne fatale au système.

(c) Montrer que les variables  $Z_i$  sont i.i.d. et donner leur loi.

On pourra utiliser (après l'avoir démontré) le résultat suivant :

Si  $X$  est une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre  $\lambda$ , alors

$$\mathbb{P}(X \geq s + t | X \geq s) = \mathbb{P}(X \geq t) = e^{-\lambda t}$$

(on dit que  $X$  est "sans mémoire").

- (d) Préciser l'ensemble des valeurs possibles pour la variable  $N$  et en donner la loi.
- (e) On admet que  $N$  et les  $Z_i$  sont indépendantes. Calculer  $\mathbb{E}(Z|N)$  en fonction de  $N, \lambda_1$  et  $\lambda_2$ .  
Donner l'expression de  $\mathbb{E}(Z)$  en fonction de  $\mathbb{E}(N), \lambda_1$  et  $\lambda_2$ .
- 

## Corrigé de l'exercice 2

☞ Q1 – Si  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ , alors  $\forall x > 0, \mathbb{P}(X > x) = \int_x^{+\infty} \lambda \exp(-\lambda t) dt = e^{-\lambda x}$

– La réciproque s'obtient par dérivation de l'égalité précédente :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \text{ existe et vaut } \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{\mathbb{R}^+}(x),$$

donc toute variable aléatoire réelle vérifiant l'inégalité précédente admet une densité qui est celle de  $\mathcal{E}(\lambda)$ .

☞ Q2 – On a successivement

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z > t) &= \mathbb{P}(X_1 > t \wedge X_2 > t) \quad \text{par définition de } Z \\ &= \mathbb{P}(X_1 > t) \mathbb{P}(X_2 > t) \quad \text{par indépendance} \\ &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} \end{aligned}$$

Donc  $Z$  suit une loi  $\mathcal{E}(\lambda_1 + \lambda_2)$ .

– Par définition

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_2 > X_1) &= \int \int \mathbf{1}_{(v > u)} \cdot \lambda_1 e^{-\lambda_1 u} \lambda_2 e^{-\lambda_2 v} du dv \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda_2 t} \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} dt \\ &= \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \end{aligned}$$

☞ Q3 (a) Il s'agit de  $n$  observations i.i.d de loi  $\mathcal{E}(\lambda_1 + \lambda_2)$ .

Modèle :  $\{\mathbb{R}^{+n}, \mathcal{E}(\lambda_1 + \lambda_2)^{\otimes n}, (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^{+2}\}$

Vraisemblance :  $L_n = (\lambda_1 + \lambda_2)^n e^{-(\lambda_1 + \lambda_2) \sum Z_i}$

Bien entendu seule la somme  $(\lambda_1 + \lambda_2)$  est identifiable.

(b) Cette fois, on dispose de la variable supplémentaire  $S_i = \mathbb{1}_{(X_2 > X_1)}$ . Alors

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z > t | S_i = 1) &= \mathbb{P}(X_2 > X_1 > t) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{(u > v > t)} \lambda_1 e^{-\lambda_1 u} \lambda_2 e^{-\lambda_2 v} du dv \\ &= \int_t^{+\infty} \left( \int_v^{+\infty} \lambda_1 e^{-\lambda_1 u} du \right) \lambda_2 e^{-\lambda_2 v} dv \\ &= \int_t^{+\infty} (e^{-\lambda_1 v}) \lambda_2 e^{-\lambda_2 v} dv \\ &= \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \exp(-(\lambda_1 + \lambda_2)t) \end{aligned}$$

De même,  $\mathbb{P}(Z > t | S_i = 0) = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \exp(-(\lambda_1 + \lambda_2)t)$

Les densités correspondantes s'en déduisent (au signe près) par dérivation selon  $t$  :

$$\begin{aligned} L_n &= \prod_{s_i=1} \{\lambda_1 e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)z_i}\} \prod_{s_i=0} \{\lambda_2 e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)z_i}\} \\ &= \lambda_1^{n_1} \lambda_2^{n_2} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2) \sum_{i=1}^n z_i} \end{aligned}$$

où  $n_1 = |\{i / s_i = 1\}|$  et  $n_2 = |\{i / s_i = 0\}| = n - n_1$ .

Le couple  $(\lambda_1, \lambda_2)$  est donc identifiable, et on peut donc envisager d'estimer à la fois  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$ .

☞ Q4 (a) La loi  $\Gamma(k, \lambda)$  admet pour densité  $f(x) = \frac{\lambda^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{x>0}$ .

En particulier, toute loi  $\mathcal{E}(\lambda)$  est une loi  $\Gamma(1, \lambda)$ .

On a en outre : la somme de deux variables indépendantes de lois  $\Gamma(k, \lambda)$  et  $\Gamma(l, \lambda)$  suit une loi  $\Gamma(k+l, \lambda)$ .

Cette propriété se prouve par récurrence sur  $k$  :<sup>1</sup>

soit  $U \sim \Gamma(k, \lambda)$  et  $V \sim \Gamma(1, \lambda)$ ; alors  $W = U + V$  a pour densité :

$$\begin{aligned} f_W(w) &= \int_{u+v=w} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} u^{k-1} e^{-\lambda u} \lambda e^{-\lambda v} du dv \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} u^{k-1} e^{-\lambda u} \lambda e^{-\lambda(w-u)} du \\ &= \frac{\lambda^{k+1}}{(k-1)!} e^{-\lambda w} \int_0^{+\infty} u^{k-1} du = \frac{\lambda^{k+1}}{k!} e^{-\lambda w} \end{aligned}$$

de sorte que  $W \sim \Gamma(k+1, \lambda)$ .

Ainsi la somme de  $n \geq 1$  variables indépendantes qui suivent une loi exponentielle de même paramètre  $\lambda$  suit une loi  $\Gamma(n, \lambda)$ .

<sup>1</sup>Elle se montre aussi à l'aide des fonctions caractéristiques.

- (b) On a  $Z = \min\left(\sum_{i=0}^{n_1} X_1^i, \sum_{j=0}^{n_2} X_2^j\right)$  où  $(\sum_{i=0}^{n_1} X_1^i) \sim \Gamma(n_1 + 1, \lambda_1)$  et  $(\sum_{i=0}^{n_2} X_2^i) \sim \Gamma(n_2 + 1, \lambda_2)$ .

Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z \geq t) &= \mathbb{P}\left(\left(\sum_{i=0}^{n_1} X_1^i \geq t\right) \text{ et } \left(\sum_{i=0}^{n_2} X_2^i \geq t\right)\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\sum_{i=0}^{n_1} X_1^i \geq t\right) \times \mathbb{P}\left(\sum_{i=0}^{n_2} X_2^i \geq t\right) \quad \text{par indépendance} \\ &= \left(\int_t^{+\infty} \frac{\lambda_1}{n_1!} e^{-\lambda_1 x} (\lambda_1 x)^{n_1} dx\right) \times \left(\int_t^{+\infty} \frac{\lambda_2}{n_2!} e^{-\lambda_2 x} (\lambda_2 x)^{n_2} dx\right) \end{aligned}$$

- (c) Si  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ , alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \geq s + t | X \geq t) &= \frac{\mathbb{P}(X \geq s + t)}{\mathbb{P}(X \geq t)} \\ &= \frac{\exp(-\lambda(s + t))}{\exp(-\lambda t)} \\ &= e^{-\lambda s} \\ &= \mathbb{P}(X \geq s) \end{aligned}$$

Cette propriété caractérise la loi exponentielle.

En l'occurrence,  $Z_0 = \min(X_1^0, X_2^0) \sim \mathcal{E}(\lambda_1 + \lambda_2)$

Supposons que la première panne ait lieu au temps  $t$  (donc  $Z_0 = t$ ) ; supposons (sans perte de généralité) qu'elle touche une machine de type 1. On a alors :

$$(Z_1 | Z_0 = t \wedge S_0 = 1) = (\min(X_1^1, X_2^0) | X_2^0 > t)$$

où  $X_1^1$  désigne le temps de fonctionnement d'une nouvelle machine de type 1 (et suit donc une  $\mathcal{E}(\lambda_1)$ ), et  $X_2^0$  désigne le temps jusqu'à la première panne de l'"ancienne" machine de type 2.

Or  $(X_2^0 | X_2^0 > t)$  suit une loi  $\mathcal{E}(\lambda_2)$  (la loi exponentielle est "sans mémoire"), et on a a nouveau

$$(Z_1 | Z_0 = t \wedge S_0 = 1) \sim \mathcal{E}(\lambda_1 + \lambda_2)$$

Un raisonnement similaire dans le cas d'une panne de type 2 montre que la loi de  $Z_1$  est indépendante de  $Z_0$  et  $S_0$  :

$$Z_i \sim \mathcal{E}(\lambda_1 + \lambda_2) (i.i.d)$$

- (d) *Remarque* : Attention à la convention de l'exercice : il y a  $(n_1 + 1)$  machines de type 1 :  $n_1$  sont en stock, et une est déjà présente dans le système. Il y a donc panne générale quand le stock est épuisé pour un type de machine, **et qu'en plus la dernière machine du même type tombe en panne.**

On a  $\min(n_1, n_2) \leq N \leq n_1 + n_2 - 1$ . En outre  $N$  ne peut prendre la valeur  $k \in \llbracket \min(n_1, n_2, n_1 + n_2 - 1) \rrbracket$  que dans deux cas :



– les  $n_1$  machines de types 1 sont sorties du stock,  $(k - n_1)$  machines de type 2 sont sorties du stock, et la dernière machine de type 1 tombe en panne (rappelons qu'il y a  $(n_1 + 1)$  machines de type 1).

– cas symétrique en échangeant type 1 et type 2.

Notons  $p_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$  et  $p_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$ . Une nouvelle panne a une probabilité  $p_1$  de concerner une machine de type 1,  $p_2$  de type 2.

On a alors

$$\forall k \geq n_1, n_2, \quad \mathbb{P}(N = k) = p_1 C_k^{n_1} p_1^{n_1} p_2^{k-n_1} + p_2 C_k^{n_2} p_2^{n_2} p_1^{k-n_2}$$

Ainsi, si par exemple  $n_1 \leq k < n_2$ , on a  $\mathbb{P}(N = k) = p_1 C_k^{n_1} p_1^{n_1} p_2^{k-n_1}$ .

(e) On a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Z|N = n) &= \mathbb{E}\left(\sum_{i=0}^n Z_i\right) \\ &= (n+1)\mathbb{E}(Z_1) \\ &= \frac{n+1}{\lambda_1 + \lambda_2} \end{aligned}$$

Or  $\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(Z|N))$ , donc finalement

$$\mathbb{E}(Z) = \frac{\mathbb{E}(N) + 1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

\*  
\* \*

### Énoncé de l'exercice 3

Ecrire la vraisemblance et déterminer une statistique exhaustive pour un échantillon de  $n$  observations i.i.d. de lois :

⇒ Q1 loi de Poisson de paramètre  $\lambda$  :

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}^*$$

⇒ Q2 loi de Pareto de paramètres  $\alpha$  et  $\theta$  avec  $\alpha > 1$ ,  $\theta > 0$  de densité :

$$f(x) = \frac{\alpha - 1}{\theta} \left(\frac{\theta}{x}\right)^\alpha \mathbb{1}_{[\theta; +\infty[}(x)$$

⇒ Q3 loi de Weibull de paramètre  $\alpha$  et  $\theta$  avec  $\alpha > 0$ ,  $\theta > 0$  de densité :

$$f(x) = \alpha \theta x^{\alpha-1} e^{-\theta x^\alpha} \mathbb{1}_{[0; +\infty[}(x)$$

⇒ Q4 loi uniforme sur  $[0, \theta]$  avec  $\theta > 0$  inconnu.

### Corrigé de l'exercice 3

⇒ Q1 Rappel : la statistique  $T$  est dite *exhaustive ssi* la loi conditionnelle  $\mathbb{P}_\theta(X \in \cdot | T(X))$  est indépendante de  $\theta$ .

Théorème de factorisation :  $T$  est exhaustive ssi

$$\exists g_\theta, h : (\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}) / \forall x \in \mathbb{R}, p_\theta(x) = g_\theta(T(x)) h(x)$$

où  $g_\theta$  dépend de  $\theta$  mais pas  $h$ .

On retrouve les statistiques exhaustives en écrivant la vraisemblance du modèle et en appliquant le théorème de factorisation.

Dans le cas présent le paramètre du modèle est  $\theta \in \Theta = \mathbb{R}$ . On a pour  $x \in \mathbb{R}^n$

$$L_n(x) = e^{-n\lambda} \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!}$$

D'où une statistique exhaustive :  $S(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i$ .

⇒ Q2 Le paramètre du modèle étant  $(\alpha, \theta) \in \Theta = \mathbb{R}^2$ , on a

$$L_n(x) = \left(\frac{\alpha - 1}{\theta}\right)^n \frac{\theta^{n\alpha}}{\exp(\alpha \sum_{i=1}^n \log(x_i))} \mathbb{1}_{[\theta, +\infty]}(\min x_i)$$

D'où **une** statistique exhaustive :

$$S(x_1, \dots, x_n) = \left( \sum_{i=1}^n \log(x_i), \min x_i \right)$$

⇒ Q3 Cette fois le paramètre du modèle est  $(\alpha, \theta) \in \Theta = \mathbb{R}^{+*2}$ . On a

$$L_n(x) = \alpha^n \theta^n \left( \prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1} \exp\left(-\theta \sum_{i=1}^n x_i^\alpha\right) \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(\min_i x_i)$$

Dans ce cas, on ne peut exhiber de statistique exhaustive autre que  $T(X_1, \dots, X_n) = (X_1, \dots, X_n)$ . En revanche, si on estimait uniquement  $\theta$  ( $\alpha$  constante connue), alors  $T(x) = \sum_{i=1}^n x_i^\alpha$  serait une statistique exhaustive.

☞ Q4 La densité<sup>2</sup> de la loi  $\mathcal{U}_{[0,\theta]}$  est

$$f_{\mathcal{U}_{[0,\theta]}}(x) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{x \geq 0} \mathbb{1}_{x \leq \theta}$$

et on a donc

$$\begin{aligned} L_n(x_1, \dots, x_n) &= \frac{1}{\theta^n} \mathbb{1}_{x_1, \dots, x_n \geq 0} \mathbb{1}_{x_1, \dots, x_n \leq \theta} \\ &= \frac{1}{\theta^n} \mathbb{1}_{\min x_i \geq 0} \mathbb{1}_{\max x_i \leq \theta} \end{aligned}$$

et une statistique exhaustive est donc  $T(x) = \max_{i \in [1, n]} x_i$

★  
★ ★

### Énoncé de l'exercice 4

On veut compter le nombre  $\theta$  de poissons dans un lac fermé. Pour cela, on tire un poisson au hasard, on le marque et on le remet dans le lac. On tire un second poisson. S'il est déjà marqué, on en prend note et on le remet dans le lac. Sinon, on le marque à son tour et on le remet dans le lac. Et ainsi de suite.

On tire  $n$  poissons selon la procédure ci-dessus. Au  $n$ -ième tirage, l'observation consiste en une variable aléatoire  $Y_n$  qui vaut 1 si le poisson est déjà marqué, 0 sinon. Par définition, on a  $Y_1 = 0$ . Le but de l'exercice est de montrer que :

$$R_n = \sum_{i=1}^n Y_i$$

est une statistique exhaustive pour  $\theta$ .

☞ Q1 Montrer que :

$$\mathbb{P}(Y_n = y_n, \dots, Y_1 = y_1) = \begin{cases} \mathbb{P}(Y_n = y_n | Y_{n-1} = y_{n-1}, \dots, Y_1 = y_1) \\ \times \mathbb{P}(Y_{n-1} = y_{n-1} | Y_{n-2} = y_{n-2}, \dots, Y_1 = y_1) \\ \vdots \\ \times \mathbb{P}(Y_1 = y_1) \end{cases}$$

<sup>2</sup>En toute rigueur le modèle  $(\mathcal{U}_{[0,\theta]})_{\theta \in \mathbb{R}^{+*}}$  n'est pas dominé (il n'y a pas une unique mesure  $\mu$  qui domine toutes les probabilités  $\mathcal{U}_{[0,\theta]}$ ).

Mais pour tout  $M > 0$ , le sous-modèle  $(\mathcal{U}_{[0,\theta]})_{\theta \in ]0, M]}$  est dominé (par la mesure particulière qu'est la probabilité de  $\mathcal{U}_{[0, M]}$ ). On exhibe donc ici une statistique  $T(X)$  qui est exhaustive pour tout sous-modèle : elle est donc telle que

$$\forall M, \forall \theta \in ]0, M], \text{ la loi de } X|T(X) \text{ ne dépend pas de } \theta$$

et donc

$$\forall \theta > 0, \text{ la loi de } X|T(X) \text{ ne dépend pas de } \theta$$

et donc  $T(X)$  est bien exhaustive dans le modèle originel.

☞ Q2 Montrer que la loi conditionnelle de  $Y_n$  sachant  $R_{n-1} = r_{n-1}$  est une Bernoulli de paramètre :

$$\frac{n - r_{n-1} - 1}{\theta}$$

et en déduire que la vraisemblance est proportionnelle à :

$$\prod_{i=1}^n \frac{(\theta - i + 1 + r_{i-1})^{1-y_i}}{\theta} \quad (1)$$

☞ Q3 Montrer que l'expression (1) se réécrit :

$$\frac{1}{\theta^n} \frac{(\theta - 1)!}{(\theta - n - 1 + r_n)!}$$

☞ Q4 En déduire que  $R_n$  est une statistique exhaustive pour  $\theta$ .

## Corrigé de l'exercice 4

☞ Q1 On applique  $n - 1$  fois la *formule du conditionnement*  $\mathbb{P}(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = \mathbb{P}(\mathcal{A}|\mathcal{B})\mathbb{P}(\mathcal{B})$  :

Ici :

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(Y_n = y_n, \dots, Y_1 = y_1) \\ &= \mathbb{P}(Y_n = y_n | Y_{n-1} = y_{n-1}, \dots, Y_1 = y_1) \times \mathbb{P}(Y_{n-1} = y_{n-1}, \dots, Y_1 = y_1) \\ & \vdots \quad (\text{par récurrence}) \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} \mathbb{P}(Y_n = y_n | Y_{n-1} = y_{n-1}, \dots, Y_1 = y_1) \\ \times \mathbb{P}(Y_{n-1} = y_{n-1} | Y_{n-2} = y_{n-2}, \dots, Y_1 = y_1) \\ \vdots \\ \times \mathbb{P}(Y_1 = y_1) \end{cases}$$

☞ Q2 Soit  $p$  le nombre de poissons distincts qui ont été tirés au cours des  $n$  premiers tirages. Supposons que  $R_n = r_n$  : il y a eu  $r_n$  retirages d'un poisson déjà tiré au moins une fois, donc  $p + r_n = n$ . Ainsi après  $n - 1$  tirages le nombre de poissons distincts tirés est  $n - 1 - r_{n-1}$ , et la proportion de poissons qui ont été tirés (et sont donc marqués) est

$$\boxed{\frac{n-1-r_{n-1}}{\theta}}$$

Par conséquent

$$\mathbb{P}(Y_n = y_n | R_{n-1} = r_{n-1}) = \left( \frac{n-1-r_{n-1}}{\theta} \right)^{y_n} \left( 1 - \frac{n-1-r_{n-1}}{\theta} \right)^{1-y_n}$$

Donc d'après le résultat précédent la vraisemblance s'écrit

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(Y_1 = y_1, \dots, Y_n = y_n; \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(Y_i = y_i | Y_{i-1} = y_{i-1}, \dots, Y_1 = y_1) \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(Y_i = y_i | R_{i-1} = r_{i-1}, Y_{i-1} = (r_{i-1} - y_{i-1} - \dots - y_1), Y_{i-2} = y_{i-2}, \dots, Y_1 = y_1) \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(Y_i = y_i | R_{i-1} = r_{i-1}) \quad \text{car la loi de } Y_i | R_{i-1}, Y_{i-1}, \dots, Y_1 \text{ ne dépend pas de } Y_1, \dots, Y_{i-1} \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(Y_i = y_i | Y_{i-1} = y_{i-1}, \dots, Y_1 = y_1) \\ &= \prod_{i=1}^n \left( \left( \frac{i-1-r_{i-1}}{\theta} \right)^{y_i} \left( \frac{\theta-i+1+r_{i-1}}{\theta} \right)^{1-y_i} \right) \\ &= \prod_{i=1}^n \left( \frac{1}{\theta} (i-1-r_{i-1})^{y_i} (\theta-i+1+r_{i-1})^{1-y_i} \right) \end{aligned}$$

qui est proportionnel à

$$\prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} (\theta - i + 1 + r_{i-1})^{1-y_i}$$

par le facteur  $\prod_{i=1}^n (i-1-r_{i-1})^{y_i}$  qui ne dépend pas de  $\theta$  et n'a donc pas d'incidence sur la détermination d'une statistique exhaustive (d'après le théorème de factorisation).<sup>3</sup>

☞ Q3 On a successivement

$$\prod_{i=1}^n \frac{(\theta - i + 1 + r_{i-1})^{1-y_i}}{\theta} = \frac{1}{\theta^n} \prod_{i=1}^n (\theta - (i-1-r_{i-1}))^{1-y_i}$$

<sup>3</sup>Ce facteur aurait bien entendu une influence pour le calcul de l'information de Fisher ou du maximum de vraisemblance.

$$\begin{aligned}
 \text{Or } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (y_i = 1) : (\theta - (i - 1 - r_{i-1}))^{1-y_i} &= 1, \text{ donc} \\
 &= \frac{1}{\theta^n} \times \prod_{\left\{ \begin{array}{l} 1 \leq i \leq n \\ y_i = 1 \end{array} \right\}} 1 \times \prod_{\left\{ \begin{array}{l} 1 \leq i \leq n \\ y_i = 0 \end{array} \right\}} (\theta - (i - 1 - r_{i-1})) \\
 &= \frac{1}{\theta^n} \prod_{\left\{ \begin{array}{l} 1 \leq i \leq n \\ j_i = i - 1 - r_{i-1} \\ y_i = 0 \end{array} \right\}} (\theta - j_i)
 \end{aligned}$$

Or  $\phi : i \mapsto i - 1 - r_{i-1}$  associe au nombre de tirages le nombre de poissons distincts tirés. Donc restreinte à  $\mathcal{I}_0 = \{i \leq n / y_i = 0\}$  (l'ensemble des  $i$  tels que le  $i$ -ième poisson tiré est un nouveau poisson pas encore marqué), c'est une bijection de  $\mathcal{I}_0$  sur  $\llbracket \phi(1), \phi(i_0) \rrbracket$  où  $i_0 = \max \mathcal{I}_0$ . Donc

$$\prod_{\left\{ \begin{array}{l} 1 \leq i \leq n \\ j_i = i - 1 - r_{i-1} \\ y_i = 0 \end{array} \right\}} (\theta - j_i) = \prod_{1 \leq j \leq \phi(i_0)} (\theta - j)$$

Remarquons enfin que par définition de  $i_0$ ,  $\forall j > i_0, j \notin \mathcal{I}_0$  et donc  $y_j = 1$  de sorte que

$$\phi(i_0) = i_0 - 1 - r_{i_0} = (i_0 + (j - i_0)) - 1 - (r_{i_0} + (j - i_0)) = j - 1 - r_{i_0+(j-i_0)} = j - 1 - r_j$$

de sorte que  $\phi(i_0) = n - 1 - r_n$  et en définitive la vraisemblance est proportionnelle à

$$\frac{1}{\theta^n} \prod_{1 \leq j \leq n-1-r_n} (\theta - j) = \boxed{\frac{1}{\theta^n} \frac{(\theta-1)!}{(\theta-n-1+r_n)!}}$$

☞ Q4 On a alors

$$l(y, \theta) = g_\theta(R_n(y)) \times h(y)$$

où

$$h(y) = \prod_{i=1}^n (i - 1 - R_{i-1}(y))^{y_i}$$

qui est indépendant de  $\theta$ , et

$$g_\theta(R_n(y)) = \frac{1}{\theta^n} \frac{(\theta - 1)!}{(\theta - n - 1 + R_n(y))!}$$

qui ne dépend de  $y$  qu'au travers de  $R_n(y)$ .

Donc d'après le théorème de factorisation  $R_n$  est une statistique exhaustive. Ainsi pour estimer le nombre de poissons dans le lac, la connaissance de tous les tirages est superflue et le seul nombre total de poissons tirés plus d'une fois suffit.

\*  
\* \*

## 2 Travaux Dirigés n°2

### Énoncé de l'exercice 1

On considère  $n$  systèmes dont les durées de vie  $X_1, \dots, X_n$  suivent indépendamment une même loi de densité  $f$ . On observe uniquement les durées de vie  $Y_1, \dots, Y_r$  des  $r$  premiers systèmes tombant en panne.

☞ Q1 Écrire la loi du  $r$ -uplet  $(Y_1, \dots, Y_r)$ , puis celle de la variable  $Y_r$ .

☞ Q2 On suppose ici que la loi des  $X_i$  est exponentielle de densité

$$f(x) = \frac{1}{\theta} \exp\left(\frac{-(x - \alpha)}{\theta}\right) \mathbf{1}_{[\alpha, +\infty[}(x)$$

où  $\theta > 0$  et  $\alpha \geq 0$  sont des paramètres inconnus.

Écrire la loi du  $r$ -uplet  $(Y_1, \dots, Y_r)$  dans ce cas.

☞ Q3 Trouver une statistique exhaustive pour les paramètres  $\alpha$  et  $\theta$ .

---

### Corrigé de l'exercice 1

☞ Q1 Loi de  $(Y_1, \dots, Y_r)$  : il existe au moins deux méthodes.

Méthode rapide mais pas naturelle :

L'idée ici est de considérer tous les réordonnements de  $r$  variables parmi  $n$  telles que les  $r$  premières soient croissantes et plus petites que les  $n - r$  suivantes.

Plus précisément, soit  $\mathcal{A}_n^r$  l'ensemble des parties à  $r \leq n$  éléments d'un ensemble à  $n \geq 1$  éléments.

Alors pour  $y_1 < \dots < y_r$  et  $dy_1, \dots, dy_r$ , avec  $0 < dy_i < \frac{y_{i+1} - y_i}{2}$

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(Y_1 \in [y_1, y_1 + dy_1[, \dots, Y_r \in [y_r, y_r + dy_r]) \\ &= \sum_{\pi \in \mathcal{A}_n^r} \mathbb{P} \left( \begin{array}{l} X_{\pi_1} \in [y_1, y_1 + dy_1[ \wedge \dots \wedge X_{\pi_r} \in [y_r, y_r + dy_r[ \\ \wedge X_{\pi_1} < \dots < X_{\pi_r} \wedge \forall i \notin \pi, X_i > y_r + dy_r \end{array} \right) \\ & \quad \text{où } \pi_k \text{ est le } k\text{-ième élément de la partie } \pi \text{ à } r \text{ éléments parmi } \llbracket 1, n \rrbracket \\ &= |\mathcal{A}_n^r| \times \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{P}(Z_1 \in [y_1, y_1 + dy_1]) \cdots \mathbb{P}(Z_r \in [y_r, y_r + dy_r]) \\ \times \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_r} \\ \times \mathbb{P}(Z_{r+1} > y_r + dy_r) \cdots \mathbb{P}(Z_n > y_r + dy_r) \end{array} \right. \\ & \quad \text{car les } [y_i, y_i + dy_i[ \text{ sont disjoints, et les } Z_i \text{ sont indépendantes car les } X_i \text{ le sont} \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} \times \left\{ \begin{array}{l} (F(y_1 + dy_1) - F(y_1)) \cdots (F(y_r + dy_r) - F(y_r)) \\ \times \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_r} \\ \times (1 - F(y_r + dy_r)) \cdots (1 - F(y_r + dy_r)) \end{array} \right. \end{aligned}$$

En divisant et en faisant successivement tendre  $dy_r \rightarrow 0^+, \dots, dy_1 \rightarrow 0^+$  il vient <sup>4</sup>

$$\forall (y_1, \dots, y_r) \in \mathbb{R}^r, l(y_1, \dots, y_r) = \frac{n!}{(n-r)!} \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_r} f(y_1) \cdots f(y_r) (1 - F(y_r))^{n-r}$$

Méthode simple mais longue :

L'idée est ici de calculer d'abord la loi de  $(Y_1, \dots, Y_n)$ , puis d'en tirer celle de  $(Y_1, \dots, Y_r)$  au moyen de la relation  $f_X(x) = \int_{\mathcal{Y}} f_{X,Y}(x, y) dy$ .

Donnons-nous donc  $\mathcal{A}$  mesurable quelconque.

Alors

$$((Y_1, \dots, Y_n) \in \mathcal{A}) \Leftrightarrow (\exists \sigma / (X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)} \in \mathcal{A} \text{ et } X_{\sigma(1)} \leq \dots \leq X_{\sigma(n)})$$

---

<sup>4</sup>Précisément :

$$\frac{1}{dy_1} \mathbb{P}(Y_1 \in [y_1, y_1 + dy_1[, \dots, Y_r \in [y_r, y_r + dy_r]) \xrightarrow{dy_1 \rightarrow 0^+} \frac{n!}{(n-r)!} \times \left\{ \begin{array}{l} f(y_1) (F(y_2 + dy_2) - F(y_2)) \cdots (F(y_r + dy_r) - F(y_r)) \\ \times (1 - F(y_r + dy_r))^{n-r} \end{array} \right.$$

puis

$$\frac{1}{dy_1 \cdots dy_{r-1}} \mathbb{P}(Y_1 \in [y_1, y_1 + dy_1[, \dots, Y_r \in [y_r, y_r + dy_r]) \xrightarrow{dy_1 \rightarrow 0^+; \dots; dy_{r-1} \rightarrow 0^+} \frac{n!}{(n-r)!} \left\{ \begin{array}{l} f(y_1) \cdots f(y_{r-1}) (F(y_r + dy_r) - F(y_r)) \\ \times (1 - F(y_r + dy_r))^{n-r} \end{array} \right.$$

et finalement

$$\frac{1}{dy_1 \cdots dy_r} \mathbb{P}(Y_1 \in [y_1, y_1 + dy_1[, \dots, Y_r \in [y_r, y_r + dy_r]) \xrightarrow{dy_1 \rightarrow 0^+; \dots; dy_r \rightarrow 0^+} \frac{n!}{(n-r)!} f(y_1) \cdots f(y_r) (1 - F(y_r + dy_r))^{n-r}$$



et donc presque sûrement

$$((Y_1, \dots, Y_n) \in \mathcal{A}) \Leftrightarrow (\exists \sigma / (X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)} \in \mathcal{A} \text{ et } X_{\sigma(1)} < \dots < X_{\sigma(n)})$$

de sorte que

$$\mathbb{P}((Y_1, \dots, Y_n) \in \mathcal{A}) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \mathbb{P}((X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) \in \mathcal{A} \wedge X_{\sigma(1)} < \dots < X_{\sigma(n)})$$

où  $\sigma \in \mathcal{S}_n$  désigne une permutation des  $n$  indices telle que le  $n$ -uplet soit ordonné en plus d'être dans  $\mathcal{A}$ . Or pour toute  $\sigma \in \mathcal{S}_n$  on a

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}((X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) \in \mathcal{A} \wedge X_{\sigma(1)} < \dots < X_{\sigma(n)}) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathbb{1}_{(y_1, \dots, y_n) \in \mathcal{A}} \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_n} f_{X_{\sigma(1)}}(y_1) \cdots f_{X_{\sigma(n)}}(y_n) dy_1 \cdots dy_n \\ &= \int_{\mathcal{A}} \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_n} f(y_1) \cdots f(y_n) dy_1 \cdots dy_n \quad \text{car les } (X_i)_i \text{ sont i.i.d} \end{aligned}$$

et donc comme  $|\mathcal{S}_n| = n!$

$$\mathbb{P}((Y_1, \dots, Y_n) \in \mathcal{A}) = n! \int_{\mathcal{A}} \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_n} f(y_1) \cdots f(y_n) dy_1 \cdots dy_n$$

On en conclut que

$$f_{Y_1, \dots, Y_n}(y_1, \dots, y_n) = n! \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_n} f(y_1) \cdots f(y_n)$$

On a alors

$$\begin{aligned} f_{Y_1, \dots, Y_{n-1}}(y_1, \dots, y_{n-1}) &= n! \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_{n-1}} f(y_1) \cdots f(y_{n-1}) \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{y_{n-1} < y_n} f(y_n) dy_n \\ &= n! \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_{n-1}} f(y_1) \cdots f(y_{n-1}) \int_{y_{n-1}}^{+\infty} f(y_n) dy_n \\ &= n! \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_{n-1}} f(y_1) \cdots f(y_{n-1}) (1 - F(y_{n-1})) \end{aligned}$$

De façon similaire

$$\begin{aligned} f_{Y_1, \dots, Y_{n-2}}(y_1, \dots, y_{n-2}) &= n! \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_{n-2}} f(y_1) \cdots f(y_{n-2}) \int_{y_{n-2}}^{+\infty} f(y_{n-1}) (1 - F(y_{n-1})) dy_{n-1} \\ &= n! \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_{n-2}} f(y_1) \cdots f(y_{n-2}) \left[ -\frac{1}{2} (1 - F(u))^2 \right]_{y_{n-2}}^{+\infty} \\ &= \frac{n!}{2!} \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_{n-2}} f(y_1) \cdots f(y_{n-2}) (1 - F(y_{n-2}))^2 \end{aligned}$$

On en conclut donc par récurrence que

$$\forall (y_1, \dots, y_r) \in \mathbb{R}^r, l(y_1, \dots, y_r) = \frac{n!}{(n-r)!} \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_r} f(y_1) \dots f(y_r) (1 - F(y_r))^{n-r}$$

Loi de  $Y_r$  seul :

On a :

$$\begin{aligned} & f_{Y_2, \dots, Y_r}(y_2, \dots, y_r) \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} f(y_2) \dots f(y_r) \dots f(y_r) (1 - F(y_r))^{n-r} \mathbb{1}_{y_2 < \dots < y_r} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{y_1 < y_2} f(y_1) dy_1 \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} f(y_2) \dots f(y_r) \dots f(y_r) (1 - F(y_r))^{n-r} \mathbb{1}_{y_2 < \dots < y_r} \int_{-\infty}^{y_2} f(y_1) dy_1 \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} f(y_2) \dots f(y_r) \dots f(y_r) (1 - F(y_r))^{n-r} \mathbb{1}_{y_2 < \dots < y_r} F(y_2) \end{aligned}$$

Par suite

$$\begin{aligned} & f_{Y_3, \dots, Y_r}(y_3, \dots, y_r) \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} f(y_3) \dots f(y_r) \dots f(y_r) (1 - F(y_r))^{n-r} \mathbb{1}_{y_3 < \dots < y_r} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{y_2 < y_3} F(y_2) f(y_2) dy_2 \\ &= \frac{n!}{2!(n-r)!} f(y_3) \dots f(y_r) \dots f(y_r) (1 - F(y_r))^{n-r} \mathbb{1}_{y_3 < \dots < y_r} F(y_3)^2 \end{aligned}$$

Et par une récurrence immédiate il vient

$$\forall y_r \in \mathbb{R}, l(y_r) = \frac{n!}{(n-r)!(r-1)!} F(y_r)^{r-1} f(y_r) (1 - F(y_r))^{n-r}$$

On notera la densité du plus petit des  $x_i$ , à savoir

$$l(y_1) = n(1 - F(y_1))^{n-1} f(y_1)$$

et symétriquement celle du plus grand

$$l(y_n) = nF(y_n)^{n-1} f(y_n)$$

⇒ Q2 On a pour tout  $x \in \mathbb{R}$

$$F(x) = \left(1 - e^{-\frac{x-\alpha}{\theta}}\right) \mathbb{1}_{\alpha < x}$$

et donc d'après le résultat précédent

$$\begin{aligned} f_{Y_1, \dots, Y_r}(y_1, \dots, y_r) &= \frac{n!}{(n-r)!} \mathbb{1}_{y_1 < y_2 < \dots < y_r} \left( \prod_{i=1}^r \frac{1}{\theta} e^{-\frac{y_i - \alpha}{\theta}} \mathbb{1}_{\alpha < y_i} \right) \left( e^{-\frac{y_r - \alpha}{\theta}} \mathbb{1}_{\alpha < y_r} \right)^{n-r} \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} \frac{1}{\theta^r} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^r (y_i - \alpha) - (n-r) \frac{y_r - \alpha}{\theta}} \cdot \mathbb{1}_{\alpha < y_1 < y_2 < \dots < y_r} \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} \frac{1}{\theta^r} e^{-r \frac{\bar{y} - \alpha}{\theta} - (n-r) \frac{y_r - \alpha}{\theta}} \cdot \mathbb{1}_{\alpha < y_1 < y_2 < \dots < y_r} \end{aligned}$$

où  $\bar{y} = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r y_i$ .

⇒ Q3 On a

$$f_{Y_1, \dots, Y_r}(y_1, \dots, y_r) = \frac{n!}{(n-r)!} \underbrace{\frac{1}{\theta^r} e^{-\frac{1}{\theta}(r\bar{y} + (n-r)y_r)} e^{-n\alpha}}_{\text{dépend de } \theta, \alpha \text{ et que de } r\bar{y} + (n-r)y_r} \underbrace{\mathbb{1}_{\alpha < y_1}}_{\text{dépend de } \alpha \text{ et que de } y_1} \underbrace{\mathbb{1}_{y_1 < y_2 < \dots < y_r}}_{\text{ne dépend que de } y}$$

Soit donc  $S_\theta(y_1, \dots, y_r) = r\bar{y} + (n-r)y_r$  et  $S_\alpha(y_1, \dots, y_r) = y_1$ . Alors en vertu du théorème de factorisation  $(S_\theta, S_\alpha)$  est une statistique exhaustive pour le modèle paramétré par  $\theta, \alpha$ .

En outre lorsque  $\alpha$  est connu  $S_\theta$  est une statistique exhaustive pour le modèle paramétré par  $\theta$ , de même que  $S_\alpha$  lorsque  $\theta$  est connu dans le modèle paramétré par  $\alpha$ .

\*  
\* \*

## Enoncé de l'exercice 2

Calculer l'information de Fisher dans les modèles statistiques suivants :

⇒ Q1 une loi de Poisson de paramètre  $\lambda$  :

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{pour } k \in \mathbb{N}$$

⇒ Q2 une loi de Pareto de paramètres  $\alpha$  et  $\theta$  avec  $\alpha > 1$  et  $\theta > 0$ , de densité :

$$f(x) = \frac{\alpha - 1}{\theta} \left(\frac{\theta}{x}\right)^\alpha \mathbb{1}_{x \geq \theta}$$

⇒ Q3 une loi de Weibull de paramètres  $\alpha$  et  $\theta$  avec  $\alpha > 0$  et  $\theta > 0$  de densité :

$$f(x) = \alpha \theta x^{\alpha-1} e^{-\theta x^\alpha}$$

⇒ Q4 loi uniforme sur  $[0, \theta]$  avec  $\theta > 0$  inconnu.

## Corrigé de l'exercice 2

☞ Q1 L'information de Fisher pour  $n$  observations i.i.d. est égale à  $n$  fois l'information de Fisher pour une observation. On se contente donc de calculer l'information de Fisher dans le cas  $n = 1$ .

$$\begin{aligned} L_1(k; \lambda) &= \exp^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ \ln L_1(k; \lambda) &= -\lambda + k \ln \lambda - \ln(k!) \\ \frac{\partial \ln L_1}{\partial \lambda}(k, \lambda) &= -1 + \frac{k}{\lambda} \\ \frac{\partial^2 \ln L_1}{\partial \lambda^2}(k, \lambda) &= -\frac{k}{\lambda^2} \end{aligned}$$

Or  $\mathbb{E}(k) = \lambda$ , et donc  $I_1(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$  (et  $I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda}$ )

☞ Q2

$$L = \frac{\alpha}{\theta} \left( \frac{\theta}{x} \right)^\alpha \mathbb{1}_{[\theta, +\infty[}(x)$$

La vraisemblance n'est pas dérivable en  $\theta$  : l'information de Fisher n'est pas définie pour ce modèle. Si  $\theta$  est une constante connue et non un paramètre à estimer, on peut calculer l'information de Fisher pour le modèle 'réduit' (paramétré par  $\alpha$ ) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln L}{\partial \alpha} &= 1/(\alpha - 1) + \ln \theta - \ln x, \\ \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \alpha^2} &= -\frac{1}{(\alpha - 1)^2} \end{aligned}$$

D'où  $I_1(\alpha) = \frac{1}{(\alpha-1)^2}$ .

☞ Q3 On a

$$\begin{aligned} \ln L &= \ln \alpha + \ln \theta + (\alpha - 1) \ln x - \theta x^\alpha \\ \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} &= -\frac{1}{\theta^2} \\ \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta \partial \alpha} &= -x^\alpha \ln x, \\ \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \alpha^2} &= -\frac{1}{\alpha^2} - \theta x^\alpha (\ln x)^2. \end{aligned}$$

d'où

$$I_1(\alpha, \theta) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\alpha^2} + \theta \mathbb{E}(X^\alpha (\ln X)^2) & \mathbb{E}(X^\alpha \ln X) \\ \mathbb{E}(X^\alpha \ln X) & \frac{1}{\theta^2} \end{pmatrix}$$

Il reste alors à exprimer  $\mathbb{E}(X^\alpha (\ln X)^i)$  pour  $i \in \{1, 2\}$ ; ce calcul peut être fait au moyen des intégrales eulériennes.

Remarquons pour ce faire que pour  $p \in \mathbb{N}^*$  on a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^\alpha \ln(X)^p) &= \int_0^{+\infty} \theta x^\alpha \ln^p(x) \alpha x^{\alpha-1} e^{-\theta x^\alpha} dx \\ &= \frac{1}{\alpha^p \theta} \int_0^{+\infty} \ln^p\left(\frac{u}{\theta}\right) u e^{-u} du \quad \text{en posant } u = \theta x^\alpha\end{aligned}$$

En particulier pour  $p \in \{1, 2\}$  on a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^\alpha \ln(X)) &= \frac{1}{\alpha \theta} \int_0^{+\infty} \ln\left(\frac{u}{\theta}\right) u e^{-u} du \\ \mathbb{E}(X^\alpha \ln(X)^2) &= \frac{1}{\alpha^2 \theta} \int_0^{+\infty} \ln\left(\frac{u}{\theta}\right)^2 u e^{-u} du\end{aligned}$$

Or la fonction  $\Gamma$  d'Euler, définie par  $\Gamma : \left( \begin{array}{cc} \mathbb{R}^{+*} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \end{array} \right)$ , est de classe  $C^\infty$  et vérifie  $\forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}^{+*}, \Gamma^{(p)}(x) = \int_0^{+\infty} \ln^p(t) t^{x-1} e^{-t} dt$ . En conséquence

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^\alpha \ln(X)) &= \frac{1}{\alpha \theta} \left( \Gamma'(2) - \ln(\theta) \Gamma(2) \right) \\ \mathbb{E}(X^\alpha \ln(X)^2) &= \frac{1}{\alpha^2 \theta} \left( \Gamma''(2) - 2 \ln(\theta) \Gamma'(2) + \ln(\theta)^2 \Gamma(2) \right)\end{aligned}$$

Enfin, on peut montrer que  $\frac{\Gamma'(u)}{\Gamma(u)} = -\gamma - \frac{1}{u} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+u} \right)$  (où  $\gamma$  est la constante d'Euler définie par  $\gamma = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \ln N$ ) ce dont on tire par dérivation que  $\frac{\Gamma''(u)\Gamma(u) - \Gamma'(u)^2}{\Gamma(u)^2} = \frac{1}{u^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+u)^2}$ , ceci pour tout  $u \in \mathbb{R}^{+*}$ ; les séries figurant dans ces expressions sont alors calculables lorsque  $u$  est entier.

En particulier lorsque  $x = 2$  il vient :

$$\begin{aligned}\Gamma(2) &= 1! \\ &= 1 \\ \Gamma'(2) &= -\gamma - \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= 1 - \gamma \\ \Gamma''(2) &= \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^2} + \Gamma'(2)^2 \\ &= \frac{1}{4} + \left( \frac{\pi^2}{6} - 1 - \frac{1}{4} \right) + (1 - \gamma)^2 \\ &= \frac{\pi^2}{6} - 2\gamma + \gamma^2\end{aligned}$$

En définitive on a donc

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^\alpha \ln(X)) &= \frac{1 - \gamma - \ln \theta}{\theta \alpha} \\ \mathbb{E}(X^\alpha (\ln X)^2) &= \frac{1}{\alpha^2 \theta} \left( \frac{\pi^2}{6} - 2\gamma + \gamma^2 - 2(1 - \gamma) \ln(\theta) + \ln(\theta)^2 \right) \end{aligned}$$

de sorte que

$$I_1(\alpha, \theta) = \left( \frac{\frac{\theta}{\alpha^2} + \frac{1}{\alpha^2} \left( \frac{\pi^2}{6} - 2\gamma + \gamma^2 - 2(1 - \gamma) \ln(\theta) + \ln(\theta)^2 \right)}{\frac{1 - \gamma - \ln \theta}{\theta \alpha}} \quad \middle| \quad \frac{\frac{1 - \gamma - \ln \theta}{\theta \alpha}}{\frac{1}{\theta^2}} \right)$$

Remarquons que dans le sous-modèle dans lequel  $\alpha$  est connu et  $\theta$  est inconnu on a simplement

$$I_1(\theta) = \frac{1}{\theta^2}$$

⇒ Q4 La vraisemblance du modèle est

$$f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \theta) = \frac{1}{\theta^n} \mathbb{1}_{\min x_i \geq 0} \mathbb{1}_{\max x_i \leq \theta}$$

donc la log-vraisemblance s'écrit, pour  $x \in [0, \theta]^n$

$$L_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \theta) = -n \ln \theta$$

L'information de Fisher n'est pas définie, car le modèle n'est pas homogène (à  $x$  fixé, la log-vraisemblance  $\theta \mapsto L_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \theta)$  n'est pas définie (donc pas dérivable) au point  $\theta = \max_i x_i$ ). Sur  $]0, \max_i x_i[$  on peut néanmoins calculer par analogie<sup>5</sup>

$$\begin{aligned} I_n(\theta) &= \mathbb{E} \left( \left( \frac{\partial L_{X_1, \dots, X_n}(x; \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left( -\frac{n}{\theta} \right)^2 \frac{dx_1}{\theta} \dots \frac{dx_n}{\theta} \\ &= \frac{n^2}{\theta^2} \end{aligned}$$

Remarquons que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left( -\frac{\partial^2 L_{X_1, \dots, X_n}(x; \theta)}{\partial \theta^2} \right) &= \mathbb{E} \left( \frac{n}{\theta^2} \right) \\ &= \frac{n}{\theta^2} \\ &\neq \frac{n^2}{\theta^2} \end{aligned}$$

<sup>5</sup>L'objet  $I_n(\theta)$  existe pour  $\theta \in ]0, \max_i x_i[$ , mais n'a plus les propriétés habituelles de l'information de Fisher (à commencer par un problème de définition), et c'est pourquoi on s'abstient habituellement de la définir dans ce cas.

En effet, l'hypothèse de "dériverabilité deux fois sous le signe  $\int_{\mathcal{X}}$ " qui stipule que

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \int_{\mathcal{X}} \ln f_{X_1, \dots, X_n}(x) dx = \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial \ln f_{X_1, \dots, X_n}(x)}{\partial \theta} dx$$

et que

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \int_{\mathcal{X}} \ln f_{X_1, \dots, X_n}(x) dx = \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial^2 \ln f_{X_1, \dots, X_n}(x)}{\partial \theta^2} dx$$

n'est pas vérifiée ici.  $I_n(\theta)$  est toujours par définition la variance du score, mais n'est plus égale à la courbure espérée de la log-vraisemblance.

Rappel : Lorsque cette hypothèse est vérifiée on a d'une part

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left( \frac{\partial \ln f_{X_1, \dots, X_n}(x; \theta)}{\partial \theta} \right) &= \mathbb{E} \left( \frac{\frac{\partial f_{X_1, \dots, X_n}(x; \theta)}{\partial \theta}}{f_{X_1, \dots, X_n}(x; \theta)} \right) \\ &= \int_{\mathbb{X}} \frac{\partial f_{X_1, \dots, X_n}(x; \theta)}{\partial \theta} dx \\ &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \theta \mapsto \int_{\mathbb{X}} f_{X_1, \dots, X_n}(x; \theta) dx \right)_{(\theta)} \\ &\quad \text{d'après la première partie de l'hypothèse} \\ &= \frac{\partial}{\partial \theta} (\theta \mapsto 1)_{(\theta)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

c'est-à-dire que le score est centré, et d'autre part en dérivant de nouveau

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left( \frac{\partial^2 \ln f_{X_1, \dots, X_n}(x, \theta)}{\partial \theta^2} \right) &= \mathbb{E} \left( \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \frac{\frac{\partial f_{X_1, \dots, X_n}(x; \theta)}{\partial \theta}}{f_{X_1, \dots, X_n}(x, \theta)} \right) \right) \\ &= \mathbb{E} \left( \frac{\frac{\partial^2 f_{X_1, \dots, X_n}(x; \theta)}{\partial \theta^2}}{f_{X_1, \dots, X_n}(x, \theta)} - \frac{\left( \frac{\partial f_{X_1, \dots, X_n}(x; \theta)}{\partial \theta} \right)^2}{(f_{X_1, \dots, X_n}(x; \theta))^2} \right) \\ &= \mathbb{E} \left( \frac{\frac{\partial^2 f_{X_1, \dots, X_n}(x; \theta)}{\partial \theta^2}}{f_{X_1, \dots, X_n}(x, \theta)} - \left( \frac{\partial \ln f_{X_1, \dots, X_n}(x; \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right) \\ &= \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial^2 f_{X_1, \dots, X_n}(x, \theta)}{\partial \theta^2} dx - I_n(\theta) \\ &= \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left( \theta \mapsto \int_{\mathcal{X}} f_{X_1, \dots, X_n}(x, \theta) dx \right)_{(\theta)} - I_n(\theta) \\ &\quad \text{d'après la deuxième partie de l'hypothèse} \\ &= -I_n(\theta) \end{aligned}$$

★  
★ ★

### Énoncé de l'exercice 3

On dispose de  $n$  observations  $y_1, \dots, y_n$  sur les durées de vie de certains composants industriels. On suppose que les variables aléatoires  $Y_1, \dots, Y_n$  associées sont i.i.d, de densité  $f(t) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}} \mathbf{1}_{t \geq 0}$ .

☞ Q1 Soit  $F$  la fonction de répartition des  $Y_i$ . On cherche à estimer la “fonction de survie” de chaque composant  $\bar{F}(t) = 1 - F(t)$ .

Calculer  $\bar{F}(t)$  en fonction de  $t$  et  $\theta$ .

☞ Q2 Calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance de  $\theta$  et en déduire un estimateur convergent  $\hat{F}(t)$  de  $\bar{F}(t)$ . Que peut-on dire du biais de  $\hat{F}(t)$  ?

☞ Q3 Calculer la loi limite de  $\sqrt{n} \left( \hat{F}(t) - \bar{F}(t) \right)$ .

Soit  $T$  la variable aléatoire définie par :

$$T = \begin{cases} 1, & \text{si } Y_1 > t \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

On note par ailleurs  $S(Y) = Y_1 + \dots + Y_n$ .

☞ Q4 (a) Déterminer la loi de  $Y_1$  conditionnellement à  $S$ .

(b) Calculer

$$T^*(Y) = \mathbb{E}(T|S(Y))$$

Comment s'appelle cet estimateur ?

(c) Montrer que  $T^*$  est l'estimateur sans biais de  $\bar{F}(t)$  optimal (parmi les estimateurs sans biais).

(d) Peux-on dire si  $T^*$  est efficace (à distance finie) ?

### Corrigé de l'exercice 3

☞ Q1  $\bar{F}(t)$  désigne la probabilité qu'un composant donné survive jusqu'à la date  $t$  et mesure ainsi sa fiabilité. On a

$$\begin{aligned} F(t) &= \mathbb{P}(Y_1 \leq t) \\ &= \int_0^t \frac{1}{\theta} e^{-\frac{u}{\theta}} du \\ &= 1 - e^{-\frac{t}{\theta}} \end{aligned}$$

en conséquence de quoi

$$\boxed{\bar{F}(t) = e^{-\frac{t}{\theta}}}$$



⇒ Q2 La log-vraisemblance du modèle s'écrit pour  $\min_i y_i \geq 0$

$$\ln L(y_1, \dots, y_n; \theta) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n y_i$$

Or si  $\hat{\theta}_{(y)}$  maximise la vraisemblance il vérifie  $\frac{\partial(\ln L)}{\partial \theta}(\hat{\theta}_{(y)}) = 0$ , soit  $-\frac{n}{\hat{\theta}_{(y)}} + \frac{1}{(\hat{\theta}_{(y)})^2} \sum_{i=1}^n y_i = 0$  et donc

$$\hat{\theta} : (y_1, \dots, y_n) \mapsto \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

(la réciproque étant immédiate).

Définissons donc  $\hat{F}(t) : y \mapsto e^{-t/\hat{\theta}_{(y)}}$ .

Comme  $\hat{\theta}(Y) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \theta$  et que  $\phi_t : (u \mapsto e^{-\frac{t}{u}})$  est absolument continue en  $u$ , on a

$$\forall t, \hat{F}(t) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \bar{F}(t)$$

En revanche à distance finie, même si  $\mathbb{E}(\hat{\theta}(Y)) = \theta$  pour comparer  $\mathbb{E}(\hat{F}(t)_{(Y)})$  à  $F(t)$  il n'est **pas** possible d'utiliser de l'inégalité de Jensen selon laquelle

Si  $\phi : (\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R})$  est strictement convexe, et si  $X$  est non-dégénérée (i.e.  $\mathbb{V}(X) \neq 0$ ), alors  $\mathbb{E}(\phi(X)) > \phi(\mathbb{E}(X))$ .

car  $\phi_t : (u \mapsto e^{-\frac{t}{u}})$  n'est **pas** convexe, puisque  $\frac{\partial^2 \phi_t}{\partial u^2}(u) = \frac{t}{u^3} (\frac{t}{u} - 2) e^{-\frac{t}{u}}$  qui n'est pas toujours positif.

Calculons donc le biais de  $\hat{F}(t)$  : on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{F}(t)) &= \mathbb{E}\left(e^{-\sum_{i=0}^n \frac{nt}{Y_i}}\right) \\ &= \mathbb{E}\left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{nt}{\sum_{i=0}^n Y_i}\right)^k\right) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} (-nt)^k \mathbb{E}\left(\frac{1}{(\sum_{i=0}^n Y_i)^k}\right) \quad \text{par Fubini} \end{aligned}$$

Or pour tout  $k \geq 1$  fixé,  $\phi_k : \begin{pmatrix} \mathbb{R}^+ & \rightarrow & \mathbb{R}^+ \\ x & \mapsto & \frac{1}{x^k} \end{pmatrix}$  est convexe (car  $\mathcal{C}^\infty$  et de dérivée  $\phi'_k : (x \mapsto -\frac{k}{x^{k+1}})$ , donc  $\phi''_k(x) = \frac{k(k+1)}{x^{k+2}} > 0$ ) et donc d'après l'inégalité stricte de Jensen  $\mathbb{E}\left(\frac{1}{(\sum_{i=0}^n Y_i)^k}\right) > \frac{1}{(\mathbb{E}(\sum_{i=0}^n Y_i))^k}$  de sorte que finalement

$$\mathbb{E}(\hat{F}(t)) > \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} (-nt)^k \frac{1}{(\mathbb{E}(\sum_{i=0}^n Y_i))^k}$$

Or  $(Y_i)_i \underset{iid}{\rightsquigarrow} \mathcal{E}\left(\frac{1}{\theta}\right)$  et donc (voir TD 1, exercice 2)  $(\sum_{i=0}^n Y_i) \underset{iid}{\rightsquigarrow} \Gamma\left(n, \frac{1}{\theta}\right)$  de sorte qu'en particulier  $\mathbb{E}\left(\sum_{i=0}^n Y_i\right) = n\theta$

Par suite

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left(\widehat{F}(t)\right) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} (-nt)^k \frac{1}{(n\theta)^k} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \frac{(-t)^k}{\theta^k} \\ &= e^{-\frac{t}{\theta}} \\ &= \bar{F}(t)\end{aligned}$$

Ainsi,  $\widehat{F}(t)$  est un estimateur biaisé de  $\bar{F}(t)$ .

Notons que bien entendu  $\mathbb{E}\left(\widehat{F}(t)_{(Y)}\right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} e^{-t} = \bar{F}(t)$ , ce qui découle de ce que  $\forall t, \widehat{F}(t) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} F(t)$ .

ENSAE  
SE222

⇒ Q3 On a  $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, I_1(\theta)^{-1})$ , avec

$$\begin{aligned} I_1(\theta) &= \frac{1}{n} I_n(\theta) \\ &= -\frac{1}{n} \mathbb{E} \left( \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} \right) \\ &= -\frac{1}{n} \left( \frac{n}{\theta^2} - \frac{2n}{\theta^2} \right) \\ &= \frac{1}{\theta^2} \end{aligned}$$

En posant  $g : (\theta \mapsto e^{-\frac{t}{\theta}})$  de dérivée  $g'(\theta) = \frac{t}{\theta^2} e^{-\frac{t}{\theta}}$  on a par la delta-méthode

$$\begin{aligned} \sqrt{n} \left( g(\hat{\theta}) - g(\theta) \right) &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( 0, g'(\theta) \cdot I_1(\theta)^{-1} \cdot g'(\theta) \right) \\ &= \mathcal{N} \left( 0, \left( \frac{t}{\theta^2} e^{-\frac{t}{\theta}} \right) \theta^2 \left( \frac{t}{\theta^2} e^{-\frac{t}{\theta}} \right) \right) \\ &= \mathcal{N} \left( 0, \frac{t^2}{\theta^2} e^{-\frac{2t}{\theta}} \right) \end{aligned}$$

⇒ Q4 (a) Cherchons dans un premier temps la densité  $f_{S_n(Y)}(s)$  de la loi de la variable  $S_n(Y) = Y_1 + \dots + Y_n$ .

- On a tout d'abord  $f_{S_1(Y)}(s) = f_{Y_1}(s) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{s}{\theta}} \mathbf{1}_{s \geq 0}$ .
- $Y_1$  et  $Y_2$  étant indépendante, on a alors

$$\begin{aligned} f_{S_2(Y)}(s) &= \int_{\mathbb{R}^2} f_{Y_1}(y_1) f_{Y_2}(y_2) \mathbf{1}_{y_1+y_2=s} dy_1 dy_2 \\ &= \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{y_1 \geq 0} \mathbf{1}_{s-y_1 \geq 0} f_{Y_1}(y_1) f_{Y_2}(s-y_1) dy_1 \\ &= \mathbf{1}_{s \geq 0} \int_0^s \left( \frac{1}{\theta} e^{-\frac{y_1}{\theta}} \right) \left( \frac{1}{\theta} e^{-\frac{s-y_1}{\theta}} \right) dy_1 \\ &= \mathbf{1}_{s \geq 0} s \frac{e^{-\frac{s}{\theta}}}{\theta^2} \end{aligned}$$

– puis de même

$$\begin{aligned}
 f_{S_3(Y)}(s) &= \int_{\mathbb{R}^3} f_{Y_1}(y_1) f_{Y_2}(y_2) f_{Y_3}(y_3) \mathbb{1}_{y_1+y_2+y_3=s} dy_1 dy_2 dy_3 \\
 &= \int_{\mathbb{R}^2} \left( \int_{\mathbb{R}^2} f_{Y_1}(y_1) f_{Y_2}(y_2) \mathbb{1}_{y_1+y_2=s_1} dy_1 dy_2 \right) f_{Y_3}(y_3) \mathbb{1}_{s_1+y_3=s} ds_1 dy_3 \\
 &= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{y_3 \geq 0} \mathbb{1}_{s-y_3 \geq 0} f_{S_2(Y)}(s-y_3) f_{Y_3}(y_3) dy_3 \\
 &= \int_{\mathbb{R}} f_{S_2(Y)}(s-y_3) f_{Y_3}(y_3) dy_3 \\
 &= \mathbb{1}_{s \geq 0} \int_0^s \left( \frac{s-y_3}{\theta^2} e^{-\frac{s-y_3}{\theta}} \right) \left( \frac{1}{\theta} e^{-\frac{y_3}{\theta}} \right) dy_3 \\
 &= \mathbb{1}_{s \geq 0} \frac{s^2}{2} \frac{e^{-\frac{s}{\theta}}}{\theta^3}
 \end{aligned}$$

– (récurrence ...)

– et finalement

$$f_{S_n(Y)}(s) = \mathbb{1}_{s \geq 0} \frac{s^{n-1}}{(n-1)!} \frac{e^{-\frac{s}{\theta}}}{\theta^n}$$

*Remarque :* Ce résultat peut bien-sûr être obtenu directement en constatant que  $S(Y) \sim \Gamma(n, \frac{1}{\theta})$  (voir TD 1, exercice 2).

On en tire alors la loi conditionnelle  $f(y, s)$  de la variable  $(Y, S(Y))$  : pour  $y_1 \in [0, s]$  on a

$$\begin{aligned}
 f(y_1, s) &= \frac{f_{Y_1, Y_1+\dots+Y_n}(y_1, s)}{f_{Y_1+\dots+Y_n}(s)} \\
 &= \frac{f_{Y_1, Y_2+\dots+Y_n}(y_1, s-y_1)}{f_{Y_1+\dots+Y_n}(s)} \\
 &= \frac{f_{Y_1}(y_1) f_{Y_2+\dots+Y_n}(s-y_1)}{f_{Y_1+\dots+Y_n}(s)} \\
 &\quad \text{car les } Y_i \text{ sont indépendantes et donc } Y_1 \text{ est indépendante de } Y_2 + \dots + Y_n \\
 &= \frac{\left( \frac{(s-y_1)^{n-2}}{(n-2)!} \frac{e^{-\frac{s-y_1}{\theta}}}{\theta^{n-1}} \right) \left( \frac{e^{-\frac{y_1}{\theta}}}{\theta} \right)}{\frac{s^{n-1}}{(n-1)!} \frac{e^{-\frac{s}{\theta}}}{\theta^n}}
 \end{aligned}$$

et donc en définitive

$$f(y_1, s) = (n-1) \frac{(s-y_1)^{n-2}}{s^{n-1}} \mathbb{1}_{0 \leq y_1 \leq s}$$

(b) Calculons tout d'abord que  $T^*(Y)$ .

On a successivement, pour  $t \in \mathbb{R}^+$  et  $s \geq t$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(T|S(Y) = s) &= \mathbb{P}(Y_1 > t \mid S(Y) = s) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left( (n-1) \frac{(s-y)^{n-2}}{s^{n-1}} \mathbb{1}_{0 \leq y \leq s} \right) \mathbb{1}_{t \leq y} dy \\ &= \int_t^s (n-1) \frac{(s-y)^{n-2}}{s^{n-1}} dy \\ &= \frac{1}{s^{n-1}} [-(s-y)^{n-1}]_t^s \\ &= \left(1 - \frac{t}{s}\right)^{n-1} \end{aligned}$$

En d'autres termes,

$$T^*(Y) = \left(1 - \frac{t}{S(Y)}\right)^{n-1}$$

$T^*$  est l'amélioré de Rao-Blackwell de  $T$  pour la statistique exhaustive  $S$ .

(c) On a successivement

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\mathbb{E}(T|S(Y))) &= \mathbb{E}(T) \\ &= \mathbb{E}(\mathbb{1}_{Y_1 > t}) \\ &= \mathbb{P}(Y_1 > t) \\ &= \bar{F}(t) \end{aligned}$$

(on retrouve ainsi que l'amélioré  $T^*$  de  $T$ , qui estime sans biais  $\bar{F}(t)$ , est lui-même un estimateur sans biais de  $\bar{F}(t)$ ).

Enfin,  $T^*(Y) = \mathbb{E}(T|S(Y))$  est fonction d'une statistique exhaustive complète (car  $T$  est une statistique canonique dans un modèle exponentiel), et est sans biais, donc d'après le théorème de Lehman-Scheffé  $T^*$  est optimal parmi les estimateurs sans biais de  $\bar{F}(t)$ . On vérifie d'ailleurs que

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(T) &= \mathbb{V}(\mathbb{E}(T|S(Y))) + \mathbb{E}(\mathbb{V}(T|S(Y))) \\ &> \mathbb{V}(\mathbb{E}(T|S(Y))) \\ &= \mathbb{V}(T^*(Y)) \end{aligned}$$

(d) Discuter de l'efficacité de  $T^*$ , c'est comparer sa variance à la borne de Fréchet-Darmois-Cramer-Rao  $\frac{\partial \phi_t}{\partial \theta}(\theta)' I_1(\theta)^{-1} \frac{\partial \phi_t}{\partial \theta}(\theta)$ .

Cependant le calcul de  $[\mathbb{E}(\mathbb{E}(T|S(Y)))^2 - \mathbb{E}((T|S(Y))^2)]$  est ardu : il est nécessaire d'explicitier l'intégrale et d'y soustraire la borne FDCR pour conclure (un tel calcul est laissé à la sagacité du lecteur).

Constatant néanmoins que le modèle est exponentiel et régulier, et comme  $T^*$  n'est **pas** une fonction affine de la statistique exhaustive  $S$  comme il devrait l'être s'il était efficace (cf cours de P. Doukhan, Théorème 4.3), on peut en conclure que  $T^*$  n'est **pas** efficace.

★  
★ ★

### Énoncé de l'exercice 4

On étudie une variable aléatoire  $X$ , de densité  $f(\cdot, \theta)$  ( $f$  est  $C^1$ ).

☞ Q1 Quelle est la fonction score du modèle, notée  $S(X; \theta)$  ?

Donner l'expression de l'information de Fisher  $I_X(\theta)$ .

☞ Q2 En fait, on ne parvient pas à observer  $X$ , mais seulement  $Y$  définie par :

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{si } X \geq s \\ 0, & \text{si } X < s \end{cases}$$

où  $s$  est un seuil connu.

On suppose que l'on peut intervertir  $\int_{\mathcal{X}}$  et  $\frac{\partial}{\partial \theta}$ ; donner la fonction score du modèle, notée  $S_Y(y; \theta)$ .

En déduire que

$$S_Y(y; \theta) = \mathbb{E}(S_X(X; \theta) | Y = y)$$

☞ Q3 En déduire alors que  $I_X(\theta) \gg I_Y(\theta)$ , où  $I_Y(\theta)$  est l'information de Fisher associée à  $Y$  (l'inégalité s'entend au sens des matrices symétriques).

Quelle interprétation pouvez-vous donner à l'inégalité ci-dessus ?

### Corrigé de l'exercice 4

☞ Q1 On a

$$S(x; \theta) = \frac{\partial \ln L}{\partial \theta}(x, \theta)$$

En outre, si on peut intervertir  $\int_{\mathcal{X}}$  et  $\frac{\partial}{\partial \theta}$  alors le score est centré :  $\mathbb{E}(S(x; \theta)) = 0$  (voir exercice 2)

L'information de Fisher pour une observation est définie par

$$I_1(\theta) = \mathbb{E}\left(\frac{\partial \ln L}{\partial \theta}(x, \theta) \frac{\partial \ln L}{\partial \theta'}(x, \theta)\right)$$

En outre, si on peut intervertir  $\int_{\mathcal{X}}$  avec  $\frac{\partial}{\partial \theta}$  et  $\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}$  alors

$$I_1(\theta) = \mathbb{E} \left( -\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2}(x, \theta) \right)$$

(voir exercice 2)

⇒ Q2 La variable aléatoire  $Y$  ne prend que deux valeurs, et suit donc une loi de Bernoulli; en outre on a  $(Y = 1) \Leftrightarrow (X \geq s)$  et donc  $\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(X \geq s)$ .

Notons donc  $p_s(\theta) = \mathbb{P}(X \geq s)$  : la densité de  $Y$  est

$$f_Y(y; \theta) = p_s(\theta)^y (1 - p_s(\theta))^{1-y} \mathbf{1}_{y \in \{0,1\}}$$

de sorte que pour  $y \in \{0, 1\}$

$$\ln L_Y(y; \theta) = y \ln p_s(\theta) + (1 - y) \ln(1 - p_s(\theta))$$

Le score est alors

$$\begin{aligned} S_Y(y; \theta) &= y \frac{\partial \ln p_s}{\partial \theta}(\theta) + (1 - y) \frac{\partial \ln(1 - p_s)}{\partial \theta}(\theta) \\ &= y \frac{\partial}{\partial \theta} \left( t \mapsto \ln \left( \int_s^{+\infty} f_X(x, t) dx \right) \right)_{(\theta)} + (1 - y) \frac{\partial}{\partial \theta} \left( t \mapsto \ln \left( \int_{-\infty}^s f_X(x, t) dx \right) \right)_{(\theta)} \\ &= y \frac{\frac{\partial}{\partial \theta} \left( t \mapsto \int_s^{+\infty} f_X(x, t) dx \right)_{(\theta)}}{\int_s^{+\infty} f_X(x, \theta) dx} + (1 - y) \frac{\frac{\partial}{\partial \theta} \left( t \mapsto \int_{-\infty}^s f_X(x, t) dx \right)_{(\theta)}}{\int_{-\infty}^s f_X(x, \theta) dx} \\ &= y \frac{\int_s^{+\infty} \frac{\partial f_X}{\partial \theta}(x; \theta) dx}{\int_s^{+\infty} f_X(x; \theta) dx} + (1 - y) \frac{\int_{-\infty}^s \frac{\partial f_X}{\partial \theta}(x; \theta) dx}{\int_{-\infty}^s f_X(x; \theta) dx} \end{aligned}$$

où l'un seulement des deux termes est non-nul puisque  $y \in \{0, 1\}$ .

Calculons alors le score pour le modèle en  $X$  : on a pour  $y \in \{0, 1\}$

$$\mathbb{E}(S_X(X, \theta) | Y = y) = \int_{\mathbb{R}} S_X(x, \theta) f_{X|Y=y}(x) dx$$

Or

$$S_X(x; \theta) = \frac{1}{f_X(x; \theta)} \frac{\partial f_X}{\partial \theta}(x; \theta)$$

et en outre

$$\begin{aligned} f_X(x; \theta | Y = 1) &= \frac{\mathbb{P}(X = x \wedge Y = 1)}{\mathbb{P}(Y = 1)} \\ &= \frac{f_X(x; \theta) \cdot \mathbf{1}_{X \geq s}}{\int_s^{+\infty} f_X(x; \theta) dx} \end{aligned}$$



tandis que

$$\begin{aligned} f_X(x; \theta | Y = 0) &= \frac{\mathbb{P}(X = x \wedge Y = 0)}{\mathbb{P}(Y = 0)} \\ &= \frac{f_X(x; \theta) \cdot \mathbf{1}_{x < s}}{\int_{-\infty}^s f_X(x; \theta) dx} \end{aligned}$$

donc en définitive

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_X(X, \theta) | Y = y) &= \int_{\mathbb{R}} S_X(x, \theta) f_{X|Y=y}(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} S_X(x, \theta) (y f_{X|Y=1}(x) + (1 - y) f_{X|Y=0}(x)) dx \\ &= y \int_{\mathbb{R}} S_X(x, \theta) f_{X|Y=1}(x) dx + (1 - y) \int_{\mathbb{R}} S_X(x, \theta) f_{X|Y=0}(x) dx \\ &= y \int_{\mathbb{R}} \left( \frac{1}{f_X(x; \theta)} \frac{\partial f_X}{\partial \theta}(x; \theta) \right) \times \frac{f_X(x; \theta) \cdot \mathbf{1}_{x \geq s}}{\int_s^{+\infty} f_X(x; \theta) dx} dx \\ &\quad + (1 - y) \int_{\mathbb{R}} \left( \frac{1}{f_X(x; \theta)} \frac{\partial f_X}{\partial \theta}(x; \theta) \right) \times \frac{f_X(x; \theta) \cdot \mathbf{1}_{x < s}}{\int_{-\infty}^s f_X(x; \theta) dx} dx \\ &= y \frac{\int_s^{+\infty} \frac{\partial f_X}{\partial \theta}(x; \theta) dx}{\int_s^{+\infty} f_X(x; \theta) dx} + (1 - y) \frac{\int_{-\infty}^s \frac{\partial f_X}{\partial \theta}(x; \theta) dx}{\int_{-\infty}^s f_X(x; \theta) dx} \\ &= \boxed{S_Y(y; \theta)} \end{aligned}$$

☞ Q3 L'information de Fisher d'un modèle étant la variance du score correspondant, on a

$$\begin{aligned} I_Y(\theta) &= \mathbb{V}(S(Y; \theta)) \\ &= \mathbb{V}(\mathbb{E}(S(X; \theta) | Y)) \end{aligned}$$

Or pour toutes variables aléatoires  $A$  et  $B$ , à supposer que ces termes existent on a

$$\mathbb{E}(A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}_B(A|B))$$

$$\mathbb{V}(A) = \underbrace{\mathbb{E} \left( \underbrace{\mathbb{V}_B(A|B)}_{\substack{\text{variance de } A \text{ sachant } B \\ \text{ce qui dépend de } B}} \right)}_{\text{variance espérée de } A} + \underbrace{\mathbb{V} \left( \underbrace{\mathbb{E}_B(A|B)}_{\substack{\text{espérance de } A \text{ sachant } B \\ \text{ce qui dépend de } B}} \right)}_{\text{variance due à } B}$$

En l'occurrence il vient

$$\begin{aligned} I_X(\theta) &= \mathbb{V}(S(X; \theta)) \\ &= \mathbb{V}(\mathbb{E}(S(X; \theta) | Y)) + \mathbb{E}(\mathbb{V}(S(X; \theta) | Y)) \\ &= I_Y(\theta) + \mathbb{E}(\mathbb{V}(S(X; \theta) | Y)) \\ &\gg I_Y(\theta) \end{aligned}$$

En d'autres termes, l'information véhiculée par  $X$  est strictement plus importante que celle véhiculée par  $Y$ , ce qui est conforme à l'intuition.

\*  
\* \*

### 3 Travaux Dirigés n°3

#### Énoncé de l'exercice 1

Soit  $Y$  un vecteur aléatoire de taille  $N$  et  $X$  une matrice aléatoire à  $N$  lignes et  $K$  colonnes. Soit  $\theta \rightarrow S(\theta)$  une application de classe  $C^1$  définie sur un voisinage de 0 dans  $\mathbb{R}$ , à valeurs dans l'ensemble des matrices symétriques définies positives de taille  $N$ . On suppose que  $S(0) = I_N$  et on note :  $A = \frac{\partial S}{\partial \theta}(0)$ .

On rappelle par ailleurs que

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln(|S|)}{\partial \theta} &= \text{Tr} \left( S^{-1} S' \right) \\ \frac{\partial S^{-1}}{\partial \theta} &= -S^{-1} S' S^{-1} \end{aligned}$$

On considère le modèle linéaire (conditionnel) gaussien suivant :

$$\mathbb{P}_Y^X = \mathcal{N}(Xb, S(\theta))$$

où  $b \in \mathbb{R}^K$  et  $\theta \in \mathbb{R}$  sont les paramètres inconnus.

- ☞ Q1 Ecrire la vraisemblance du modèle.
- ☞ Q2 Ecrire le vecteur score (de taille  $K + 1$ ) et vérifier qu'il est d'espérance nulle.
- ☞ Q3 Calculer la matrice d'information du modèle en  $(b, \theta = 0)$ .  
Le résultat s'exprime très simplement en fonction de  $X$  et  $A$ .
- ☞ Q4 Dans cette question, on suppose que  $S(\theta)$  est la matrice de terme général :

$$S(\theta)_{i,j} = (\theta^{|i-j|})_{1 \leq i,j \leq N}$$

Calculer  $I_{b,\theta}(b, 0)$ .

#### Corrigé de l'exercice 1

- ☞ Q1 On se donne  $Y$  variable aléatoire sur  $\mathcal{M}_{N,1}(\mathbb{R})$  et  $X$  sur  $\mathcal{M}_{N,K}(\mathbb{R})$ .

La vraisemblance (conditionnelle) du modèle normal s'écrit

$$f(Y|X, b, \theta) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{N}{2}} \sqrt{|S(\theta)|}} \exp \left( -\frac{1}{2} (Y - Xb)' \cdot S(\theta)^{-1} \cdot (Y - Xb) \right)$$

Note : il s'agit bien d'un nombre réel car  $(Y - Xb) \in \mathcal{M}_{N,1}(\mathbb{R})$ .

La log-vraisemblance conditionnelle s'écrit donc

$$\ln L(Y|X, b, \theta) = -\frac{N}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \ln |S(\theta)| - \frac{1}{2} (Y - Xb)' \cdot S(\theta)^{-1} \cdot (Y - Xb)$$

- ⇒ Q2 Le vecteur score  $\mathcal{S}(b, \theta) \in \mathcal{M}_{K+1,1}(\mathbb{R})$  se décompose entre les composantes suivant  $b$ , soit  $\mathcal{S}_b(b) \in \mathcal{M}_{K,1}(\mathbb{R})$ , et celle suivant  $\theta$ , soit  $\mathcal{S}_\theta(\theta) \in \mathbb{R}$ , que nous calculons alternativement.
- Composantes suivant  $b$  :

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_b(b) &= \frac{\partial \ln L(Y|X, \cdot, \theta)}{\partial b}(b) \\ &= -\frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial b} (b \mapsto (Y - Xb)' \cdot S(\theta)^{-1} \cdot (Y - Xb)) \right) (b) \\ &= -\frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial b} (b \mapsto Y'S(\theta)^{-1}Y - b'X'S(\theta)^{-1}Y - Y'S(\theta)^{-1}Xb + b'X'S(\theta)^{-1}Xb) \right) (b)\end{aligned}$$

Rappelons que pour  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  on a  $\frac{\partial}{\partial b} (b \mapsto b'A) = A$  et  $\frac{\partial}{\partial b} (b \mapsto A'b) = A'$ , donc pour  $\Sigma$  symétrique

$$\frac{\partial}{\partial b} (b \mapsto b'\Sigma b) (b) = 2\Sigma b$$

Donc

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_b(b) &= -\frac{1}{2} (0 - X'S(\theta)^{-1}Y - X'S(\theta)^{-1}Y + 2(X'S(\theta)^{-1}X)b) \\ &= X' \cdot S(\theta)^{-1} \cdot (Y - Xb)\end{aligned}$$

- Composante suivant  $\theta$  :

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_\theta(\theta) &= \frac{\partial \ln L(Y|X, b, \cdot)}{\partial \theta}(\theta) \\ &= -\frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial \theta} (\theta \mapsto \ln |S(\theta)| + (Y - Xb)' \cdot S(\theta)^{-1} \cdot (Y - Xb)) \right) (\theta)\end{aligned}$$

Or

$$\left( \frac{\partial}{\partial \theta} (\theta \mapsto \ln |S(\theta)|) \right) (\theta) = \text{Tr} \left( S(\theta)^{-1} \frac{\partial S}{\partial \theta}(\theta) \right)$$

et

$$\left( \frac{\partial}{\partial \theta} (\theta \mapsto S(\theta)^{-1}) \right) (\theta) = -S(\theta)^{-1} \cdot \frac{\partial S}{\partial \theta}(\theta) \cdot S(\theta)^{-1}$$

La première assertion découle en effet directement du théorème 2 du chapitre 3 de “*Matrix Differential Calculus*”, Jan R. Magnus et Heinz Neudecker, qui stipule que si  $F : (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_k^+(\mathbb{R}))$  est  $k$  fois différentiable, alors  $\ln |F|$  l’est et admet pour différentielle  $d \ln |F| = \text{Tr} (F^{-1}) dF$  (il suffit de poser  $n = p = 1$  et  $F = S$ ). Elle peut même être redémontrée directement, en notant  $\lambda_i^A$  la  $i$ -ième valeur propre d’une matrice  $A$  (sans ordre de

multiplicité) :

$$\begin{aligned}
 \left( \frac{\partial}{\partial \theta} (\theta \mapsto \ln |S(\theta)|) \right) (\theta) &= \left( \frac{\partial}{\partial \theta} (\theta \mapsto \ln (\prod_{i=1}^n \lambda_i^{S(\theta)})) \right) (\theta) \\
 &= \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial}{\partial \theta} (\theta \mapsto (\ln \lambda_i^{S(\theta)})) \right) (\theta) \\
 &= \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial \lambda_i^{S(\theta)}}{\partial \theta} (\theta) \right) (\lambda_i^{S(\theta)})^{-1} \\
 &= \sum_{i=1}^n \left( \lambda_i^{\frac{\partial S(\theta)}{\partial \theta}} (\theta) \right) (\lambda_i^{S(\theta)-1}) \\
 &= \text{Tr} \left( \left( \frac{\partial S(\theta)}{\partial \theta} (\theta) \right) \times (S(\theta)^{-1}) \right)
 \end{aligned}$$

Une preuve de la seconde assertion est également proposée dans le théorème 3 de ce même ouvrage, ou peut aussi être obtenue en développant l'égalité

$$\frac{\partial}{\partial \theta} (S(\theta) \times S(\theta)^{-1}) = \frac{\partial I_N}{\partial \theta} = (0)$$

Il en ressort que

$$\begin{aligned}
 \mathcal{S}_\theta(\theta) &= -\frac{1}{2} \text{Tr} \left( S(\theta)^{-1} \frac{\partial S}{\partial \theta} (\theta) \right) + \frac{1}{2} \underbrace{(Y - Xb)' \left( S(\theta)^{-1} \cdot \frac{\partial S}{\partial \theta} (\theta) \cdot S(\theta)^{-1} \right) (Y - Xb)}_{\in \mathbb{R}} \\
 &= -\frac{1}{2} \text{Tr} \left( \left( S(\theta)^{-1} \frac{\partial S}{\partial \theta} (\theta) S(\theta)^{-1} \right) (S(\theta) - (Y - Xb)'(Y - Xb)) \right)
 \end{aligned}$$

Reste à montrer que le score est centré :

- On a d'un part  $\mathbb{E}(Y|X, b) = Xb$ ,  
en conséquence de quoi  $\mathbb{E}(Y - Xb|X, b) = (0)$   
de sorte que  $\mathbb{E}(\mathcal{S}_b(b)|X, b) = (0)$  : les composantes selon  $b$  sont centrées.
- Et d'autre part  $\mathbb{E}_\theta((Y - Xb)(Y - Xb)') = S(\theta)$ ,  
de sorte que  $\mathbb{E}(\mathcal{S}_\theta(\theta)|X, b) = 0$ .

En conséquence,  $\mathbb{E}_{b,\theta}(\mathcal{S}(b, \theta)|X, b, \theta) = (0)$  : le vecteur score est centré.

☞ Q3 Le calcul de la matrice d'information de Fisher est encore plus convivial, car c'est un prétexte au calcul des dérivées secondes de la log-vraisemblance (le calcul alternatif de la variance du score calculé est laissé en exercice).

- Dérivée seconde selon  $(b, b)$  :

$$\frac{\partial^2 \ln L(Y|X, \cdot, \cdot)}{\partial b \partial b'} (\theta, b) = -X' \cdot S(\theta)^{-1} \cdot X$$

Donc, comme  $S(0) = I_N$ ,

$$\mathbb{E}_{b,\theta=0} \left( \frac{\partial^2 \ln L(Y|X, \cdot, \cdot)}{\partial b \partial b'} (\theta, b) \right) = -X'X$$

– Dérivée seconde selon  $(b, \theta)$  :

$$\frac{\partial^2 \ln L(Y|X, \cdot, \cdot)}{\partial b \partial \theta}(\theta, b) = -X' \cdot S(\theta)^{-1} \frac{\partial S}{\partial \theta}(\theta) S(\theta)^{-1} \cdot (Y - Xb)$$

Donc, comme  $\mathbb{E}_{b, \theta}(Y - Xb) = 0$ ,

$$\mathbb{E}_{b, \theta=0} \left( \frac{\partial^2 \ln L(Y|X, \cdot, \cdot)}{\partial b \partial \theta}(\theta, b) \right) = (0)$$

– Dérivée seconde selon  $(\theta, b)$  :

Loins de nous lancer dans la dérivation selon  $b$  de  $\frac{\partial \ln L(Y|X, \cdot, \cdot)}{\partial \theta}$ , constatons astucieusement que  $(b, \theta) \mapsto \mathcal{S}(b, \theta)$  est de classe  $C^2$  sur un voisinage de 0 : elle est en effet la composée d'une fonction de classe  $C^\infty$ , à savoir

$\left( \begin{array}{ccc} \mathbb{R} \times \mathcal{M}_{N,N}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, A) & \mapsto & -\frac{N}{2} \ln 2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}(Y - Xb)' \cdot A \cdot (Y - Xb) \end{array} \right)$ , et des deux fonctions  $(M \mapsto \ln |M|)$  et  $(M \mapsto M^{-1})$  qui sont de classe  $C^\infty$  sur une partie dense d'un voisinage de 0. Cauchy nous assure alors de l'égalité des dérivées croisées pour  $\theta$  voisin de 0 :  $\forall(b, \theta), \frac{\partial^2 \ln L(Y|X, \cdot, \cdot)}{\partial b \partial \theta}(\theta, b) = \frac{\partial^2 \ln L(Y|X, \cdot, \cdot)}{\partial \theta \partial b}(\theta, b)$ , ce qui permet de conclure que

$$\mathbb{E}_{b, \theta=0} \left( \frac{\partial^2 \ln L(Y|X, \cdot, \cdot)}{\partial \theta \partial b}(\theta, b) \right) = (0)$$

– Dérivée seconde selon  $(\theta, \theta)$  :

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}_{b, \theta} \left( \frac{\partial^2 \ln L(Y|X, \cdot, \cdot)}{\partial \theta^2}(\theta, b) \right) \\ &= \mathbb{E}_{b, \theta} \left( \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \theta \mapsto -\frac{1}{2} \text{Tr} \left( \underbrace{\left( S(\theta)^{-1} \frac{\partial S}{\partial \theta}(\theta) S(\theta)^{-1} \right)}_{\psi(\theta)} \underbrace{(S(\theta) - (Y - Xb)'(Y - Xb))}_{h(\theta)} \right) \right) \right) \\ &= -\frac{1}{2} \mathbb{E}_{b, \theta} \left( \text{Tr} \left( \frac{\partial \psi}{\partial \theta}(\theta) h(\theta) + \psi(\theta) \frac{\partial h}{\partial \theta}(\theta) \right) \right) \\ &= -\frac{1}{2} \text{Tr} \left( \mathbb{E}_{b, \theta} \left( \frac{\partial \psi}{\partial \theta}(\theta) h(\theta) \right) \right) - \frac{1}{2} \mathbb{E}_{b, \theta} \left( \text{Tr} \left( \psi(\theta) \frac{\partial h}{\partial \theta}(\theta) \right) \right) \\ &= -\frac{1}{2} \text{Tr} \left( \mathbb{E}_{b, \theta} \left( \frac{\partial \psi}{\partial \theta}(\theta) \underbrace{\mathbb{E}_b(h(\theta)|\theta)}_{=0} \right) \right) - \frac{1}{2} \mathbb{E}_{b, \theta} \left( \text{Tr} \left( \psi(\theta) \frac{\partial S}{\partial \theta}(\theta) \right) \right) \\ &= -\frac{1}{2} \text{Tr} \left( \psi(\theta) \frac{\partial S}{\partial \theta}(\theta) \right) \end{aligned}$$

Donc

$$\mathbb{E}_{b, \theta} \left( -\frac{\partial^2 \ln L(Y|X, \cdot, \cdot)}{\partial \theta^2}(\theta, b) \right) = \frac{1}{2} \text{Tr} \left( S(\theta)^{-1} \frac{\partial S}{\partial \theta}(\theta) S(\theta)^{-1} \frac{\partial S}{\partial \theta}(\theta) \right)$$

et par suite, sachant que  $S(0) = I_N$  et en notant  $A = \frac{\partial S}{\partial \theta}(0)$

$$\mathbb{E}_{b, \theta=0} \left( -\frac{\partial^2 \ln L(Y|X, \cdot, \cdot)}{\partial \theta^2}(\theta, b) \right) = \frac{1}{2} \text{Tr} (A^2)$$

On a donc finalement :

$$I(b, 0) = \begin{pmatrix} X'X & 0 \\ \hline 0 \dots 0 & \frac{1}{2}Tr(A^2) \end{pmatrix}$$

⇨ Q4 On a  $S(\theta) = (\theta^{|i-j|})_{(i,j) \in \llbracket 1, N \rrbracket^2}$ .

Or  $\frac{\partial}{\partial \theta} (\theta \mapsto \theta^k) (\theta) = \begin{cases} 0 & \text{si } k = 0 \\ 1 & \text{si } k = 1 \\ \theta^{k-1} & \text{sinon} \end{cases}$  En particulier  $A = \frac{\partial S}{\partial \theta}(0) = (\mathbb{1}_{|i-j|=1})_{(i,j) \in \llbracket 1, N \rrbracket^2}$ .

En conséquence

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & \star & \star & \dots & \star & \star \\ \star & 2 & \star & \dots & \star & \star \\ \star & \star & 2 & \dots & \star & \star \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \star & \star & \star & \dots & 2 & \star \\ \star & \star & \star & \dots & \star & 1 \end{pmatrix}$$

et donc  $Tr(A^2) = 2(N - 1)$ .

Ainsi,

$$I_{b,\theta}(b, 0) = \begin{pmatrix} X'X & 0 \\ 0 & N - 1 \end{pmatrix}$$

★  
★ ★

## Énoncé de l'exercice 2

⇨ Q1 Calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance (e.m.v.)  $\hat{p}$  de  $p$  dans le modèle

$$X_i \underset{iid}{\rightsquigarrow} \mathcal{B}(1, p)$$

et calculer la loi limite de  $\sqrt{n}(\hat{p} - p)$ .

⇨ Q2 Calculer l'e.m.v.  $(\hat{m}, \hat{\sigma}^2)$  de  $(m, \sigma^2)$  dans le modèle

$$X_i \underset{iid}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(m, \sigma^2)$$

et donner la loi limite du vecteur

$$\sqrt{n} \begin{pmatrix} \hat{m} - m \\ \hat{\sigma}^2 - \sigma^2 \end{pmatrix}$$

☞ Q3 Calculer l'e.m.v.  $(\hat{a}, \hat{b})$  de  $(a, b)$  dans le modèle

$$X_i \underset{iid}{\rightsquigarrow} \mathcal{U}([a, b]) \quad \text{loi uniforme sur } [a, b]$$

Donner la loi limite du vecteur

$$n \begin{pmatrix} \hat{a} - a \\ b - \hat{b} \end{pmatrix}$$


---

## Corrigé de l'exercice 2

☞ Q1 On a

$$f_X(x, p) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i} \mathbb{1}_{x \in \{0,1\}}$$

d'où on tire que

$$\frac{\partial \ln f_X}{\partial p}(x, p) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p}$$

en conséquence de quoi un estimateur  $\hat{p}$  de  $p$  vérifie

$$(1 - \hat{p}) \sum_{i=1}^n x_i = \hat{p} (n - \sum_{i=1}^n x_i)$$

soit  $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{X}$  (la réciproque étant immédiate).

On a par ailleurs

$$\frac{\partial^2 \ln f_X}{\partial p^2}(x, \theta) = -\frac{1}{p^2} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{(1-p)^2}$$

d'où  $I_n(\theta) = \frac{n}{p(1-p)}$  et donc d'après le Théorème Central Limite il vient

$$\sqrt{n}(\hat{p} - p) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, p(1-p))$$

☞ Q2 Le paramètre à estimer est ici  $(m, \sigma^2)$  (et pas  $(m, \sigma)$  : on s'abstiendra d'écrire  $\sigma^4$  mais plutôt  $(\sigma^2)^2$ ). On a

$$f_X(x, m, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}^n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2}$$

et donc

$$\frac{\partial \ln f_X}{\partial m}(x, m, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - m)$$



Par ailleurs,

$$\frac{\partial \ln f_X}{\partial (\sigma^2)}(x, m, \sigma^2) = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2$$

L'estimateur du maximum de vraisemblance  $\begin{pmatrix} \hat{m} \\ \hat{\sigma}^2 \end{pmatrix}$  de  $\begin{pmatrix} m \\ \sigma^2 \end{pmatrix}$  vérifie alors pour tout  $x$

$$\frac{\partial \ln f_X}{\partial \begin{pmatrix} m \\ \sigma^2 \end{pmatrix}} \left( \begin{pmatrix} \hat{m}(x) \\ \hat{\sigma}^2(x) \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ce dont on tire

$$\begin{cases} \hat{m}(x) = x \\ \frac{1}{\sigma^2(x)} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{m}(x)) = 0 \end{cases}$$

soit encore

$$\begin{pmatrix} \hat{m} \\ \hat{\sigma}^2 \end{pmatrix} : x \mapsto \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \end{pmatrix}$$

On a enfin

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \ln f_X}{\partial m^2}(x, m, \sigma^2) &= -\frac{n}{\sigma^2} \\ \frac{\partial^2 \ln f_X}{\partial m \partial (\sigma^2)}(x, m, \sigma^2) &= \left( -\frac{1}{(\sigma^2)^2} \right) \sum_{i=1}^n (x_i - m) \\ \frac{\partial^2 \ln f_X}{\partial (\sigma^2)^2}(x, m, \sigma^2) &= \frac{n}{2(\sigma^2)^2} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2 \left( -\frac{2}{(\sigma^2)^3} \right) \end{aligned}$$

De  $\mathbb{E}(X_i - m) = 0$  et  $\mathbb{E}((X_i - m)^2) = \sigma^2$  on tire finalement que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left( \frac{\partial^2 \ln f_X}{\partial (\sigma^2)^2}(X; m, \sigma^2) \right) &= \frac{n}{2(\sigma^2)^2} - \frac{1}{2} \frac{2}{(\sigma^2)^3} (\sigma^2) \\ &= -\frac{n}{2(\sigma^2)^2} \end{aligned}$$

de sorte que

$$I_n(m, \sigma^2) = \begin{pmatrix} \frac{n}{\sigma^2} & 0 \\ 0 & \frac{n}{2(\sigma^2)^2} \end{pmatrix}$$

et donc en définitive

$$\sqrt{n} \begin{pmatrix} \hat{m} - m \\ \hat{\sigma}^2 - \sigma^2 \end{pmatrix} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma^2 & 0 \\ 0 & 2(\sigma^2)^2 \end{pmatrix} \right)$$

Les variables aléatoires (asymptotiquement normales)  $\hat{m}$  et  $\hat{\sigma}^2$  sont de covariance asymptotique nulle, donc<sup>6</sup> sont asymptotiquement indépendantes.


<sup>6</sup>Attention, propriété propre à la loi normale

☞ Q3 La vraisemblance s'écrit :

$$L_X(x; a, b) = \frac{1}{(b-a)^n} \mathbb{1}_{\min x_i \geq a} \mathbb{1}_{\max x_i \leq b}$$

et n'est pas dérivable en  $a$  et  $b$  (discontinuités en  $a = \min x_i$  et  $b = \max x_i$ ). Les conditions de régularité habituelles ne sont pas vérifiées, et le point  $(\hat{a}(x), \hat{b}(x))$  qui maximise la vraisemblance ne vérifie pas les conditions du premier ordre.


Il peut néanmoins être déterminé directement : en effet pour  $x \in \mathbb{R}^n$  et  $b \in \mathbb{R}$  fixés,  $\left( \begin{array}{l} ]-\infty, b[ \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ a \mapsto \frac{1}{(b-a)^n} \mathbb{1}_{\min x_i \geq a} \mathbb{1}_{\max x_i \leq b} \end{array} \right)$  est identiquement nulle si  $\max_i x_i > b$ , et sinon admet pour graphe



Graphe de  $a \mapsto L_X(x; a, b)$  lorsque  $b = 8 > \max_i x_i$  et  $\min_i x_i = 4$

Elle est donc dans tous les cas maximale en  $\hat{a}(x) = \min_i x_i$  (qui ne dépend pas de  $b$ ).

De même pour  $x \in \mathbb{R}^n$  et  $a \in \mathbb{R}$  fixés,  $\left( \begin{array}{l} ]a, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ b \mapsto \frac{1}{(b-a)^n} \mathbb{1}_{\min x_i \geq a} \mathbb{1}_{\max x_i \leq b} \end{array} \right)$  est identiquement nulle si  $\min_i x_i < a$ , et sinon admet pour graphe



Graphes de  $b \mapsto L_X(x; a, b)$  lorsque  $a = 4 \leq \min_i x_i$  et  $\max_i x_i = 8$

Elle est donc dans tous les cas maximale en  $\hat{b}(x) = \max_i x_i$  (qui ne dépend pas de  $a$ ).

Par conséquent l'estimateur du maximum de vraisemblance de  $(a, b)$  est  $x \mapsto (\min_i x_i, \max_i x_i)$ . Cependant cette statistique ne vérifie pas les propriétés habituelles de l'e.m.v., à commencer par la normalité asymptotique. La loi limite du couple  $(\hat{a}, \hat{b})$  doit donc être retrouvée 'à la main'. Cherchons tout d'abord pour  $\alpha > 0$  la loi de  $n^\alpha(\hat{a} - a)$  :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(n^\alpha(\hat{a}(X) - a) > t) &= \mathbb{P}(\min X_i > a + \frac{t}{n^\alpha}) \\
 &= \mathbb{P}(X_1 > a + \frac{t}{n^\alpha})^n \\
 &= \left(1 - \frac{t}{n^\alpha}(b-a)\right)^n \\
 &= e^{n \ln(1 - \frac{t}{n^\alpha}(b-a))} \\
 &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \begin{cases} 0 & \text{si } \alpha < 1 \\ e^{-t/(b-a)} & \text{si } \alpha = 1 \\ +\infty & \text{si } \alpha > 1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

En particulier,  $\mathbb{P}(n(\hat{a}(X) - a) > t) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} e^{-t/(b-a)}$  et donc la fonction de survie de  $n(\hat{a} - a) > t$  tend quand  $n \rightarrow +\infty$  vers la fonction de survie d'une loi exponentielle  $\mathcal{E}\left(\frac{1}{b-a}\right)$ . Rappelons que la convergence de la fonction de répartition en tout point  $t$  de continuité (et donc de la loi de survie) entraîne la convergence en loi. On montre de la même façon (attention au sens de l'inégalité) que

$$n(b - \hat{b}(X)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{E}(1/(b-a))$$

Calculons enfin la loi jointe de  $n \begin{pmatrix} \widehat{a} - a \\ b - \widehat{b} \end{pmatrix}$  : pour ce faire calculons de même

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left( n(\widehat{a}(X) - a) > t \wedge n(b - \widehat{b}(X)) > u \right) &= \mathbb{P} \left( (\min_i X_i) > \frac{t}{n} + a \wedge (\max_i X_i) < b - \frac{u}{n} \right) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f_{(\min_i X_i, \max_i X_i)}(y, z) \mathbb{1}_{y > \frac{t}{n} + a} \wedge z < b - \frac{u}{n} dydz \end{aligned}$$

La loi du couple  $(\min_i X_i, \max_i X_i)$  s'obtient alors à partir de celle du  $n$ -uplet ordonné  $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ , à savoir

$$l(y_1, \dots, y_n) = n! \mathbb{1}_{y_1 < \dots < y_n} f(y_1) \dots f(y_n)$$

(Voir TD 2, exercice 1) en intégrant successivement (d'après le théorème de projection) suivant  $y_{n-1}$ , puis  $y_{n-2}, \dots$ , et ainsi de suite jusqu'à intégrer selon  $y_2$ . Il vient en tout état de cause

$$f_{(\min_i X_i, \max_i X_i)}(y, z) = \frac{n!}{(n-2)!} f(y) (F_X(z) - F_X(y))^{n-2} f(z) \mathbb{1}_{y < z}$$

En conséquence,

$$\begin{aligned} &\mathbb{P} \left( n(\widehat{a}(X) - a) > t \wedge n(b - \widehat{b}(X)) > u \right) \\ &= \int_{a + \frac{t}{n}}^{b - \frac{u}{n}} \left( \int_y^{b - \frac{u}{n}} \frac{n!}{(n-2)!} \left( \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(y) \right) \left( \frac{z-a}{b-a} - \frac{y-a}{b-a} \right)^{n-2} \left( \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(z) \right) dz \right) dy \\ &\quad \vdots \\ &= \left( 1 - \frac{1}{n} \frac{y+z}{b-a} \right)^n \\ &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} e^{-\frac{y+z}{b-a}} \\ &= e^{-\frac{y}{b-a}} \times e^{-\frac{z}{b-a}} \end{aligned}$$

qui est la loi jointe de deux exponentielles **indépendantes**.

Autre méthode (beaucoup plus simple) :

On peut directement déterminer la loi jointe de  $n \begin{pmatrix} \widehat{a}(X) - a \\ b - \widehat{b}(X) \end{pmatrix}$  :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P} \left( n(\widehat{a}(X) - a) > t \wedge n(b - \widehat{b}(X)) < u \right) &= \mathbb{P} \left( (\min_i X_i) > \frac{t}{n} + a \wedge (\max_i X_i) < b - \frac{u}{n} \right) \\
 &= \mathbb{P} \left( \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, X_i \in \left] \frac{t}{n} + a, b - \frac{u}{n} \right[ \right) \\
 &= \mathbb{P} \left( X_1 \in \left] \frac{t}{n} + a, b - \frac{u}{n} \right[ \right)^n \\
 &= \left( \int_{\frac{t}{n} + a}^{b - \frac{u}{n}} \frac{1}{b - a} dx \right)^n \\
 &= \left( \int_{\frac{t}{n} + a}^{b - \frac{u}{n}} \frac{1}{b - a} dx \right)^n \\
 &= \left( 1 - \frac{1}{n} \frac{t + u}{b - a} \right)^n \\
 &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{t+u}{b-a}} \\
 &= e^{-\frac{t}{b-a}} \times e^{-\frac{u}{b-a}}
 \end{aligned}$$

se dont on déduit tout d'abord que les  $\widehat{a}(X) - a$  et  $b - \widehat{b}(X)$  sont indépendantes, et en outre qu'elles suivent une même loi exponentielle de paramètre  $\frac{1}{b-a}$ , ce qui s'écrit simplement

$$\boxed{ n \begin{pmatrix} \widehat{a}(X) - a \\ b - \widehat{b}(X) \end{pmatrix} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{E} \left( \frac{1}{b-a} \right)^{\otimes 2} }$$

\*  
\* \*

### Enoncé de l'exercice 3

Exemple tiré de *Basu D. (1988) Stastical Information and Likelihood, Springer-Verlag, N. Y.*

Dans une urne contenant 1000 tickets, 20 sont marqués  $\theta$  et 980 sont marqués  $10\theta$ .


- ☞ Q1 Donner l'estimateur du maximum de vraisemblance  $\widehat{\theta}$  de  $\theta$  lorsque l'on tire un unique ticket de valeur  $X$ , et montrer que  $P(\widehat{\theta} = \theta) = 0.98$ .
- ☞ Q2 On renumérote les tickets marqués  $10\theta$  par  $a_i\theta$  ( $1 \leq i \leq 980$ ) où les  $a_i$  sont des réels connus, deux-à-deux distincts, et compris dans l'intervalle  $[10, 10.1]$ . Donner le nouvel estimateur du maximum de vraisemblance  $\widehat{\theta}$  et montrer que  $P(\widehat{\theta} = \theta) = 0.02$ . Ce résultat vous semble-t-il paradoxal ?

### Corrigé de l'exercice 3

☞ Q1 La vraisemblance s'écrit

$$L(x; \theta) = 0.98 \cdot \mathbb{1}_{10\theta}(x) + 0.02 \cdot \mathbb{1}_{\theta}(x)$$

Le graphe de  $\theta \mapsto L(x; \theta)$  est alors, à  $x$  fixé



La vraisemblance est donc manifestement maximale en  $\theta = \frac{x}{10}$ .

Donc  $\hat{\theta} = \frac{x}{10}$  et  $\mathbb{P}(\hat{\theta}(X) = \theta) = \mathbb{P}\left(\frac{X}{10} = \theta\right) = \mathbb{P}(X = 10\theta) = \boxed{0.98}$

☞ Q2 La vraisemblance s'écrit cette fois

$$L(x; \theta) = 0.02 \cdot \mathbb{1}_{\theta}(x) + \sum_{i=1}^{980} 0.001 \cdot \mathbb{1}_{a_i\theta}(x)$$

et est maximale en  $\theta = x$ .

En conséquence,  $\mathbb{P}(\tilde{\theta} = \theta) = \mathbb{P}(X = \theta) = 0.02$ . On a même  $\mathbb{P}(\tilde{\theta} \geq 10\theta) = \mathbb{P}(X \geq 10\theta) = 1 - \mathbb{P}(X = \theta) = 0.98$  : on est presque certain de se tromper d'un facteur 10 !

Ce résultat est paradoxal, puisqu'il incite à penser qu'une même méthode d'estimation (en l'occurrence, la maximisation de la vraisemblance) peut conduire, face à deux problèmes quasi-identiques, à une estimation satisfaisante dans un cas mais très décevante dans l'autre.

Plus inquiétant encore (sauf bien-sûr pour l'étudiant de l'ENSAE, qui est vif d'esprit et averti), supposons que les  $a_i$  soient inconnus et tirés indépendamment selon une même loi aléatoire  $\mathcal{L}$ , d'espérance 10.5 et (pour simplifier) à support borné. Alors l'e.m.v. reprendrait à nouveau une valeur beaucoup plus satisfaisante ( $\hat{\theta} = \frac{x}{10.5}$ ) : en d'autres termes, l'information supplémentaire "connaissance des  $a_i$ " se traduit par une estimation beaucoup moins bonne que si on ne disposait pas de cette information !

L'explication de ce paradoxe tient à la discontinuité de la vraisemblance, et à ce que l'estimateur par maximum de vraisemblance n'est justifié qu'asymptotiquement (lorsque  $n \rightarrow +\infty$ ) ; cet exemple donne en fait un cas extrême d'écart entre la loi à distance finie et la loi asymptotique (ici  $n = 1$ , mais il faut noter qu'on peut aisément construire d'autres paradoxes de ce type pour un nombre quelconque d'observations  $n$ ).

Cet exemple illustre le danger des méthodes dont la justification repose uniquement sur un comportement asymptotique, alors que le nombre de données dont on dispose est toujours fini en pratique.

\*  
\* \*

## 4 Travaux Dirigés n°4

### Énoncé de l'exercice 1

Soit  $f$  la densité de la loi exponentielle de paramètre  $\frac{1}{\theta}$  translatée de  $\alpha$

$$f(x) = \frac{1}{\theta} \exp\left[-\frac{x - \alpha}{\theta}\right] \mathbb{1}_{[\alpha, +\infty[}(x)$$

- ☞ Q1 Donner les e.m.v.  $\hat{\alpha}$  et  $\hat{\theta}$  de  $\alpha$  et  $\theta$ .
- ☞ Q2 Calculer la loi (à distance finie) de  $n(\hat{\alpha} - \alpha)$ .
- ☞ Q3 Déterminer la loi limite de  $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)$ .
- ☞ Q4 Rappeler l'expression de la loi de la statistique d'ordre  $(X_{(1)}, \dots, X_{(N)})$  en fonction de  $f$ . En déduire la loi du  $n$ -uplet

$$(nX_{(1)}, (n-1)(X_{(2)} - X_{(1)}), \dots, 2(X_{(n-1)} - X_{(n-2)}), X_{(n)} - X_{(n-1)})$$

En déduire que  $\hat{\theta}$  et  $\hat{\alpha}$  sont indépendants (à distance finie).

### Corrigé de l'exercice 1

☞ Q1 On obtient :  $\hat{\alpha} = \min x_i$ ,  $\hat{\theta} = \bar{x} - \min x_i$ .

☞ Q2 On a :

$$\mathbb{P}(n(\hat{\alpha} - \alpha) \geq t) = \mathbb{P}(\min x_i \geq \alpha + t/n) = (\exp^{-t/n\theta})^n = \exp(-t/\theta)$$

et donc  $n(\hat{\alpha} - \alpha) \rightsquigarrow \mathcal{E}(\frac{1}{\theta})$ .

☞ Q3 On ne peut pas appliquer le théorème de la normalité asymptotique à  $\hat{\theta}$ , car  $\hat{\theta}$  n'est que l'une des deux composantes de l'estimateur du maximum de vraisemblance  $(\hat{\alpha}, \hat{\theta})$  dont les composantes ne sont pas indépendantes, et qui dans ce cas particulier ne vérifie pas les conditions de régularité habituelles (notamment dérivabilité de la log-vraisemblance).

Il faut retrouver la loi limite d'une autre façon. Ici :

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) = \sqrt{n}(\bar{x} - (\theta + \alpha)) + \sqrt{n}(\alpha - \hat{\alpha})$$

Comme  $\mathbb{E}(X) = \theta + \alpha$ ,  $\mathbb{V}(X) = \theta^2$ , il vient d'après le théorème central limite :

$$\sqrt{n}(\bar{x} - (\theta + \alpha)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \theta^2)$$

De plus,

$$\sqrt{n}(\alpha - \hat{\alpha}) = \frac{-1}{\sqrt{n}} n(\hat{\alpha} - \alpha) \xrightarrow{P} 0$$



puisque  $n(\hat{\alpha} - \alpha) \rightsquigarrow \mathcal{E}\left(\frac{1}{\theta}\right)$ . Rappelons que :

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X, Y_n \xrightarrow{P} a: X_n + Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X + a$$

si  $a$  est une constante. Donc :

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \theta^2)$$

⇨ Q4 La densité de l'échantillon ordonné  $Y = (X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$  s'écrit

$$f_Y(y_1, \dots, y_n) = n! f(y_1) \dots f(y_n) \mathbf{1}_{y_1 < \dots < y_n}$$

En d'autres termes,

$$\begin{aligned} f_{X_{(1)}, \dots, X_{(n)}}(y_1, \dots, y_n) &= n! \mathbf{1}_{y_1 < \dots < y_n} \frac{1}{\theta^n} \left( \prod_{i=1}^n e^{-\frac{y_i - \alpha}{\theta}} \right) \mathbf{1}_{\min_i y_i \geq \alpha} \\ &= \frac{n!}{\theta^n} \mathbf{1}_{\alpha \leq y_1 < \dots < y_n} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{y_i - \alpha}{\theta}} \end{aligned}$$

Soit alors

$$\phi : \begin{pmatrix} \mathbb{R}^n & \rightarrow & \mathbb{R}^n \\ (y_1, \dots, y_n) & \mapsto & (ny_1, (n-1)(y_2 - y_1), \dots, (y_n - y_{n-1})) \end{pmatrix}$$

Alors  $\phi$  est de classe  $C^\infty$  et en outre

$$f_{\phi(Y)}(z_1, \dots, z_n) = |Jac \phi^{-1}| f_Y(\phi^{-1}(z_1, \dots, z_n))$$

(ceci se montre en effectuant le changement de variable  $z = \phi(y)$  dans l'intégrale  $\int_A f_Y(y)$ , pour toute partie mesurable  $A$  de  $\mathbb{R}^n$ ).

Or  $\phi(Y)_1 = nY_1$ , donc

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi(\cdot)_1}{\partial Y_1} &= n \\ \frac{\partial \phi(\cdot)_1}{\partial Y_i} &= 0, \quad \forall i \geq 2 \end{aligned}$$

puis  $\phi(Y)_2 = (n-1)(Y_2 - Y_1)$ , et donc

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi(\cdot)_2}{\partial Y_1} &= -(n-1) \\ \frac{\partial \phi(\cdot)_2}{\partial Y_2} &= (n-1), \quad \forall i \geq 2 \\ \frac{\partial \phi(\cdot)_2}{\partial Y_i} &= 0, \quad \forall i \geq 3 \end{aligned}$$

de sorte qu'en définitive

$$Jac(\phi) = \begin{pmatrix} n & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -(n-1) & (n-1) & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -(n-2) & (n-2) & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

En conséquence,  $|Jac(\phi^{-1})| = |Jac(\phi)^{-1}| = |Jac(\phi)|^{-1} = \frac{1}{n!}$

D'autre part,  $\mathbb{1}_{y_1 \geq \alpha} = \mathbb{1}_{\phi(y)_1 \geq n\alpha}$ , puis pour  $i \geq 2$ ,  $\mathbb{1}_{y_i < y_{i+1}} = \mathbb{1}_{\phi(y)_i > 0}$ .

Enfin, une récurrence immédiate montre que  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $\phi^{-1}(z)_i = \sum_{j=1}^i \frac{z_j}{n-j+1}$ , de sorte qu'en définitive

$$f_Z(z_1, \dots, z_n) = \theta^{-n} \exp^{-\sum z_i - n\alpha/\theta} \mathbb{1}_{z_1 \geq n\alpha} \mathbb{1}_{z_2 > 0} \dots \mathbb{1}_{z_n > 0}$$

Autrement dit, les  $Z_i$  sont indépendants, avec  $Z_1 \sim n\alpha + \mathcal{E}(\frac{1}{\theta})$ , et  $Z_i \sim \mathcal{E}(\frac{1}{\theta})$  pour  $i \geq 2$ . Finalement, constatant que  $\hat{\alpha} = \frac{1}{n}Z_1$  et  $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n Z_i$ , on conclut que  $\hat{\alpha}$  et  $\hat{\theta}$  sont indépendants.

★  
★ ★

## Énoncé de l'exercice 2

Cet exercice présente les bases de l'estimation bayésienne.

☞ Q1 Soit  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathcal{P})$  un espace probabilisé,  $A$  un événement non-vide et  $(H_1, \dots, H_n)$  un système complet d'hypothèses incompatibles non-vides (c'est-à-dire une partition de  $\Omega$ ).

Exprimer  $\mathbb{P}(H_i|A)$  en fonction des probabilités de  $H_1, \dots, H_n$ , de celles de  $A$  conditionnellement à  $H_i$  et inversement, mais pas de  $\mathbb{P}(A)$ .

☞ Q2 Soit  $(X_1, \dots, X_n) \underset{iid}{\sim} \mathcal{L}_\theta$ , de paramètre inconnu  $\theta \in \Theta$ .

On suppose que  $\theta$  suit une loi *a priori* de densité  $\pi_0$  sur  $\Theta$ .

Donner la densité  $\pi_{\cdot|x}$  de la loi *a posteriori* de  $\theta$  conditionnellement à l'observation de  $X = x$ .

☞ Q3 Définissons pour tout estimateur  $\hat{\theta}(x)$  de  $\theta$  la fonction de risque quadratique

$$R_\nu(\hat{\theta}) = \int_{\Theta} \mathbb{E}_\theta \left( \hat{\theta}(X) - \theta \right)^2 d\nu(\theta)$$

où  $\nu$  désigne une loi quelconque sur  $\Theta$  (par exemple  $d\nu = \pi_0 d\lambda$ ).

On appelle *estimateur bayésien* de  $\theta$  l'estimateur  $\hat{\theta}$  qui minimise le risque associé.

Montrer que l'estimateur bayésien de  $\theta$  associé au risque  $R_{\pi_0}$  est

$$\hat{\theta}(x) = \mathbb{E}_{\pi_{\cdot|x}}(\theta) = \int_{\Theta} \theta \pi_{\cdot|x}(\theta) d\theta$$

- ⇒ Q4 Donner l'estimateur bayésien de  $\theta \in [a, b]$  lorsque  $\pi_0 = \mathcal{U}_{[a,b]}$  en fonction de la densité de la loi  $\mathcal{L}_\theta$  de  $X$ .  
Expliciter cet estimateur lorsque  $\mathcal{L}_\theta$  est la loi exponentielle  $\mathcal{E}(\theta)$  de paramètre inconnu  $\theta > 0$ .

## Corrigé de l'exercice 2

- ⇒ Q1 On a par définition de la probabilité conditionnelle

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(A|H_i) = \frac{\mathbb{P}(A \cap H_i)}{\mathbb{P}(H_i)}$$

et donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A \cap \Omega) \\ &= \mathbb{P}(A \cap (\cup_{i=1}^n H_i)) \quad \text{car } (H_1, \dots, H_n) \text{ est complet} \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \cap H_i) \quad \text{car } (H_1, \dots, H_n) \text{ est disjoint} \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|H_i) \mathbb{P}(H_i) \quad \text{car chaque } H_i \text{ est non-vide} \end{aligned}$$

(cette formule est dite *des probabilités totales*).

Par ailleurs on a

$$\mathbb{P}(A|H_i) \mathbb{P}(H_i) = \mathbb{P}(A \cap H_i) = \mathbb{P}(H_i|A) \mathbb{P}(A)$$

et donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(H_i|A) &= \frac{\mathbb{P}(H_i) \mathbb{P}(A|H_i)}{\mathbb{P}(A)} \\ &= \boxed{\frac{\mathbb{P}(H_i) \mathbb{P}(A|H_i)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(H_i) \mathbb{P}(A|H_i)}} \end{aligned}$$

Cette relation exprime la probabilité d'un événement  $H_i$ , une fois connue la réalisation de  $A$ , en fonction de sa probabilité a priori.

- ⇒ Q2 Dans le cas où  $\Theta = \{\theta_i / i \in \mathbb{N}\}$  est dénombrable il suffit d'appliquer le résultat précédent à  $A = \{(x_1, \dots, x_n)\}$  et  $\forall i \in \mathbb{N}, H_i = \{\theta_i\}$ .

Dans le cas général le calcul est similaire : la formule des probabilités totales s'écrit pour toute  $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^n$  mesurable

$$\mathbb{P}(X \in \mathcal{A}) = \int_{\Theta} \mathbb{P}(X \in \mathcal{A} | \theta = \theta_0) \mathbb{P}(\theta = \theta_0) d\theta_0$$

et par suite pour toute  $\mathcal{B} \subset \Theta$  mesurable, à supposer que  $\mathbb{P}(X \in \mathcal{A}) \neq 0$

$$\mathbb{P}(\theta \in \mathcal{B} | X \in \mathcal{A}) = \frac{\mathbb{P}(\theta \in \mathcal{B}) \mathbb{P}(X \in \mathcal{A} | \theta \in \mathcal{B})}{\mathbb{P}(X \in \mathcal{A})}$$

et donc

$$\pi_{\cdot|x}(\theta | X = x) = \frac{f_{\mathcal{L}_\theta^{\otimes n}}(x_1, \dots, x_n) \pi_0(\theta)}{\int_{\Theta} f_{\mathcal{L}_\theta^{\otimes n}}(x_1, \dots, x_n) \pi_0(\theta) d\theta}$$

☞ Q3 Attention aux notations :  $\mathbb{E}_\theta(\dots \hat{\theta}(X) \dots \theta \dots)$  désigne l'espérance sur la variable  $X$ , espérance qui dépend de  $\theta$ , et non pas une espérance sur la variable  $\theta$ . En outre l'énoncé suppose ici que  $\Theta$  est de dimension 1 (sans quoi il faudrait noter  $\mathbb{E}_\theta \|\hat{\theta}(x) - \theta\|^2$ ).

Soit  $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$ .

Première méthode :

On cherche l'élément  $T : \mathcal{X} \rightarrow \Theta$  (qui est une *fonction*) qui minimise

$$\begin{aligned} R_{\pi_0}(T) &= \int_{\Theta} \int_{\mathcal{X}} (T(x) - \theta)^2 f_{\mathcal{L}_\theta}(x) \pi_0(\theta) dx d\theta \\ &= \int_{\mathcal{X}} \left( \int_{\Theta} (T(x) - \theta)^2 f_{\mathcal{L}_\theta}(x) \pi_0(\theta) d\theta \right) dx \quad \text{d'après Fubini} \end{aligned}$$

Or la fonction

$$\phi : \begin{pmatrix} \mathcal{X}^2 & \rightarrow & \Theta \\ (x, t) & \mapsto & \int_{\Theta} (t - \theta)^2 f_{\mathcal{L}_\theta}(x) \pi_0(\theta) d\theta \end{pmatrix}$$

est positive, donc il suffit de minimiser point-par-point :

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin}_{T: \mathcal{X} \rightarrow \Theta} \int_{\mathcal{X}} \phi(T(x)) dx = \begin{pmatrix} \mathcal{X} & \rightarrow & \Theta \\ x & \mapsto & \operatorname{argmin}_{t \in \Theta} \phi(x, t) \end{pmatrix}$$

Soit donc  $x \in \mathcal{X}$  **fixé**, et calculons le nombre  $\hat{\theta}(x) = \operatorname{argmin}_{t \in \Theta} \phi(x, t)$ . On a

$$\begin{aligned} \phi(x, t) &= \int_{\Theta} (t - \theta)^2 f_{\mathcal{L}_\theta}(x) \phi_0(\theta) d\theta \\ &= \underbrace{\left( \int_{\Theta} f_{\mathcal{L}_\theta}(x) \phi_0(\theta) d\theta \right)}_{a>0} t^2 + \underbrace{\left( -2 \int_{\Theta} \theta f_{\mathcal{L}_\theta}(x) \phi_0(\theta) d\theta \right)}_b t + \underbrace{\left( \int_{\Theta} \theta^2 f_{\mathcal{L}_\theta}(x) \phi_0(\theta) d\theta \right)}_c \end{aligned}$$

Donc  $\phi(x, t) = at^2 + bt + c$  est une parabole en  $t$  (à  $x$  fixé), et est donc extrême en  $-\frac{b}{2a}$ ; comme  $a > 0$  elle est *minimale* en  $-\frac{b}{2a}$  et donc

$$\begin{aligned} \operatorname{argmin}_{t \in \Theta} \phi(x, t) &= -\frac{b}{2a} \\ &= \frac{\int_{\Theta} \theta f_{\mathcal{L}_\theta}(x) \phi_0(\theta) d\theta}{\int_{\Theta} f_{\mathcal{L}_\theta}(x) \phi_0(\theta) d\theta} \\ &= \int_{\Theta} \theta \frac{f_{\mathcal{L}_\theta}(x) \phi_0(\theta)}{\int_{\Theta} f_{\mathcal{L}_\theta}(x) \phi_0(\theta) d\theta} d\theta \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\forall x \in \mathcal{X}, \hat{\theta}(x) = \int_{\Theta} \theta \pi_{\cdot|x}(\theta) d\theta$$

⇒ Q4 Dans le cas d'une loi a priori uniforme on a simplement

$$\begin{aligned} \hat{\theta}(x) &= \int_{[a,b]} \theta \pi_{\cdot|x}(\theta) d\theta \\ &= \int_{[a,b]} \theta \frac{f_{\mathcal{L}_\theta}(x_1, \dots, x_n) \frac{1}{b-a}}{\int_{\Theta} f_{\mathcal{L}_\theta}(x_1, \dots, x_n) \frac{1}{b-a} d\theta} d\theta \\ &= \frac{\int_{[a,b]} \theta f_{\mathcal{L}_\theta}(x) d\theta}{\int_{[a,b]} f_{\mathcal{L}_\theta}(x) d\theta} \end{aligned}$$

Dans le cas où  $\mathcal{L}_\theta = \mathcal{E}(\theta)$  la densité de l'échantillon indépendant  $(X_1, \dots, X_n)$  est

$$\begin{aligned} f_{\mathcal{E}(\theta)^{\otimes n}}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) &= \prod_{i=1}^n (\theta e^{-\theta x_i} \mathbb{1}_{x_i \geq 0}) \\ &= \theta^n e^{-\theta(x_1 + \dots + x_n)} \mathbb{1}_{\min_i x_i \geq 0} \end{aligned}$$

et donc pour  $(x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^+)^n$  il vient

$$\begin{aligned} \hat{\theta}(x) &= \frac{\int_{[a,b]} \theta^{n+1} e^{-\theta(x_1 + \dots + x_n)} d\theta}{\int_{[a,b]} \theta^n e^{-\theta(x_1 + \dots + x_n)} d\theta} \\ &= \frac{\left[ \theta^{n+1} \frac{e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i}}{-\sum_{i=1}^n x_i} \right]_a^b - \int_{[a,b]} (n+1) \theta^n \frac{e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i}}{-\sum_{i=1}^n x_i} d\theta}{\int_{[a,b]} \theta^n e^{-\theta(x_1 + \dots + x_n)} d\theta} \quad \text{par parties} \\ &= \frac{1}{\sum_{i=1}^n x_i} \left( n+1 - \frac{b^{n+1} e^{-b \sum_{i=1}^n x_i} - a^{n+1} e^{-a \sum_{i=1}^n x_i}}{\int_{[a,b]} \theta^n e^{-\theta(x_1 + \dots + x_n)} d\theta} \right) \end{aligned}$$

Ainsi  $\hat{\theta}(x) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n x_i} \left( n+1 - \frac{\bar{\theta}^{n+1} e^{-\bar{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}}{\int_{[0, \bar{\theta}]} \theta^n e^{-\theta(x_1 + \dots + x_n)} d\theta} \right)$  lorsque  $\Theta = [0, \bar{\theta}]$  par exemple.

L'estimateur du maximum de vraisemblance de  $\theta$ , par comparaison, est  $\hat{\theta}^{mv}(x) = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}$ .

★  
★ ★

### Énoncé de l'exercice 3

Un des premiers exemples d'utilisation de la Statistique Bayésienne remonte à Laplace, en 1786. Celui-ci décida de répondre à la question suivante : au regard du nombre observé  $n_g$  de naissances masculines parmi  $n$  naissances à Paris, peut-on dire si la probabilité  $p$  qu'un enfant qui naisse soit un garçon est supérieure à  $\frac{1}{2}$  ?

☞ Q1 Laplace munit le paramètre  $p$  d'une loi a priori uniforme sur l'intervalle  $[0, 1]$ . Ce choix vous semble-t-il naturel ?

☞ Q2 Exprimer alors la loi a posteriori de  $p$ , puis exprimer la probabilité  $\mathbb{P}(p > \frac{1}{2} | N_g = n_g)$  sous forme d'un rapport d'intégrales.

Remarque : Laplace, obtint, pour  $n = 493472$  et  $n_g = 251527$ , une probabilité  $\mathbb{P}(p > \frac{1}{2} | N_g = n_g) \simeq 1 - 1.15 \cdot 10^{-42}$  et en conclut que  $p$  était très vraisemblablement plus grand que  $\frac{1}{2}$ .

☞ Q3 Donner l'espérance et la variance de la loi a posteriori en fonction de la vraie valeur  $p_0$  du paramètre  $p$ . Quelles sont leurs limites lorsque  $n \rightarrow +\infty$  ?

Rappel : la loi Beta  $\mathcal{B}(\alpha, \beta)$  de paramètres  $\alpha > 0$ ,  $\beta > 0$  admet pour densité :

$$f_{\alpha, \beta}(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)} \mathbf{1}_{[0,1]}(x)$$

où  $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx$ .

Son espérance est  $\mathbb{E}(X) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$  et sa variance  $\mathbb{V}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$ .

☞ Q4 Ces limites sont-elles modifiées si on choisit pour loi a priori sur  $p$  une loi  $\mathcal{B}(\alpha, \beta)$  quelconque ? Pourquoi est-il judicieux malgré tout de se restreindre au moins à la classe des lois a priori telles que  $\alpha = \beta$  ?

### Corrigé de l'exercice 3

☞ Q1 Laplace considère en fait de ne pas détenir d'information sur  $p$  autre que celle apportée par les observations : en d'autres termes, il n'a pas d'"a priori" sur  $p$ , ce qu'il modélise par une loi a priori uniforme. Cela revient intuitivement à donner une "probabilité égale" à toutes les valeurs possibles de  $p$ . Mais cette intuition est en fait trompeuse : si on change la paramétrisation du modèle (en remplaçant  $p$  par  $q = p^2$  par exemple), on se rend compte alors que la loi a priori sur  $q$  n'est plus uniforme ! Cette reparamétrisation ne nous a pourtant apporté aucune information supplémentaire. Ce paradoxe illustre la difficulté de bien choisir une loi a priori, surtout dans un cadre non-informatif (c'est à dire lorsqu'aucune information n'est disponible a priori). Cependant, nous verrons en 4) qu'il est assez simple de se restreindre au moins à un choix limité de lois a priori raisonnables.

☞ Q2 La densité de la loi a posteriori  $\pi(\theta|x_1, \dots, x_n)$  du paramètre  $\theta$  s'écrit sous la forme (voir exercice 2) :

$$\pi(\theta|x_1, \dots, x_n) = \frac{\pi(\theta)\mathbb{P}(x_1, \dots, x_n|\theta)}{\int_{\Theta} \pi(\theta)\mathbb{P}(x_1, \dots, x_n|\theta)d\theta}$$

Il vient

$$\begin{aligned} \pi(p|N_g = n_g) &= \frac{\pi(p)\mathbb{P}(N_g = n_g|p)}{\int_0^1 \pi(p)\mathbb{P}(N_g = n_g|p)dp} \\ &= \frac{p^{n_g}(1-p)^{n-n_g}}{\int_0^1 p^{n_g}(1-p)^{n-n_g}dp} \end{aligned}$$

Par conséquent

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(p > \frac{1}{2} | N_g = n_g) &= \int_{[\frac{1}{2}, 1]} \frac{\pi(p)\mathbb{P}(N_g = n_g|p)}{\int_0^1 \pi(p)\mathbb{P}(N_g = n_g|p)dp} \mathbb{1}_{p > \frac{1}{2}} dp \\ &= \frac{\int_{\frac{1}{2}}^1 p^{n_g}(1-p)^{n-n_g} dp}{\int_0^1 p^{n_g}(1-p)^{n-n_g} dp} \end{aligned}$$

☞ Q3 Notons  $\pi_p$  la densité de la loi a posteriori :  $\pi_p$  est la densité de la loi  $\mathcal{B}(n_g + 1, n - n_g + 1)$ . Son espérance et sa variance sont donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\pi_p}[p] &= \frac{n_g + 1}{n + 2} \\ \mathbb{V}_{\pi_p}[p] &= \frac{(n_g + 1)(n - n_g + 1)}{(n + 2)^2(n + 3)} \end{aligned}$$

Or  $n_g = \sum_{i=1}^n g_i$  où  $g_i = \mathbb{1}_{\text{l'enfant } i \text{ est un garçon}} \underset{iid}{\rightsquigarrow} \mathcal{B}(1, p_0)$ .

Donc en vertu de la loi forte des grands nombres  $\frac{n_g}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g_i \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} p_0$  et donc

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\pi_p}[p] &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} p_0 \\ \mathbb{V}_{\pi_p}[p] &\underset{n \rightarrow +\infty}{\rightsquigarrow p.s.} \frac{p_0(1-p_0)}{n} \end{aligned}$$

En d'autres termes, lorsque  $n \rightarrow +\infty$  la loi a posteriori se "rétrécit" (sa variance tend vers 0) et se concentre autour de la vraie valeur  $p_0$ . Ce résultat est intuitif : plus on dispose d'observations, plus faible est l'incertitude sur la valeur du paramètre  $p$ .

☞ Q4 Si on change la loi a priori uniforme (qui correspond d'ailleurs à une loi  $\mathcal{B}(1, 1)$ ) pour une loi a priori plus générale  $\mathcal{B}(\alpha, \beta)$ , on obtient une loi a posteriori :

$$\begin{aligned} \pi(p|N_g = n_g) &\propto p^{\alpha-1}(1-p)^{\beta-1}p^{n_g}(1-p)^{n-n_g}\mathbb{1}_{[0,1]}(p) \\ &\propto p^{\alpha+n_g-1}(1-p)^{\beta+n-n_g-1}\mathbb{1}_{[0,1]}(p) \end{aligned}$$

(où  $\propto$  signifie "proportionnel à")

La loi a posteriori est donc une loi  $\mathcal{B}(n_g + \alpha, n - n_g + \beta)$ . On vérifie alors facilement que  $\mathbb{E}_{\pi_p}[p]$  et  $\mathbb{V}_{\pi_p}[p]$  conservent le même comportement asymptotique que dans le cas précédent. En effet, plus grand est le nombre d'observations, plus le poids de l'a priori est faible, et ce poids devient nul asymptotiquement.

Cependant, la Statistique Bayésienne ne repose pas sur des justifications asymptotiques. A distance finie (c'est à dire pour un nombre fini d'observations), une loi a priori mal choisie peut sérieusement déformer la loi a posteriori, et mener à une inférence complètement éronée. Ainsi, au vu du problème posé (situer  $p$  dans l'un des deux intervalles  $[0, \frac{1}{2}]$  ou  $[\frac{1}{2}, 1]$ ), on n'a aucune raison de favoriser *a priori* l'une de ces deux régions, seules les observations pouvant nous permettre de les départager. Il est donc naturel de se restreindre au moins aux lois a priori symétriques ( $\alpha = \beta$ ). Parmi celles-ci, on peut aussi écarter les lois de très faible variance (ie telles que  $\alpha$  prend de fortes valeurs, ex :  $\mathcal{B}(10, 10)$ ), qui privilégient inutilement un voisinage trop restreint du point  $\frac{1}{2}$ .

Finalement, la loi a priori uniforme proposée par Laplace semble donc un choix raisonnable parmi d'autres, au moins pour le problème posé. Il est en fait possible de proposer une loi plus satisfaisante (dite loi a priori de Jeffreys, ici  $\mathcal{B}(1/2, 1/2)$ ) qui permette de s'affranchir du paradoxe de la reparamétrisation présenté en 1).

★  
★ ★



## 5 Travaux Dirigés n°5

### Énoncé de l'exercice 1

On souhaite évaluer et analyser le phénomène du chômage. Pour cela, on dispose de  $n$  observations sur les durées  $y_i, 1 \leq i \leq n$ , pendant lesquelles des individus sont restés sans emploi.

On suppose dans la suite que les variables aléatoires correspondantes  $(Y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  sont i.i.d. et suivent la loi de Weibull de paramètres  $a$  et  $b$ . On rappelle que cette loi est continue sur  $\mathbb{R}^+$  et admet la fonction de répartition pour  $y > 0$

$$F(y; a, b) = 1 - \exp(-ay^b)$$

On définit la fonction de survie par

$$S(y) = 1 - F(y)$$

et la fonction de hasard par  $h(y) = \frac{f(y)}{S(y)}$ .

#### ■ Partie 1 Généralités

- ☞ Q1 Donner l'expression de la fonction de hasard du modèle.
- ☞ Q2 Quelle est en terme de chômage l'interprétation de la fonction de hasard ? Expliquer alors pourquoi il est important de considérer le cas particulier où cette fonction est constante. Pour quelles valeurs des paramètres, la fonction de hasard est-elle constante ? Quelles sont alors les lois des durées de chômage ?
- ☞ Q3 Étudier l'évolution de la fonction de hasard en fonction de  $a$ , puis en fonction de  $b$ .

#### ■ Partie 2 Estimation contrainte

On suppose dans cette partie  $b = 1$ . Le modèle est alors uniquement paramétré par  $a$ .

- ☞ Q1 Le modèle est-il exponentiel ? Si oui, expliciter une statistique exhaustive.
- ☞ Q2 Déterminer le vecteur du score et vérifier directement qu'il est centré.
- ☞ Q3 Quel est l'estimateur du maximum de vraisemblance  $\hat{a}_0$  de  $a$  ? Est-il sans biais, y a-t-il surestimation ou sous-estimation systématique ?
- ☞ Q4 Déterminer la variance asymptotique de cet estimateur  $\hat{a}_0$

#### ■ Partie 3 Estimation non contrainte

On considère maintenant le cas où  $a$  et  $b$  peuvent a priori prendre toutes valeurs positives.

- ☞ Q1 Le modèle est-il exponentiel avec une statistique exhaustive dont la taille est indépendante du nombre  $n$  d'observations ? Si oui, expliciter une telle statistique.
- ☞ Q2 Écrire les équations de vraisemblance. Sont-elles résolubles sous forme analytique ?

- ☞ Q3 Donner la forme de la variance asymptotique de l'estimateur du maximum vraisemblance  $\begin{pmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{pmatrix}$  du paramètre  $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ .
- ☞ Q4 En déduire la variance asymptotique de  $\hat{a}$  lorsque  $b = 1$ .  
Comparer alors les estimateurs  $\hat{a}$  et  $\hat{a}_0$  lorsque  $b = 1$ .  
Quelle conclusion en tirer ?
- ☞ Q5 Quelle démarche pourrait-on proposer pour étudier la distribution de l'estimateur  $\begin{pmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{pmatrix}$  lorsque l'échantillon est de petite taille, par exemple  $n = 10$  ?

#### ■ Partie 4 Cas indépendant - non équidistribué

On considère maintenant le cas de  $T$  observations  $Y_1, \dots, Y_T$  indépendantes, de lois respectives :

$$F(y; e^{\alpha t}, 1), \quad t \in \llbracket 1, T \rrbracket, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

- ☞ Q1 Déterminer la vraisemblance du modèle  $\mathcal{L}$ , et vérifier qu'elle est concave en  $\alpha$  à  $(y_1, \dots, y_T)$  fixé.  
En déduire l'équation caractérisant l'estimateur du maximum de vraisemblance  $\widehat{\alpha}_T$  de  $\alpha$ .
- ☞ Q2 On note  $u_t = y_t - e^{-\alpha_T t}$ .  
Donner l'interprétation de  $u_t$ .
- ☞ Q3 Montrer que l'équation de la vraisemblance correspond à la condition d'orthogonalité de  $(u_1, \dots, u_T)$  et de  $1, \dots, T$  pour un certain produit scalaire que l'on précisera.

### Corrigé de l'exercice 1

- ☞ Q1 Par définition on a pour  $y \in \mathbb{R}^+$

$$\begin{aligned} f(y; a, b) &= \frac{\partial F}{\partial \cdot}(y, a, b) \\ &= aby^{b-1}e^{-ay^b} \end{aligned}$$

Il en découle que

$$h(y; a, b) = aby^{b-1}\mathbb{1}_{y \geq 0}$$

- ☞ Q2 La fonction de hasard  $h(y)$  s'écrit comme le rapport  $\frac{f(y)}{S(y)}$ . Or

$$\begin{aligned} f(y) &= \frac{\partial F(\cdot; a, b)}{\partial y}(y) \\ &= \lim_{dy \rightarrow 0^+} \frac{\mathbb{P}(Y \in [y, y + dy])}{dy} \end{aligned}$$

et par ailleurs  $S(y) = 1 - F(y) = \mathbb{P}(Y \geq y)$ .

Autrement dit

$$\begin{aligned} h(y) &= \lim_{dy \rightarrow 0^+} \frac{1}{dy} \frac{\mathbb{P}(Y \in [y, y + dy])}{\mathbb{P}(Y \geq y)} \\ &= \lim_{dy \rightarrow 0^+} \frac{1}{dy} \frac{\mathbb{P}(Y \in [y, y + dy] \wedge Y \geq y)}{\mathbb{P}(Y \geq y)} \\ &= \lim_{dy \rightarrow 0^+} \frac{1}{dy} \mathbb{P}(NON(Y \geq y + dy) \mid Y \geq y) \end{aligned}$$

En d'autres termes  $h(y)dy$  mesure la probabilité, pour un individu encore au chômage à la date  $y$ , de **sortir du chômage** peu après  $y$  (au sens "après  $y + dy$ ", ceci pour  $dy$  "voisin" de 0).

Supposer que  $h$  est constante revient à supposer que la probabilité de sortir d'une période de chômage de durée  $dy$  ne dépend pas de sa date  $y$ , c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'*effet mémoire*. Sachant que

$$\begin{aligned} h(y) &= \frac{aby^{b-1}e^{-aby^b}}{e^{-ay^b}} \\ &= aby^{b-1} \end{aligned}$$

cette condition est vérifiée **si, et seulement si**  $b = 1$ .

Lorsque cette condition est vérifiée, on constate que la loi de durée du chômage s'écrit simplement pour  $y \geq 0$

$$f(y; a, 1) = ae^{-ay}$$

dont on remarque qu'il s'agit d'une loi exponentielle de paramètre  $a$ .

⇒ Q3 Etudions les variations de  $h(y; \cdot, \cdot)$  en fonction de  $a$  et  $b$  à  $y \geq 0$  donné.

Il vient

– Selon  $a$  :

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial a}(y, a, b) &= by^{b-1} \\ &> 0 \quad \text{car } b > 0 \end{aligned}$$

Ainsi la situation du chômage s'améliore (au sens où la probabilité de sortie s'accroît) lorsque  $a$  s'accroît.

– Selon  $b$  :

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial b}(y, a, b) &= ay^{b-1} + ab \ln(y)y^{b-1} \\ &= ay^{b-1}(1 + b \ln(y)) \end{aligned}$$

En conséquence

– Si  $y \in ]0, e^{-\frac{1}{b}}[$ , soit si  $b > -\frac{1}{\ln(y)}$ , la situation du chômage *se détériore* lorsque  $b$  croît.

– Si  $y \in ]e^{-\frac{1}{b}}, +\infty[$ , soit si  $b < -\frac{1}{\ln(y)}$ , la situation du chômage *s'améliore* lorsque  $b$  croît.

On suppose dans cette partie  $b = 1$ . Le modèle est alors uniquement paramétré par  $a$ .

⇒ Q1 La vraisemblance du modèle est donnée pour  $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$  par

$$\begin{aligned} L(y; a, 1) &= \prod_{i=1}^n (ae^{-ay_i} \mathbf{1}_{y_i \geq 0}) \\ &= (a^n \mathbf{1}_{\min_i y_i \geq 0}) \cdot e^{-a(\sum_{i=1}^n y_i)} \end{aligned}$$

On constate donc que le modèle est exponentiel, de statistique exhaustive  $T(Y) = \sum_{i=1}^n Y_i$ .

⇒ Q2 La log-vraisemblance est alors pour  $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{+n}$

$$\ln L(y; a, 1) = n \ln a - a \sum_{i=1}^n y_i$$

Le score s'écrit donc

$$\begin{aligned} S_a(y; a, 1) &= \frac{\partial \ln L}{\partial a}(y; a, 1) \\ &= \frac{n}{a} - \sum_{i=1}^n y_i \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(y_i) &= \int_{\mathbb{R}} y_i \cdot ae^{-ay_i} \mathbf{1}_{y_i \geq 0} dy_i \\ &= - \int_0^{+\infty} (-au) e^{-au} du \\ &= + \frac{1}{a} [e^{-au}]_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{a} \end{aligned}$$

Il s'ensuit que

$$\mathbb{E}(S_a(y; a, 1)) = \frac{n}{a} - \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(y_i) = 0$$

de sorte que le vecteur score est bien centré (ce qui est une propriété générale, voir TD 2, exercice 2)

⇒ Q3 De la condition nécessaire  $\frac{\partial \ln L}{\partial a}(\hat{a}_0) = 0$  on tire  $\hat{a}_0 = \frac{1}{\bar{y}}$ ; réciproquement  $\hat{a}_0$  maximise bien la log-vraisemblance car celle-ci est concave.

Par ailleurs, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{a}_0) &= \mathbb{E}\left(\frac{1}{\bar{y}}\right) \\ &> \frac{1}{\mathbb{E}(\bar{y})} \quad (\text{d'après l'inégalité de Jensen}) \\ &= a \end{aligned}$$

Autrement dit,  $\hat{a}_0$  est biaisé et surestime systématiquement la vraie valeur  $a$ .

On pourrait même calculer le biais exact, en s'appuyant sur le fait que  $(Y_1 + \dots + Y_n) \sim \Gamma(n, a)$  et en calculant explicitement  $\int_{\mathbb{R}} \frac{n}{s} f_{\Gamma(a)}(s) ds = \frac{n}{n-1} a$ ; on en déduirait que  $\frac{n-1}{n} \hat{a}_0$  est un estimateur sans biais de  $a$ .

☞ Q4 On a

$$I_n(a) = -\mathbb{E} \left( \frac{\partial^2 \ln L}{\partial a^2} = -\frac{n}{a^2} \right)$$

et donc

$$\mathbb{V}_{as}(\hat{a}_0) = \frac{a^2}{n}$$

(Attention, c'est bien  $I_n(a)^{-1}$  et non pas  $I_1(a)^{-1}$  car on étudie la loi asymptotique de  $(\hat{a}_0 - \mathbb{E}(\hat{a}_0))$  et non pas celle de  $\sqrt{n}(\hat{a}_0 - \mathbb{E}(\hat{a}_0))$ )

☞ Q1 La vraisemblance du modèle est donnée pour  $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$  par

$$\begin{aligned} L(y; a, b) &= \prod_{i=1}^n \left( aby_i^{b-1} e^{-ay_i^b} \mathbf{1}_{y_i \geq 0} \right) \\ &= ((ab)^n \mathbf{1}_{\min_i y_i \geq 0}) \cdot \left( \prod_{i=1}^n y_i^{b-1} \right) \cdot e^{-\sum_{i=1}^n (a y_i^b)} \end{aligned}$$

On constate donc que le modèle n'est pas exponentiel, car on ne peut dissocier les termes en  $y_i$  du paramètre  $(a, b)$  là où ils interviennent (à savoir  $\sum_{i=1}^n y_i^b$ ). Donc en vertu du théorème de factorisation  $(Y_1, \dots, Y_n)$  est exhaustive et minimale, et il n'existe donc pas de statistique exhaustive comportant moins de  $n$  composantes.

☞ Q2 La log-vraisemblance s'écrit pour  $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{+n}$

$$\ln L(y; a, b) = n \ln a + n \ln b + (b-1) \sum_{i=1}^n \ln y_i - a \sum_{i=1}^n y_i^b$$

On a

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial a}(y; a, b) &= \frac{n}{a} - \sum_{i=1}^n y_i^b \\ \frac{\partial \ln L}{\partial b}(y; a, b) &= \frac{n}{b} + \sum_{i=1}^n \ln y_i - a \sum_{i=1}^n \ln y_i y_i^b \end{cases}$$

et donc l'estimateur  $(\hat{a}, \hat{b})$  de  $(a, b)$  vérifie

$$\begin{cases} \hat{a} &= \frac{n}{\sum_{i=1}^n y_i^{\hat{b}}} \\ \hat{a} \sum_{i=1}^n \ln y_i y_i^{\hat{b}} - \frac{n}{\hat{b}} &= \sum_{i=1}^n \ln y_i \end{cases}$$

On constate que  $\hat{b}$ , et par suite  $\hat{a}$ , n'est pas exprimable sous forme analytique. Pour autant l'étude de la fonction  $\left( \begin{array}{l} \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ b \mapsto \frac{1}{b} + \alpha - \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i y_i^b}{\sum_{i=1}^n y_i^b} \end{array} \right)$  assure de l'existence et de l'unicité de  $\hat{b}$ , et donc de  $\hat{a}$ .

☞ Q3 On a successivement

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \ln L}{\partial a^2}(y; a, b) &= -\frac{n}{a^2} \\ \frac{\partial^2 \ln L}{\partial a \partial b}(y; a, b) &= -\sum_{i=1}^n (\ln y_i y_i^b) \\ \frac{\partial^2 \ln L}{\partial b^2}(y; a, b) &= -\frac{n}{b^2} - a \sum_{i=1}^n ((\ln y_i)^2 y_i^b) \end{aligned}$$

En conséquence

$$\mathbb{V}_{as} \left( \begin{pmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \frac{n}{a^2} & n\mathbb{E}(y_1^b \ln y_1) \\ n\mathbb{E}(y_1^b \ln y_1) & \frac{n}{b^2} + na\mathbb{E}((\ln y_i)^2 y_i^b) \end{pmatrix}^{-1}$$

Il reste alors à exprimer  $\mathbb{E}(y_1^b \ln(y_1)^i)$  pour  $i \in \{1, 2\}$ ; ce calcul peut être fait au moyen des intégrales eulériennes.

Remarquons pour ce faire que si  $Z$  suit une loi de Weibull de paramètre  $(\alpha, \beta)$ , de densité  $f_{\alpha, \beta}(x) = \alpha \theta x^{\alpha-1} e^{-\theta x^\alpha} \mathbb{1}_{x>0}$ , alors pour  $p \in \mathbb{N}^*$  on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Z^\alpha \ln(Z)^p) &= \int_0^{+\infty} \theta z^\alpha \ln^p(z) \alpha z^{\alpha-1} e^{-\theta z^\alpha} dz \\ &= \frac{1}{\alpha^p \theta} \int_0^{+\infty} \ln^p\left(\frac{u}{\theta}\right) u e^{-u} du \quad \text{en posant } u = \theta z^\alpha \end{aligned}$$

En particulier pour  $p \in \{1, 2\}$  on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Z^\alpha \ln(Z)) &= \frac{1}{\alpha \theta} \int_0^{+\infty} \ln\left(\frac{u}{\theta}\right) u e^{-u} du \\ \mathbb{E}(Z^\alpha (\ln Z)^2) &= \frac{1}{\alpha^2 \theta} \int_0^{+\infty} \ln\left(\frac{u}{\theta}\right)^2 u e^{-u} du \end{aligned}$$

Or ( TD 2, exercice 2 )

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^\alpha \ln(X)) &= \frac{1 - \gamma - \ln \theta}{\theta \alpha} \\ \mathbb{E}(X^\alpha (\ln X)^2) &= \frac{1}{\alpha^2 \theta} \left( \frac{\pi^2}{6} - 2\gamma + \gamma^2 - 2(1 - \gamma) \ln(\theta) + \ln(\theta)^2 \right) \end{aligned}$$

Ceci permet alors de conclure en posant  $\theta = a$  et  $\alpha = b$  que<sup>7</sup>

$$\mathbb{V}_{as} \left( \begin{pmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \frac{n}{a^2} & n \frac{1-\gamma-\ln a}{ab} \\ n \frac{1-\gamma-\ln a}{ab} & \frac{n}{b^2} \left( 1 + \frac{\pi^2}{6} - 2\gamma + \gamma^2 - 2(1-\gamma) \ln a + (\ln a)^2 \right) \end{pmatrix}^{-1}$$

☞ Q4 Remarquons que pour toute matrice  $A$ ,  $A^{-1} = \frac{1}{|A|} Com(A)'$  où  $Com(A)$  désigne la comatrice de  $A$ ; par suite

$$I_n(a, 1)^{-1} = \frac{1}{|I_n(a, 1)|} \begin{pmatrix} n + na\mathbb{E}((\ln y_1)^2 y_1) & -n\mathbb{E}(y_1 \ln y_1) \\ -n\mathbb{E}(y_1 \ln y_1) & \frac{n}{a^2} \end{pmatrix}$$

Par ailleurs,

$$|I_n(a, 1)| = \frac{n}{a^2} (n + na\mathbb{E}((\ln y_1)^2 y_1)) - (n\mathbb{E}(y_1 \ln y_1))^2$$

<sup>7</sup>Bien que la tentation soit forte, nous résisterons ici au plaisir d'inverser cette matrice.

En conséquence,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}_{as}(\hat{a}) &= \frac{n + na\mathbb{E}((\ln y_1)^2 y_1)}{|I_n(a, 1)|} \\
 &= \frac{n + na\mathbb{E}((\ln y_1)^2 y_1)}{\frac{n}{a^2} (n + na\mathbb{E}((\ln y_1)^2 y_1)) - (n\mathbb{E}(y_1 \ln y_1))^2} \\
 &= \frac{a^2}{n} \left( 1 + \frac{\frac{a^2}{n} (n\mathbb{E}(y_1 \ln y_1))^2}{(n + na\mathbb{E}((\ln y_1)^2 y_1)) - \frac{a^2}{n} (n\mathbb{E}(y_1 \ln y_1))^2} \right) \\
 &\geq \frac{a^2}{n} \\
 &= \mathbb{V}_{as}(\hat{a}_0)
 \end{aligned}$$

Ainsi estimer sous contrainte permet d'obtenir un estimateur *plus efficace* qu'estimer sans contrainte.

⇒ Q5 Lorsque l'échantillon est de petite taille, une simulation permettrait d'étudier la distribution de  $\begin{pmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{pmatrix}$ , de la façon suivante :

- Observant  $(y_1, \dots, y_n)$ , on en tire  $\begin{pmatrix} \hat{a}^0 \\ \hat{b}^0 \end{pmatrix}$  estimateur du maximum de vraisemblance de  $\begin{pmatrix} a^0 \\ b^0 \end{pmatrix}$ .
- Soit alors  $\mathcal{W}^0$  la loi d Weibull de paramètre  $\hat{a}^0, \hat{b}^0$ ; on tire alors un échantillon indépendant de taille  $N$  selon  $\mathcal{W}^0$ , soit  $(y_1^0, \dots, y_N^0)$ .
- de cet échantillon on tire alors  $\begin{pmatrix} \hat{a}^1 \\ \hat{b}^1 \end{pmatrix}$ , et ainsi de suite.

Bien-entendu, à la limite lorsque  $N \rightarrow +\infty$  on a  $\begin{pmatrix} \hat{a}^1 \\ \hat{b}^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{a}^0 \\ \hat{b}^0 \end{pmatrix}$ ; il en va de même lorsque le nombre d'itération devient arbitrairement grand.

L'idée serait donc plutôt de se limiter à une ou deux itérations, mais de **répéter le tirage** pour obtenir la distribution empirique de  $\begin{pmatrix} \hat{a}^1 \\ \hat{b}^1 \end{pmatrix}$ .

On considère maintenant le cas de  $T$  observations  $Y_1, \dots, Y_T$  indépendantes, de lois respectives :

$$F(y; e^{\alpha t}, 1), \quad t \in \llbracket 1, T \rrbracket, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

⇒ Q1 La vraisemblance du modèle est donnée pour  $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$  par

$$\begin{aligned}
 L(y; \alpha) &= \prod_{t=1}^T e^{\alpha t} e^{-e^{\alpha t} y_t} (\mathbf{1}_{y_t \geq 0}) \\
 &= \mathbf{1}_{\inf_{t \in \llbracket 1, T \rrbracket} y_t \geq 0} e^{\alpha \sum_{t=1}^T t} e^{-\sum_{t=1}^T e^{\alpha t} y_t}
 \end{aligned}$$

Une condition nécessaire sur l'estimateur  $\hat{a}$  de  $\alpha$  est donc

$$\sum_{t=1}^T (t y_t e^{t \hat{a}}) = \frac{T(T+1)}{2}$$

condition dont on vérifie qu'elle est suffisante puisque la log-vraisemblance est strictement concave car de dérivée seconde

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \alpha^2}(y; \alpha) = - \sum_{t=1}^T t^2 y_t e^{\alpha t} < 0 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^+$$

⇒ Q2 On a

$$\begin{aligned} u_t &= y_t - e^{-\hat{\alpha}t} \\ &= y_t - \mathbb{E}_{|\alpha=\hat{\alpha}}(y_t) \end{aligned}$$

Ainsi  $u_t$  représente l'erreur de la prévision empirique de  $y_t$ , différence entre la réalisation réelle de  $y_t$  et la meilleure prévision compte-tenu du modèle estimé.

⇒ Q3 On a

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln L}{\partial \alpha}(y, \alpha) &= \frac{T(T+1)}{2} - \sum_{t=1}^T t y_t e^{\alpha t} \\ &= \sum_{t=1}^T (t - t y_t e^{\alpha t}) \\ &= \sum_{t=1}^T t (1 - y_t e^{\alpha t}) \\ &= \sum_{t=1}^T t e^{\alpha t} (e^{-\alpha t} - y_t) \end{aligned}$$

de sorte que

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \alpha}(y, \hat{\alpha}) = \sum_{t=1}^T e^{\hat{\alpha}t} t u_t$$

Posons donc

$$\langle \cdot | \cdot \rangle_{\rho} : \left( \begin{array}{ccc} (\mathbb{R}^T)^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^+ \\ ((x_t)_t, (y_t)_t) & \mapsto & \sum_{t=1}^T \rho^t x_t y_t \end{array} \right)$$

Alors pour tout  $\rho \in \mathbb{R}^{+*}$ ,  $\langle \cdot | \cdot \rangle_{\rho}$  est un produit scalaire, et en outre

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \alpha}(y, \hat{\alpha}) = 0 \Leftrightarrow \langle (1, \dots, T) | u \rangle_{e^{\hat{\alpha}}} = 0$$

\*  
\* \*



## Énoncé de l'exercice 2

On étudie entre les dates 0 et  $T$  un groupe de  $n$  individus sans emploi à la date 0, et on cherche à modéliser les durées de chômage  $(T_i)_{i \in [1, n]}$ .

En pratique, on observe les durées de chômage en mois. Plus précisément, on ne dispose pas de la variable continue  $T_i$ , mais seulement de la variable discrète  $T_i^*$  donnée par

$$T_i^* = \lceil T_i \rceil$$

Autrement dit, la variable  $T_i^*$  vaut  $t + 1$  si l'individu  $i$  a retrouvé du travail entre le  $t$ -ème et  $(t + 1)$ -ième mois.

En outre entre  $t$  et  $t + 1$ , on suppose que :

- l'individu  $i$  reçoit  $N_t^i$  offres d'emploi, où  $N_t^i$  est une suite de variables i.i.d. de loi de Poisson  $\mathcal{P}(\lambda)$ ;
- si l'individu  $i$  est toujours au chômage à la date  $t$ , et si parmi les  $N_t^i$  offres qu'il reçoit, l'une au moins offre un salaire supérieur à une constante  $\xi_i$ , propre à l'individu (appelée salaire de réserve), alors l'individu n'est plus au chômage :  $(T_i^* = t + 1)$ ;
- les salaires des offres d'emploi sont tirés indépendamment des dates d'arrivée des offres et de leur nombre dans une loi de fonction de répartition  $F$ .

On suppose dans un premier temps pour simplifier que  $T = +\infty$ .

☞ Q1 Calculer  $\mathbb{P}(T_i^* = t + 1 | T_i > t)$  en fonction de  $F$ ,  $\xi_i$ ,  $\lambda$ .

☞ Q2 En déduire la vraisemblance de  $(T_1^*, \dots, T_n^*)$ .

☞ Q3 On suppose que tous les individus ont le même salaire de réserve :  $\xi_i = \xi$  et que ce salaire de réserve commun  $\xi$  est connu, ainsi que la fonction de répartition  $F$ .

Trouver l'estimateur du maximum de vraisemblance de  $\lambda$ .

Montrer directement que cet estimateur est convergent et asymptotiquement efficace quand  $n \rightarrow +\infty$ .

☞ Q4 En pratique, l'enquête se termine à la fin du  $T$ -ième mois,  $T < +\infty$  : à cette date, certains individus sont encore au chômage ; on n'observe donc que :

$$\begin{aligned} T_i^{**} &= T_i^* \text{ si } T_i^* \leq T \\ &= T + 1 \text{ si } T_i^* > T \end{aligned}$$

Ecrire la vraisemblance des observations  $(T_1^{**}, \dots, T_n^{**})$ .

Donner l'estimateur du maximum de vraisemblance de  $\lambda$ .

Remarque : On suppose toujours le salaire de réserve commun  $\xi$  et la fonction de répartition  $F$  connue.

☞ Q5 On suppose désormais que  $F$  s'écrit :

$$F(x) = (1 - e^{-\gamma(\xi - \xi_0)}) \mathbf{1}_{\xi \geq \xi_0}$$

où  $\gamma$  est un paramètre inconnu à estimer et  $\xi_0$  est connu.

Le couple  $(\lambda, \gamma)$  est-il identifiable ?

## Corrigé de l'exercice 2

☞ Q1 On suppose pour simplifier que jusqu'à la question 4,  $T = +\infty$ . Sinon, il faudrait alourdir les expressions des densités qui suivent en adjoignant l'indicatrice  $\mathbf{1}_{t_i \leq T}$  adéquate.

On a pour  $t \in \llbracket 1, T - 1 \rrbracket$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(T_i^* = t + 1 \mid T_i > t) &= \mathbb{P}(\text{L'individu } i \text{ reçoit au moins une offre intéressante entre } t \text{ et } t + 1) \\
 &= \mathbb{P}(N_t^i \geq 1 \wedge \text{Une des } N_t^i \text{ offres propose un salaire } \geq \xi_i) \\
 &= \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N_t^i = k \wedge \text{Une des } k \text{ offres propose un salaire } \geq \xi_i) \\
 &= \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N_t^i = k) \cdot \mathbb{P}(\text{Une des } k \text{ offres propose un salaire } \geq \xi_i) \\
 &= \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N_t^i = k) \cdot (1 - \mathbb{P}(\text{Toutes les } k \text{ offres proposent un salaire } < \xi_i)) \\
 &= \sum_{k=1}^{+\infty} \left( \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \right) \cdot (1 - F(\xi_i)^k) \\
 &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} - e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(\lambda F(\xi_i))^k}{k!} \\
 &= e^{-\lambda} (e^\lambda - 1) - e^{-\lambda} (e^{\lambda F(\xi_i)} - 1) \\
 &= 1 - e^{\lambda(F(\xi_i) - 1)}
 \end{aligned}$$

☞ Q2 On a pour  $t \in \llbracket 1, T - 1 \rrbracket$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(T_i^* = t + 1) &= \mathbb{P}(T_i^* = t + 1 \wedge T_i > t) \quad \text{car } T_i^* - 1 < T_i \leq T_i^* \\
 &= \mathbb{P}(T_i^* = t + 1 \mid T_i > t) \cdot \mathbb{P}(T_i > t) \\
 &= \mathbb{P}(T_i^* = t + 1 \mid T_i > t) \cdot (1 - \mathbb{P}(T_i \leq t)) \\
 &= \mathbb{P}(T_i^* = t + 1 \mid T_i > t) \cdot \left( 1 - \sum_{k=1}^t \mathbb{P}(T_i^* = k) \right)
 \end{aligned}$$

ce qui s'écrit encore, en notant  $u_t = \mathbb{P}(T_i^* = t)$  et  $\rho = 1 - e^{\lambda(F(\xi_i) - 1)}$

$$u_{t+1} = \rho \left( 1 - \sum_{k=1}^t u_k \right)$$

avec  $u_1 = \mathbb{P}(T_i^* = 1) = \mathbb{P}(T_i^* = 1 \mid T_i > 0) = \rho$ .

Alors,  $u_2 = \rho(1 - \rho)$ , puis  $u_3 = \rho(1 - \rho - \rho(1 - \rho)) = \rho(1 - \rho)^2$ .

Soit donc  $t \geq 3$  tel que  $\forall t' \leq t, u_{t'} = \rho(1 - \rho)^{t'-1}$ ; alors

$$\begin{aligned} u_{t+1} &= \rho \left( 1 - \sum_{t'=1}^t u_{t'} \right) \\ &= \rho \left( 1 - \sum_{t'=1}^t \rho(1 - \rho)^{t'-1} \right) \\ &= \rho \left( 1 - \rho \sum_{t'=0}^{t-1} (1 - \rho)^{t'} \right) \\ &= \rho \left( 1 - \rho \frac{1 - (1 - \rho)^t}{1 - (1 - \rho)} \right) \\ &= \rho(1 - \rho)^t \end{aligned}$$

Ainsi  $\forall t \in \llbracket 1, T - 1 \rrbracket$ ,  $u_{t+1} = \rho(1 - \rho)^t$ , ce qui s'écrit encore

$$\forall t \in \llbracket 1, T - 1 \rrbracket, \mathbb{P}(T_i^* = t + 1) = (1 - e^{\lambda(F(\xi_i) - 1)}) e^{\lambda t(F(\xi_i) - 1)}$$

Autre méthode : On a directement pour  $t \in \llbracket 1, T - 1 \rrbracket$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T_i^* = t + 1) &= \mathbb{P}(T_i^* = t + 1 \wedge T_i > t) \quad \text{car } T_i^* - 1 < T_i \leq T_i^* \\ &= \mathbb{P}(T_i^* = t + 1 \mid T_i > t) \cdot \mathbb{P}(T_i > t) \\ &= \mathbb{P}(T_i^* = t + 1 \mid T_i > t) \cdot \left( \prod_{j=0}^{t-1} \mathbb{P}(T_i > j + 1 \mid T_i > j) \right) \\ &= \mathbb{P}(T_i^* = t + 1 \mid T_i > t) \cdot \left( \prod_{j=0}^{t-1} (1 - \mathbb{P}(T_i \leq j + 1 \mid T_i > j)) \right) \\ &= \mathbb{P}(T_i^* = t + 1 \mid T_i > t) \cdot \left( \prod_{j=0}^{t-1} (1 - \mathbb{P}(T_i^* = j + 1 \mid T_i > j)) \right) \\ &= (1 - e^{\lambda(F(\xi_i) - 1)}) \cdot \left( \prod_{j=0}^{t-1} (e^{\lambda(F(\xi_i) - 1)}) \right) \\ &= (1 - e^{\lambda(F(\xi_i) - 1)}) e^{\lambda t(F(\xi_i) - 1)} \end{aligned}$$

Les comportements des individus étant censément indépendants, les variables  $(T_i^*)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  sont statistiquement indépendantes et par conséquent

$$L_{T_1^*, \dots, T_n^*}(t_1, \dots, t_n; F, \lambda) = \prod_{i=1}^n (1 - e^{\lambda(F(\xi_i) - 1)}) e^{\lambda(F(\xi_i) - 1) \cdot (t_i - 1)} \mathbb{1}_{\min_i t_i \geq 1}$$

☞ Q3 Soit  $(t_1, \dots, t_n) \in \llbracket 1, T \rrbracket^n$ , et soit  $\phi : \begin{pmatrix} [0, 1] & \rightarrow & \mathbb{R}^+ \\ \eta & \mapsto & (1 - \eta)^n \eta^{\sum_{i=1}^n (t_i - 1)} \end{pmatrix}$ .

Alors  $\ln \phi$  est  $C^\infty$ , et de dérivée  $\frac{\partial \ln \phi}{\partial \eta}(\eta) = -\frac{n}{1 - \eta} + \frac{1}{\eta} \sum_{i=1}^n (t_i - 1)$ ; donc elle est maximale en  $\hat{\eta} = 1 - \frac{1}{\bar{t}}$  où  $\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i$ .

Or  $L_{T_1^*, \dots, T_n^*}(t_1, \dots, t_n; F, \lambda) = \phi(e^{\lambda(F(\xi)-1)})$ , donc par conséquent  $\hat{\lambda}$  vérifie  $e^{\hat{\lambda}(F(\xi)-1)} = \hat{\eta} = 1 - \frac{1}{t}$ , c'est-à-dire

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{1-F(\xi)} \ln\left(1 + \frac{1}{t-1}\right)$$

On a d'après la loi de grands nombres

$$\begin{aligned} \lim_{p.s., n \rightarrow \infty} \bar{T} &= \mathbb{E}(T_i^*) \\ &= \sum_{t=1}^{+\infty} \mathbb{P}(T_i^* = t) \cdot t \\ &= \sum_{t=1}^{+\infty} (1-a)ta^{t-1}, \quad \text{en notant } a = e^{\lambda(F(\xi)-1)} \\ &= (1-a) \cdot \left( \begin{array}{l} ]-1, 1[ \xrightarrow{\mathbb{R}} \\ x \mapsto \sum_{t=1}^{+\infty} tx^{t-1} \end{array} \right) (a) \\ &= (1-a) \cdot \frac{\partial (x \mapsto \sum_{t=0}^{+\infty} x^t)}{\partial x} (a), \quad \text{car la série converge absolument sur le disque ouvert} \\ &= (1-a) \cdot \frac{\partial (x \mapsto \frac{1}{1-x})}{\partial x} (a) \\ &= (1-a) \cdot \frac{1}{(1-a)^2} \\ &= \frac{1}{1 - e^{\lambda(F(\xi)-1)}} \end{aligned}$$

*Remarque :* Pour calculer  $\sum_{k=0}^{+\infty} P(k)t^k$ , il suffit de décomposer le polynôme  $P(\mathbb{X})$  dans la base  $1, \mathbb{X} - 1, (\mathbb{X} - 1)(\mathbb{X} - 2), \dots$  ce qui conduit à

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} P(k)t^k &= \sum_{k=0}^{+\infty} \left( \sum_{i=0}^d \alpha_i \underbrace{(k-1) \cdots (k-i)}_{i \text{ termes}} \right) t^k \\ &= \sum_{i=0}^d \sum_{k=i}^{+\infty} \alpha_i \frac{\partial^i (x \mapsto x^k)}{\partial x^i} (t) \\ &= \sum_{i=0}^d \alpha_i \frac{\partial^i (x \mapsto \frac{1}{1-x})}{\partial x^i} (t) \\ &= \sum_{i=0}^d \alpha_i \frac{(-1)^i i!}{(1-t)^{i+1}} \end{aligned}$$

Par suite

$$\begin{aligned}
 \widehat{\lambda} &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \frac{1}{1 - F(\xi)} \ln \left( 1 + \frac{1}{\frac{1}{1 - e^{\lambda(F(\xi)-1)}} - 1} \right) \\
 &= \frac{1}{1 - F(\xi)} \ln \left( 1 + \frac{1 - e^{\lambda(F(\xi)-1)}}{e^{\lambda(F(\xi)-1)}} \right) \\
 &= \frac{1}{1 - F(\xi)} \ln \left( \frac{1}{e^{\lambda(F(\xi)-1)}} \right) \\
 &= \lambda
 \end{aligned}$$

ce qui prouve que  $\widehat{\lambda}$  est un estimateur convergent de  $\lambda$ .

Cherchons enfin la loi limite de  $(\widehat{\lambda} - \lambda)$ ; pour ce faire cherchons tout d'abord celle de  $(\bar{T} - \mathbb{E}(\bar{T}))$ . On a, en notant  $a = e^{\lambda(F(\xi)-1)}$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(T_i^*) &= \mathbb{E}(T_i^{*2}) - \mathbb{E}(T_i^*)^2 \\
 &= (1 - a) \sum_{t=1}^{+\infty} t^2 a^{t-1} - \frac{1}{(1 - a)^2} \\
 &= (1 - a) \left( a \sum_{t=2}^{+\infty} t(t-1) a^{t-2} + \sum_{t=1}^{+\infty} t a^{t-1} \right) - \frac{1}{(1 - a)^2} \\
 &= (1 - a) \left( a \frac{2}{(1 - a)^3} + \frac{1}{(1 - a)^2} \right) - \frac{1}{(1 - a)^2}, \quad \text{car les séries convergent absolument} \\
 &= \frac{1 + a}{(1 - a)^2} - \frac{1}{(1 - a)^2} \\
 &= \frac{a}{(1 - a)^2}
 \end{aligned}$$

D'après le Théorème Central Limite on a donc

$$\sqrt{n} \left( \bar{T} - \frac{1}{1 - a} \right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( 0, \frac{a}{(1 - a)^2} \right)$$

donc d'après le théorème de Slutsky

$$\sqrt{n} (\widehat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( 0, \frac{a}{(1 - a)^2} \cdot g' \left( \frac{1}{1 - a} \right)^2 \right)$$

$$\text{où } g : \begin{pmatrix} ]0, 1[ & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{1}{1 - F(\xi)} \ln \left( 1 + \frac{1}{x-1} \right) \end{pmatrix}.$$

On a  $\forall x, g'(x) = \frac{1}{1 - F(\xi)} \frac{1}{x(x-1)}$  et donc  $g' \left( \frac{1}{1 - a} \right) = \frac{1}{1 - F(\xi)} \frac{(1 - a)^2}{a}$  de sorte que finalement

$$\boxed{\sqrt{n} (\widehat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( 0, \frac{1}{(1 - F(\xi))^2} \frac{(1 - e^{\lambda(F(\xi)-1)})^2}{e^{\lambda(F(\xi)-1)}} \right)}$$

→ Q4 On a pour  $t \in \llbracket 1, T - 1 \rrbracket$

$$\begin{aligned}
 "T_i^{**} = t + 1" &= \begin{cases} "T_i^* = t + 1" & \text{si } "T_i^* \leq T" \\ "T + 1 = t + 1" & \text{si } "T_i^* > T" \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \text{soit } "T_i^* \leq T \text{ et } T_i^* = t + 1" \\ \text{soit } "T_i^* > T \text{ et } T + 1 = t + 1" \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \text{soit } "t + 1 \leq T \text{ et } T_i^* = t + 1" \\ \text{soit } "T_i^* = T + 1 \text{ et } T + 1 = t + 1" \\ \text{soit } "T_i^* = T + 1 \text{ et } T + 1 > t + 1" \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \text{soit } "t + 1 \leq T \text{ et } T_i^* = t + 1" \\ \text{soit } "T_i^* = t + 1 \text{ et } T + 1 = t + 1" \\ \text{soit } \underbrace{"T_i^* = T + 1 \text{ et } T + 1 > t + 1"}_{\text{événement impossible}} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Donc

$$\mathbb{P}(T_i^{**} = t + 1) = \begin{cases} \mathbb{P}(T_i^* = t + 1) & \text{si } t + 1 \leq T \\ \mathbb{P}(T_i^* > T) & \text{si } t + 1 = T + 1 \\ 0 & \text{si } t + 1 > T + 1 \end{cases}$$

Or  $\mathbb{P}(T_i^* = t + 1) = (1 - e^{\lambda(F(\xi)-1)}) e^{\lambda t(F(\xi)-1)}$ ; et par ailleurs

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(T_i^* > T) &= \sum_{\tau=T+1}^{+\infty} \mathbb{P}(T_i^* = \tau) \\
 &= \sum_{\tau=T}^{+\infty} (1 - e^{\lambda(F(\xi)-1)}) (e^{\lambda(F(\xi)-1)})^\tau \\
 &= e^{\lambda(F(\xi)-1) \cdot T}
 \end{aligned}$$

En conséquence on a

$$\begin{aligned}
 &L_{T_1^{**}, \dots, T_n^{**}}(t_1 + 1, \dots, t_n + 1; F, \lambda) \\
 &= \prod_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \mathbb{P}(T_i^{**} = t_i + 1) \\
 &= (\prod_{t_i+1 \leq T} \mathbb{P}(T_i^* = t_i + 1)) \cdot (\prod_{t_i+1 > T} \mathbb{P}(T_i^* > T) \mathbf{1}_{t_i+1=T+1}) \\
 &= (\prod_{t_i+1 \leq T} (1 - e^{\lambda(F(\xi)-1)}) e^{\lambda t_i(F(\xi)-1)}) \left( \prod_{t_i \geq T} (e^{\lambda(F(\xi)-1)})^T \cdot \mathbf{1}_{t_i+1=T+1} \right) \\
 &= \left( (1 - e^{\lambda(F(\xi)-1)})^{|\{i/t_i+1 \leq T\}|} \cdot (e^{\lambda(F(\xi)-1)})^{\sum_{t_i+1 \leq T} t_i} \right) \left( (e^{\lambda(F(\xi)-1)})^{\sum_{t_i \geq T} t_i} \right) \\
 &= \left( (1 - e^{\lambda(F(\xi)-1)})^{|\{i/t_i < T\}|} \right) \left( (e^{\lambda(F(\xi)-1)})^{\sum_{\forall t_i} t_i} \right) \\
 &= \left( (1 - e^{\lambda(F(\xi)-1)})^{|\{i/t_i < T\}|} \right) \left( (e^{\lambda(F(\xi)-1)})^{n\bar{t}} \right)
 \end{aligned}$$

On en tire que

$$\frac{\partial \ln L_{T_1^{**}, \dots, T_n^{**}}(t_1, \dots, t_n; F, \lambda)}{\partial \lambda} = -\frac{|\{i/t_i < T\}|}{1 - e^{\lambda(F(\xi)-1)}} + \frac{n(\bar{t} - 1)}{e^{\lambda(F(\xi)-1)}}$$

de sorte que

$$e^{\lambda \widehat{F(\xi)-1}} = \frac{n(\bar{t}-1)}{|\{i/t_i < T\}| + n(\bar{t}-1)}$$

et donc

$$\widehat{\lambda^{censure}} = \frac{1}{F(\xi)-1} \ln \left( \frac{n(\bar{t}-1)}{|\{i/t_i < T\}| + n(\bar{t}-1)} \right)$$

Comme en l'absence de censure ( $T = +\infty$ ) on a  $\widehat{\lambda} = \frac{1}{F(\xi)-1} \ln \left( 1 - \frac{1}{\bar{t}} \right)$  on a

$$\begin{aligned} \widehat{\lambda^{censure}} - \widehat{\lambda} &= \frac{1}{F(\xi)-1} \left( \ln \left( \frac{\bar{t}-1}{\frac{|\{i/t_i < T\}|}{n} + \bar{t}-1} \right) - \ln \left( \frac{\bar{t}-1}{\bar{t}} \right) \right) \\ &= -\frac{1}{F(\xi)-1} \ln \left( 1 + \frac{|\{i/t_i < T\}|}{n} \right) \end{aligned}$$

⇒ Q5 La vraisemblance s'écrit cette fois

$$L_{T_1^{**}, \dots, T_n^{**}}(t_1, \dots, t_n; \gamma, \lambda) = \left( 1 - e^{-\lambda e^{\gamma(\xi-\xi_0)}} \right)^n \left( e^{-\lambda e^{\gamma(\xi-\xi_0)}} \right)^{n\bar{t}} \mathbf{1}_{\xi \geq \xi_0}$$

On constate alors que  $\phi : ((\lambda, \gamma) \mapsto \lambda r^\gamma)$  n'est jamais injective (car  $\forall r \in \mathbb{R}^{+*}, \phi(1, 1) = r = \phi\left(\frac{1}{2}, \sqrt{r}\right)$ ), de sorte que la vraisemblance  $((\lambda, \gamma) \mapsto L_{T_1^{**}, \dots, T_n^{**}}(t_1, \dots, t_n; \gamma, \lambda))$  ne l'est pas non plus, de sorte que le paramètre  $(\lambda, \gamma)$  n'est **pas** identifiable. D'où l'intérêt des calculs précédents  
...

★  
★ ★

### Énoncé de l'exercice 3

#### ■ Partie 1 Préliminaire

⇒ Q1 On rappelle que la loi exponentielle de paramètre  $\lambda$  admet la densité  $f(y, \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y}, & \text{si } y \geq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

Soient  $n$  variables aléatoires  $Y_1 \dots Y_n$  i.i.d. de densité  $f(\cdot, \lambda)$ .

Montrer que  $\sum_{i=1}^n Y_i$  suit une loi de densité  $\lambda^n \frac{y^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda y} \mathbf{1}_{[0, +\infty[}(y)$  (on pourra commencer par le montrer pour  $n = 2$  puis procéder par récurrence).

Dans tout le problème,  $Z_i$  et  $C_i$ , pour  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  désignent des variables aléatoires indépendantes suivant des lois exponentielles de paramètres respectifs  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^{+*}$ .

## Partie 2 Observation parfaite

On dispose d'un échantillon d'observations  $(z_i, c_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$

- ☞ Q1 Ecrire le modèle statistique correspondant.  
S'agit-il d'une famille exponentielle? Si oui, peut-on exhiber une statistique exhaustive?
- ☞ Q2 Quel est l'estimateur du maximum de vraisemblance  $\begin{pmatrix} \hat{\lambda} \\ \hat{\mu} \end{pmatrix}$  du paramètre  $\begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$ ?
- ☞ Q3 Déterminer la loi asymptotiquement de  $\begin{pmatrix} \hat{\lambda} \\ \hat{\mu} \end{pmatrix}$ .
- ☞ Q4 Déterminer la loi (à distance finie) de  $\begin{pmatrix} \hat{\lambda} \\ \hat{\mu} \end{pmatrix}$ .  
Est-il biaisé à distance finie?  
Calculer sa matrice de variance-covariance.
- ☞ Q5 Proposer des estimateurs sans biais optimaux de  $\lambda$  et  $\mu$ , si possible efficaces.

## Partie 3 Observation imparfaite

On suppose dans cette seconde partie que les seules observations disponibles portent sur  $X_i = \min(Z_i, C_i)$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

- ☞ Q1 Calculer la fonction de répartition de la variable  $X_i$  pour  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$
- ☞ Q2 Ecrire le modèle statistique correspondant et déterminer les fonctions identifiables du paramètre  $\begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$ .
- ☞ Q3 Quels sont les estimateurs du maximum de vraisemblance de  $\gamma = \lambda + \mu$  fondés :  
i) sur  $(X_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  ;  
ii) sur  $(Z_i, C_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  ?  
Est-il naturel que ces estimateurs soient différents?
- ☞ Q4 Comparer les propriétés asymptotiques de ces estimateurs.

## Partie 4 Conclusion

- ☞ Q1 Dédurre des parties **I** et **II** l'expression de l'espérance conditionnelle

$$E \left( \frac{1}{\sum_{i=1}^n \min(Z_i, C_i)} \middle| \sum_{i=1}^n Z_i, \sum_{i=1}^n C_i \right)$$



### Corrigé de l'exercice 3

☞ Q1 L'assertion est triviale lorsque  $n = 1$ .

Soit donc  $n \geq 1$  tel que l'assertion soit vraie.

Soient  $Y_1, \dots, Y_{n+1}$  i.i.d. de densité  $f_{\mathcal{E}}(\cdot, \lambda)$ .

Définissons pour  $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$   $S_k = \sum_{i=1}^k Y_i$ .

Constatant que  $S_{n+1} = S_n + Y_{n+1}$ , définissons  $\phi : \left( \begin{array}{l} \mathbb{R}^{+*2} \rightarrow \mathbb{R}^{+*} \times ]0, 1[ \\ (x, y) \mapsto (x + y, \frac{x}{x+y}) \end{array} \right)$ . Alors  $\phi$  est

un  $C^\infty$ -difféomorphisme, de jacobien  $\left| \begin{pmatrix} y & x \\ 1-y & x \end{pmatrix}^{-1} \right| = \frac{1}{x}$ .

Or  $L_{S_n, Y_{n+1}}(s, y) = \left( \lambda^n \frac{s^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda s} \mathbf{1}_{s>0} \right) \cdot (\lambda e^{-\lambda y} \mathbf{1}_{y>0})$ , par hypothèse de récurrence et puisque  $S_n$  et  $Y_{n+1}$  sont indépendantes (car les  $(Y_i)_i$  sont toutes indépendantes).

En conséquence, puisque  $\phi^{-1}(u, v) = (uv, u(1-v))$ ,  $L_{\phi(S_n, Y_{n+1})}(u, v) = \lambda^{n+1} \frac{(uv)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda u} u \mathbf{1}_{u>0} \wedge v \in ]0, 1[$ .

En particulier d'après le théorème de projection  $L_{(\phi(S_n, Y_{n+1}))_1}(u) = \lambda^{n+1} \frac{u^n}{n!} e^{-\lambda u} \mathbf{1}_{u>0}$ , c'est-à-dire

$$L_{Y_1+\dots+Y_{n+1}}(u) = \lambda^{n+1} \frac{u^n}{n!} e^{-\lambda u} \mathbf{1}_{u>0}$$

de sorte que l'assertion est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

☞ Q1 Le modèle statistique s'écrit  $\left\{ \left( \mathbb{R}^{+2} \right)^n, (\mathcal{E} \cdot \mathcal{E})^{\otimes n} \right\}$ .

On a de plus pour  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$   $L_{Z_i, C_i}(z_i, c_i; \lambda, \mu) = \lambda \mu e^{-\lambda z_i - \mu c_i}$ , et donc

$$L_{Z_1, \dots, Z_n, C_1, \dots, C_n}(z_1, \dots, z_n, c_1, \dots, c_n; \lambda, \mu) = (\lambda \mu)^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n z_i - \mu \sum_{i=1}^n c_i} \mathbf{1}_{\min_i z_i \geq 0} \mathbf{1}_{\min_i c_i \geq 0}$$

En particulier le modèle est exponentiel et une statistique exhaustive est

$$(z_1, \dots, z_n, c_1, \dots, c_n) \mapsto \left( \sum_{i=1}^n z_i, \sum_{i=1}^n c_i \right)$$

☞ Q2 On a immédiatement  $\frac{\partial \ln L_{Z_1, \dots, Z_n, C_1, \dots, C_n}}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n z_i$ , et par suite un estimateur de  $\lambda$  et  $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{z}}$  (la log-vraisemblance étant concave, elle est bien maximale en  $\bar{z}$ ). De même un estimateur de  $\mu$  et  $\hat{\mu} = \frac{1}{\bar{c}}$ .

☞ Q3 On calcule successivement

$$\frac{\partial^2 \ln L_{Z_1, \dots, Z_n, C_1, \dots, C_n}}{\partial \lambda^2} = \frac{n}{\lambda^2}$$

$$\frac{\partial^2 \ln L_{Z_1, \dots, Z_n, C_1, \dots, C_n}}{\partial \lambda \partial \mu} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \ln L_{Z_1, \dots, Z_n, C_1, \dots, C_n}}{\partial \mu^2} = \frac{n}{\mu^2}$$

de sorte que  $I_1(\lambda, \mu) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\mu^2} \end{pmatrix}$  d'inverse  $I_1(\lambda, \mu)^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 0 \\ 0 & \mu^2 \end{pmatrix}$  et donc d'après le Théorème Central Limite

$$\sqrt{n} \begin{pmatrix} \widehat{\lambda} - \lambda \\ \widehat{\mu} - \mu \end{pmatrix} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda^2 & 0 \\ 0 & \mu^2 \end{pmatrix} \right)$$

⇨ Q4 Déterminons la loi de  $\widehat{\lambda}$  : soit donc  $h : (\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R})$  mesurable bornée, et calculons  $\mathbb{E} \left( h(\widehat{\lambda}) \right)$ . On a

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left( h(\widehat{\lambda}) \right) &= \mathbb{E} \left( h \left( \frac{n}{\sum_{i=1}^n z_i} \right) \right) \\ &= \int_{\mathbb{R}} h \left( \frac{n}{s} \right) \lambda^n \frac{s^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda s} \mathbf{1}_{s>0} ds \\ &= - \int_{0^+}^{+\infty} h(u) \lambda^n \frac{\left(\frac{n}{u}\right)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda \frac{n}{u}} \mathbf{1}_{u>0} \left( -\frac{n}{u^2} \right) du \end{aligned}$$

En conséquence,  $L_{\widehat{\lambda}}(u) = \frac{\lambda^n}{n!} \left(\frac{n}{u}\right)^{n+1} e^{-\lambda \frac{n}{u}} \mathbf{1}_{u>0}$ .

De façon similaire,  $L_{\widehat{\mu}}(v) = \frac{\mu^n}{n!} \left(\frac{n}{v}\right)^{n+1} e^{-\mu \frac{n}{v}} \mathbf{1}_{v>0}$ .

Ainsi,

$$L_{\widehat{\lambda}, \widehat{\mu}}(l, m) = \frac{(\lambda \mu)^n}{(n!)^2} \left( \frac{n^2}{lm} \right)^{n+1} e^{-n \frac{\lambda}{l} - n \frac{\mu}{m}}$$

Par ailleurs on a pour  $n \geq 2$

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left( \widehat{\lambda} \right) &= \int_{\mathbb{R}} l \frac{\lambda^n}{n!} \left( \frac{n}{l} \right)^{n+1} e^{-\lambda \frac{n}{l}} \mathbf{1}_{l>0} dl \\ &= \int_{0^+}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{(n-1)!} \left( \frac{n}{l} \right)^n e^{-\lambda \frac{n}{l}} dl \\ &= \int_{0^+}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{(n-1)!} u^{n-2} e^{-\lambda u} n du \\ &= \frac{n\lambda}{(n-1)} \int_{0^+}^{+\infty} \frac{1}{(n-2)!} \lambda^{n-2} u^{n-2} e^{-\lambda u} \lambda du \\ &= \frac{n\lambda}{(n-1)} \underbrace{\int_{0^+}^{+\infty} \frac{1}{(n-2)!} v^{n-2} e^{-v} dv}_{\int_{0^+}^{+\infty} f_{\Gamma(n-2, \lambda)}(v) dv = 1} \\ &= \frac{n}{n-1} \lambda \end{aligned}$$

de sorte que

$$\mathbb{E} \left( \begin{pmatrix} \widehat{\lambda} \\ \widehat{\mu} \end{pmatrix} \right) = \frac{n}{n-1} \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$$

Autrement dit,  $\begin{pmatrix} \widehat{\lambda} \\ \widehat{\mu} \end{pmatrix}$  est biaisé à distance finie.

Enfin pour  $n \geq 3$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(\widehat{\lambda}^2) &= \int_{\mathbb{R}} l^2 \frac{\lambda^n}{n!} \left(\frac{n}{l}\right)^{n+1} e^{-\lambda \frac{n}{l}} \mathbf{1}_{l>0} dl \\
 &= - \int_{0^+}^{+\infty} \left(\frac{n}{u}\right)^2 \frac{\lambda^n}{n!} u^{n+1} e^{-\lambda u} \left(-\frac{n}{u^2}\right) du \\
 &= \frac{n^2 \lambda^2}{(n-1)(n-2)} \int_{0^+}^{+\infty} \frac{1}{(n-3)!} \lambda^{n-3} u^{n-3} e^{-\lambda u} \lambda du \\
 &= \frac{n^2 \lambda^2}{(n-1)(n-2)} \underbrace{\int_{0^+}^{+\infty} \frac{1}{(n-3)!} v^{n-3} e^{-v} dv}_{\int_{0^+}^{+\infty} f_{\Gamma(n-3,\lambda)}(v) dv = 1} \\
 &= \frac{n^2}{(n-1)(n-2)} \lambda^2
 \end{aligned}$$

et donc

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(\widehat{\lambda}) &= \mathbb{E}(\widehat{\lambda}^2) - \mathbb{E}(\widehat{\lambda})^2 \\
 &= \frac{n^2}{(n-1)(n-2)} \lambda^2 - \left(\frac{n}{n-1} \lambda\right)^2 \\
 &= \frac{n^2(n-1) - (n-2)n^2}{(n-1)^2(n-2)} \lambda^2 \\
 &= \frac{n^2}{(n-1)^2(n-2)} \lambda^2
 \end{aligned}$$

(on vérifie que l'e.m.v. est asymptotiquement efficace :  $\mathbb{V}(\widehat{\lambda}) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{n} \lambda^2$ ).

Autre méthode (plus rapide) :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(\widehat{\lambda}) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{n}{s} \lambda^n \frac{s^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda s} ds \\
 &= \frac{n}{n-1} \lambda \int_{\mathbb{R}} \lambda^{n-1} \frac{s^{n-2}}{(n-2)!} e^{-\lambda s} ds \\
 &= \frac{n}{n-1} \lambda \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\lambda^{n-1} \frac{s^{n-2}}{(n-2)!} e^{-\lambda s}}_{f_{\Gamma(n-1,\lambda)}(s)} ds \\
 &= \frac{n}{n-1} \lambda
 \end{aligned}$$

De même

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(\widehat{\lambda}^2) &= \frac{n^2}{(n-1)(n-2)} \lambda^2 \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\lambda^{n-2} \frac{s^{n-3}}{(n-3)!} e^{-\lambda s}}_{f_{\Gamma(n-2,\lambda)}(s)} ds \\
 &= \frac{n^2}{(n-1)(n-2)} \lambda^2
 \end{aligned}$$

Enfin, remarquant que toutes les  $Z_1, \dots, Z_n, C_1, \dots, C_n$  sont indépendantes, on a  $\text{Cov}(\widehat{\lambda}, \widehat{\mu}) = 0$  de sorte que

$$\mathbb{V} \left( \begin{pmatrix} \widehat{\lambda} \\ \widehat{\mu} \end{pmatrix} \right) = \frac{n^2}{n-1} \left( \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \right) \begin{pmatrix} \lambda^2 & 0 \\ 0 & \mu^2 \end{pmatrix}$$

⇒ Q5 Posons  $\widehat{\lambda}^* = \frac{n-1}{n} \widehat{\lambda}$  et  $\widehat{\mu}^* = \frac{n}{n-1} \widehat{\mu}$ .

D'après le résultat précédent,  $\begin{pmatrix} \widehat{\lambda}^* \\ \widehat{\mu}^* \end{pmatrix}$  est un estimateur sans biais de  $\begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$ . Or  $T(Z, C) = (\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_i)$  est une statistique exhaustive complète (car canonique dans un modèle exponentielle); en conséquence, d'après le théorème de Lehman-Scheffé,  $\begin{pmatrix} \widehat{\lambda}^* \\ \widehat{\mu}^* \end{pmatrix}$  est optimal parmi les estimateurs sans biais de  $\begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$ .

Par ailleurs,

$$\begin{aligned} \text{Cov} \left( \begin{pmatrix} \widehat{\lambda}^* \\ \widehat{\mu}^* \end{pmatrix} \right) &= \left( \frac{n-1}{n} \right)^2 \text{Cov} \left( \begin{pmatrix} \widehat{\lambda} \\ \widehat{\mu} \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{n-2} \begin{pmatrix} \lambda^2 & 0 \\ 0 & \mu^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Or la borne FDCR du modèle est  $\frac{1}{n} \begin{pmatrix} \lambda^2 & 0 \\ 0 & \mu^2 \end{pmatrix}$ .

En conséquence,  $\begin{pmatrix} \widehat{\lambda}^* \\ \widehat{\mu}^* \end{pmatrix}$  n'est **pas** un estimateur *efficace* de  $\begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$ .

On suppose dans cette seconde partie que les seules observations disponibles portent sur  $X_i = \text{Min}(Z_i, C_i)$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

⇒ Q1 On a pour  $t \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_i > t) &= \mathbb{P}(Z_i > t \wedge C_i > t) \\ &= \mathbb{P}(Z_i > t) \cdot \mathbb{P}(C_i > t) \quad \text{par indépendance} \\ &= \left( \int_t^{+\infty} \lambda e^{-\lambda u} du \right) \left( \int_t^{+\infty} \lambda e^{-\mu v} dv \right) \\ &= e^{-(\lambda+\mu)t} \end{aligned}$$

de sorte que  $X_i \rightsquigarrow \mathcal{E}(\lambda + \mu)$ .

⇒ Q2 Le modèle statistique s'écrit ici  $\{\mathbb{R}^{+n}, \mathcal{E}^{\otimes n}\}$ .

Sa vraisemblance étant  $L_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \lambda, \mu) = (\lambda + \mu)^n e^{-(\lambda+\mu) \sum_{i=1}^n x_i}$ , la seule fonction identifiable de  $(\lambda, \mu)$  est  $\lambda + \mu$ .

⇒ Q3 Cherchons à estimer  $\gamma = \lambda + \mu$ .

- (i) La maximisation de  $L_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \gamma) = (\gamma)^n e^{-(\gamma) \sum_{i=1}^n x_i}$  conduit à l'estimateur  $\widehat{\gamma}_X = \frac{1}{\bar{x}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \min(z_i, c_i)}$ ;
- (ii) tandis que celle de  $L_{Z_1, \dots, Z_n, C_1, \dots, C_n}(z_1, \dots, z_n, c_1, \dots, c_n; \lambda, \mu)$  conduit à estimer  $\lambda$  et  $\mu$  individuellement, ce dont on tire une estimation convergente de  $\lambda + \mu$ , à savoir  $\widehat{\gamma}_{Z,C} = \widehat{\lambda} + \widehat{\mu} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n z_i} + \frac{n}{\sum_{i=1}^n c_i}$

Bien entendu il n'y a aucune raison pour que ces estimateurs, fondés sur des observations différentes (c'est-à-dire, en définitive, définis dans des modèles statistiques différents), soient les mêmes. Comme il est montré ci-après ils ont même des variances asymptotiques différentes.

☞ Q4 On a alternativement

- (i)  $\frac{\partial \ln L_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \gamma)}{\partial \gamma} = \frac{n}{\gamma} - \sum_{i=1}^n x_i$ ,  
 puis  $\frac{\partial^2 \ln L_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \gamma)}{\partial \gamma^2} = -\frac{n}{\gamma^2}$ ,  
 donc

$$\sqrt{n} (\widehat{\gamma}_X - \gamma) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(O, (\lambda + \mu)^2)$$

- (ii) Soit  $g : \begin{pmatrix} \mathbb{R}^{+*2} & \rightarrow & \mathbb{R}^{+*2} \\ (x, y) & \mapsto & (x + y, y) \end{pmatrix}$  qui est de classe  $C^\infty$ , et de jacobienne  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Alors d'après le théorème de Slutsky

$$\sqrt{n} \left( g \begin{pmatrix} \widehat{\lambda} \\ \widehat{\mu} \end{pmatrix} - g \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} \right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{\partial g}{\partial (x, y)}(\lambda, \mu) \begin{pmatrix} \lambda^2 & 0 \\ 0 & \mu^2 \end{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial (x, y)' }(\lambda, \mu) \right)$$

En particulier selon la première composante,<sup>8</sup>

$$\sqrt{n} (\widehat{\gamma}_{Z,C} - \gamma) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(O, \lambda^2 + \mu^2)$$

On constate que  $(\lambda + \mu)^2 \geq \lambda^2 + \mu^2$ , avec égalité ssi  $\lambda = 0$  ou  $\mu = 0$  (situations dégénérées et sans intérêt). Autrement dit, asymptotiquement  $\widehat{\gamma}_{Z,C}$  est préférable à  $\widehat{\gamma}_X$ , ce que l'on écrira sous la forme publicitaire

$$\widehat{\lambda} + \widehat{\mu} \gg \widehat{\lambda} + \widehat{\mu}$$

Ce résultat est bien-sûr naturel dans la mesure où le premier estimateur est fondé sur une information plus fine que le second.

☞ Q1 Pour calculer  $\mathbb{E} \left( \frac{1}{X_1 + \dots + X_n} \mid Z_1 + \dots + Z_n, C_1 + \dots + C_n \right)$ , il semble naturel de déterminer tout d'abord

$$\begin{aligned} & L_{X_1 + \dots + X_n \mid Z_1 + \dots + Z_n, C_1 + \dots + C_n} \\ &= \frac{L_{X_1 + \dots + X_n, Z_1 + \dots + Z_n, C_1 + \dots + C_n}}{L_{Z_1 + \dots + Z_n, C_1 + \dots + C_n}} \end{aligned}$$

<sup>8</sup>Il n'est pas nécessaire pour pratiquer la delta méthode que  $g$  soit inversible, et il aurait suffi ici de considérer  $g : \begin{pmatrix} \mathbb{R}^{+*2} & \rightarrow & \mathbb{R}^{+*} \\ (x, y) & \mapsto & x + y \end{pmatrix}$ .

La difficulté ici est que  $X_i$  n'est **pas** indépendante de  $(Z_i, C_i)$ , puisque  $X_i = \min(Z_i, C_i)$ , ce qui complique singulièrement le calcul.

En fait, le résultat s'exprime très simplement et peut être démontré de la façon suivante, astucieuse quoique moins naturelle.

Notons en effet  $\hat{\theta} = \mathbb{E} \left( \frac{1}{X_1 + \dots + X_n} \mid Z_1 + \dots + Z_n = z, C_1 + \dots + C_n = c \right)$ ; alors d'après la partie **II**  $\hat{\theta}$  est un estimateur sans biais de  $\frac{\lambda + \mu}{n-1}$ . La statistique en  $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$  étant régulière (car le modèle est exponentiel), d'après le théorème de Lehman-Scheffé  $\hat{\theta}$  est en outre optimal.

Mais d'après la partie **I**,  $\frac{\hat{\lambda} + \hat{\mu}}{n}$  est un autre estimateur sans biais de  $\frac{\lambda + \mu}{n-1}$ , lui aussi optimal.

En conséquence,  $\hat{\theta}$  et  $\hat{\theta} - \frac{\hat{\lambda} + \hat{\mu}}{n}$  sont décorréllés, ainsi que  $\frac{\hat{\lambda}}{n}$  et  $(\hat{\theta} - \frac{\hat{\mu}}{n}) - \frac{\hat{\lambda}}{n}$ , et que  $\frac{\hat{\mu}}{n}$  et  $(\hat{\theta} - \frac{\hat{\lambda}}{n}) - \frac{\hat{\mu}}{n}$ , et ce en vertu du lemme suivant :

Si  $\hat{a}$  et  $\hat{b}$  sont deux estimateurs sans biais optimaux du même paramètre,  
alors  $\text{Cov}(\hat{a}, \hat{a} - \hat{b}) = 0$

En effet, définissons pour  $t \in \mathbb{R}$   $c_t = (1 - t)\hat{a} + t\hat{b} = \hat{a} + t(\hat{a} - \hat{b})$ .  
Alors  $\forall t \in \mathbb{R}, \mathbb{V}(c_t) \geq \mathbb{V}(\hat{b})$  puisque  $\hat{b}$  est optimal;  
ceci s'écrit  $\forall t \in \mathbb{R}, \mathbb{V}(\hat{a}) + 2t\text{Cov}(\hat{a}, \hat{a} - \hat{b}) + t^2\mathbb{V}(\hat{a} - \hat{b})$  qui est une inégalité polynômiale en  $t$  qui ne p  
de celui-ci est négatif ou nul, ce dont on tire le résultat.

Par suite,

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(\hat{\theta}) &= \mathbb{V}\left(\frac{\hat{\lambda}}{n}\right) + \mathbb{V}\left(\frac{\hat{\mu}}{n}\right) \\ &= \mathbb{V}\left(\frac{\hat{\lambda} + \hat{\mu}}{n}\right) \quad \text{car } \hat{\lambda} \text{ et } \hat{\mu} \text{ sont indépendants} \end{aligned}$$

Dans ces conditions, les deux estimateurs  $\hat{\theta}$  et  $\frac{\hat{\lambda} + \hat{\mu}}{n}$  qui ont même espérance, même variance et sont exactement corrélés, sont égaux presque sûrement :<sup>9</sup>

$$\hat{\theta} = \frac{\hat{\lambda} + \hat{\mu}}{n} \text{ p.s.}$$

c'est-à-dire

$$\mathbb{E} \left( \frac{1}{\sum_{i=1}^n \min(Z_i, C_i)} \mid \sum_{i=1}^n Z_i \wedge \sum_{i=1}^n C_i \right) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n Z_i} + \frac{1}{\sum_{i=1}^n C_i} \quad \text{p.s.}$$

<sup>9</sup>Ce résultat est généralement connu comme l'*unicité presque sûre* d'un estimateur optimal fonction d'une statistique totale.

\*  
\* \*

## 6 Travaux Dirigés n°6

### Énoncé de l'exercice 1

On considère un échantillon  $X_1, \dots, X_n$  i.i.d. tiré de la loi de Poisson de paramètre  $\lambda$ .

- ☞ Q1 Donner  $\mathbb{E}(X_i)$  et  $\mathbb{V}(X_i)$ .  
Calculer  $\phi(t) = \mathbb{E}(e^{tX_i})$ .  
En déduire que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \lambda \\ \mathbb{E}(X^2) &= \lambda(1 + \lambda) \\ \mathbb{E}(X^3) &= \lambda(1 + 3\lambda + \lambda^2) \\ \mathbb{E}(X^4) &= \lambda(1 + 7\lambda + 6\lambda^2 + \lambda^3)\end{aligned}$$

- ☞ Q2 (a) On pose  $\hat{\lambda}_1(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$  et  $\hat{\lambda}_2(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ .  
Par quelle méthode d'estimation ont été obtenus  $\hat{\lambda}_1$  et  $\hat{\lambda}_2$ ?
- (b) Les estimateurs  $\hat{\lambda}_1$  et  $\hat{\lambda}_2$  estiment-ils  $\lambda$  sans biais?  
Proposer un autre estimateur sans biais de  $\lambda$ , que l'on notera  $\hat{\lambda}_3$ .
- (c) Donner la loi (à distance finie) de  $\hat{\lambda}_1$ .
- (d) Donner la loi asymptotique jointe de  $\begin{pmatrix} \hat{\lambda}_1 \\ \hat{\lambda}_2 \end{pmatrix}$ , puis celle de  $\begin{pmatrix} \hat{\lambda}_1 \\ \hat{\lambda}_3 \end{pmatrix}$ .
- (e) Soit  $\hat{\lambda}_\infty = \alpha \hat{\lambda}_1 + \beta \hat{\lambda}_3$ ,  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^{+2}$ .  
Donner la valeur de  $(\alpha, \beta)$  telle que  $\hat{\lambda}_\infty$  soit le meilleur estimateur asymptotiquement sans biais de  $\lambda$ .  
Ce résultat est-il surprenant (donner l'e.m.v. de  $\lambda$ )?
- ☞ Q3 Dans cette question, on se place dans le cas où  $n = 2$ .
- (a) Calculer les erreurs quadratiques moyennes pour les trois estimateurs  $\hat{\lambda}_1$ ,  $\hat{\lambda}_2$  et  $\hat{\lambda}_3$ .
- (b) Déterminer en fonction de  $\lambda$  lequel de ces estimateurs est le meilleur selon la critère de l'erreur quadratique moyenne.
- (c) Comparer explicitement l'EQM de  $\hat{\lambda}_3$  avec la borne FDCR.



## Corrigé de l'exercice 1

☞ Q1 – On a

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X_i) &= \sum_{k \in \mathbb{N}} \left( \left( e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \right) k \right) \\
 &= 0 + \lambda \underbrace{\left( \sum_{k \in \mathbb{N}^*} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right)}_{\sum_{l \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X_1=l)} \\
 &= \boxed{\lambda}
 \end{aligned}$$

et de même

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X_i^2) &= \sum_{k \in \mathbb{N}^*} \left( \left( e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \right) k^2 \right) \\
 &= \left( \sum_{k \in \mathbb{N}^*} \left( e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} k(k-1) \right) \right) + \left( \sum_{k \in \mathbb{N}^*} \left( e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} k \right) \right) \\
 &= \left( \underbrace{\sum_{k \geq 2} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}}_{\sum_{l \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X_1=l)} \right) \lambda^2 + \left( \underbrace{\sum_{k \geq 1} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}}_{\sum_{l \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X_1=l)} \right) \lambda \\
 &= \lambda^2 + \lambda
 \end{aligned}$$

ce dont on tire

$$\boxed{\mathbb{V}(X_i) = \lambda}$$

– Soit  $\phi : \left( \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{+*} \\ t \mapsto \mathbb{E}(e^{tX_i}) \end{array} \right)$ ;  $\phi$  est appelée la *fonction génératrice* de la variable aléatoire  $X_i$ .

Alors pour  $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
 \phi(t) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X_i = k) e^{tk} \\
 &= \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{tk} \\
 &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda e^t)^k}{k!} \\
 &= e^{\lambda(e^t - 1)}
 \end{aligned}$$

En particulier,  $\phi$  est de classe  $C^{+\infty}$ .

L'idée ici est que pour  $\rho > 0$ , la série  $\left( \begin{array}{l} ]-\rho, +\rho[ \rightarrow \mathbb{R}^{+*} \\ t \mapsto \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{(\lambda e^t)^k}{k!} \end{array} \right)$  est normalement convergente; donc sur tout voisinage de 0 on peut intervertir  $\frac{\partial}{\partial t}$  et  $\sum_{\mathbb{N}}$ , de sorte que

$$\begin{aligned} \phi^{(n)}(0) &= \left( \frac{\partial}{\partial t} \left( t \mapsto e^{-\lambda} \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{(\lambda e^t)^k}{k!} \right) \right)_{(0)} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k \in \mathbb{N}} \left( \frac{\partial}{\partial t} \left( t \mapsto \frac{(\lambda e^t)^k}{k!} \right) \right)_{(0)} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k \in \mathbb{N}} \left( \left( t \mapsto k^n \frac{(\lambda e^t)^k}{k!} \right) \right)_{(0)} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k \in \mathbb{N}} k^n \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \sum_{k \in \mathbb{N}} k^n \mathbb{P}(X_i = k) \\ &= \mathbb{E}(X_i^n) \end{aligned}$$

Ce résultat est en fait vrai plus généralement pour toute densité suffisamment régulière (*i.e.* telle que  $\phi$  soit développable en séries entières et somme de sa série) : en effet on a alors

$$\phi(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\phi^{(n)}(0)}{n!} t^n$$

Or par ailleurs on a toujours

$$\begin{aligned} \phi(t) &= \mathbb{E}(e^{tX_i}) \\ &= \mathbb{E} \left( \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(tX_i)^n}{n!} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n \mathbb{E}(X_i^n)}{n!} \quad \text{sous réserve que tous les moments existent} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\mathbb{E}(X_i^n)}{n!} t^n \end{aligned}$$

ce dont on déduit que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \phi^{(n)}(0) = \mathbb{E}(X_i^n)$$

– Par ailleurs, on a successivement :

$$\begin{aligned} \phi'(t) &= \phi(t)\lambda e^t \\ \phi''(t) &= \phi(t)\lambda e^t + \phi'(t)\lambda e^t \\ &= (\lambda e^t + (\lambda e^t)^2)\phi(t) \\ \phi'''(t) &= (\lambda e^t + 2(\lambda e^t)^2)\phi(t) + (\lambda e^t + (\lambda e^t)^2)\lambda e^t\phi'(t) \\ &= (\lambda e^t + 3(\lambda e^t)^2 + (\lambda e^t)^3)\phi(t) \\ \phi''''(t) &= (\lambda e^t + 6(\lambda e^t)^2 + 3(\lambda e^t)^3)\phi(t) + (\lambda e^t + 3(\lambda e^t)^2 + (\lambda e^t)^3)\phi'(t) \\ &= (\lambda e^t + 7(\lambda e^t)^2 + 6(\lambda e^t)^3 + (\lambda e^t)^4)\phi(t) \end{aligned}$$

Plus généralement, on montre qu'il existe une suite de polynômes  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}[\mathbb{X}]^{\mathbb{N}}$  telle que  $\forall n \in \mathbb{N}, \phi^{(n)}(t) = P_n(\lambda e^t)\phi(t)$ .

On a en effet  $P_0 = (1), P_1 = \mathbb{X}$  puis pour tout  $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \phi^{(n+1)}(t) &= (P'_n(\lambda e^t)\lambda e^t)\phi(t) + P_n(\lambda e^t)\phi'(t) \\ &= (P'_n(\lambda e^t)\lambda e^t)\phi(t) + P_n(\lambda e^t)(\lambda e^t\phi(t)) \\ &= (\mathbb{X}P'_n(\mathbb{X}) + \mathbb{X}P_n(\mathbb{X}))_{(\lambda e^t)}\phi(t) \end{aligned}$$

Par suite

$$\forall n \in \mathbb{N}, P_{n+1}(\mathbb{X}) = \mathbb{X} (P_n(\mathbb{X}) + P'_n(\mathbb{X}))$$

de sorte que, en notant  $P_n(\mathbb{X}) = \sum_{k=0}^n a_n^k \mathbb{X}^k$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_{n+1}^k = k a_n^k + a_n^{k-1} \quad (\text{avec la convention } a_n^{-1} = 0)$$

ce qui permet de calculer les  $(a_n^k)_{n,k}$  et d'en déduire  $\mathbb{E}(X_i^n) = \phi^{(n)}(0)$ . Puisque  $\phi(0) = 1$ , on peut donc facilement calculer pour toute  $n \in \mathbb{N}^*$  le moment d'ordre  $n$

$$\mathbb{E}(T_i^k) = P_n(\lambda)$$

– Dans le cas présent on vérifie immédiatement que

$$\begin{cases} \mathbb{E}(X) &= \lambda \\ \mathbb{E}(X^2) &= \lambda(1 + \lambda) \\ \mathbb{E}(X^3) &= \lambda(1 + 3\lambda + \lambda^2) \\ \mathbb{E}(X^4) &= \lambda(1 + 7\lambda + 6\lambda^2 + \lambda^3) \end{cases}$$

⇒ Q2 (a) On constate que  $\widehat{\lambda}_1$  et  $\widehat{\lambda}_2$  ont été obtenus par la méthode des moments, qui consiste pour estimer  $\lambda$  à inverser l'expression du moment théorique d'une variable  $X$  en fonction de  $\lambda$ , et de l'appliquer au moment empirique.

En l'occurrence  $\hat{\lambda}^1(x) = \bar{x}$  est le premier moment empirique, qui converge p.s. vers le premier moment théorique  $\mathbb{E}(X_1) = \lambda$ . Donc  $\hat{\lambda}^1$  est l'estimateur fondé sur le premier moment de  $X$ . De même  $\hat{\lambda}^2(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$  est le moment centré d'ordre 2 empirique, qui converge vers le moment centré théorique d'ordre 2  $\mathbb{V}(X_1) = \lambda$ . Donc  $\hat{\lambda}^2$  est l'estimateur fondé sur le second moment centré de  $X$ .

Les questions suivantes s'assurent que  $\hat{\lambda}_1$  et  $\hat{\lambda}_2$  sont bien des estimateurs de  $\lambda$  et étudient leurs propriétés à distance (in-)finie.

(b) On a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{\lambda}_1(X)) &= \mathbb{E}(\bar{X}) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \\ &= \boxed{\lambda} \end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{\lambda}_2(X)) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}((X_i - \bar{X})^2) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i^2) - 2\mathbb{E}(\bar{X}^2) + \mathbb{E}(\bar{X}^2) \\ &= \mathbb{E}(X_1^2) - \mathbb{E}(\bar{X}^2) \\ &= \mathbb{E}(X_1^2) - (\mathbb{V}(\bar{X}) + \mathbb{E}(\bar{X})^2) \\ &= \mathbb{E}(X_1^2) - \left(\frac{1}{n}\mathbb{V}(X_1) + \mathbb{E}(X_1)^2\right) \\ &= (\lambda^2 + \lambda) - \left(\frac{1}{n}\lambda + \lambda^2\right) \\ &= \boxed{\frac{n-1}{n}\lambda} \end{aligned}$$

Ainsi,  $\hat{\lambda}_1$  n'est pas biaisé mais  $\hat{\lambda}_2$  l'est, et on peut proposer  $\hat{\lambda}_3 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

(c) Première méthode : Cherchons la loi de  $\sum_{i=1}^n X_i$ .

Une façon naturelle serait de montrer qu'une somme de variables indépendantes qui suivent chacune un loi de Poisson de paramètre  $\lambda_i$  suit elle-même un loi de Poisson de paramètre

$\sum_{i=1}^n \lambda_i$ ; ceci se montre par récurrence soit en calculant explicitement

$$\mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n = k) = \sum_{s=0}^k \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_{n-1} = s) \cdot \mathbb{P}(X_n = k - s)$$

soit par convolution.

Une autre façon est de calculer la fonction génératrice de la variable  $\sum_{i=1}^n X_i$ , et de reconnaître une fonction génératrice connue : la bijectivité du passage entre une densité et une fonction génératrice permet alors de conclure que  $\sum_{i=1}^n X_i$  suit bien la loi dont on a reconnu la fonction génératrice.

En l'occurrence

$$\begin{aligned} \phi_{\sum_{i=1}^n X_i}(t) &= \mathbb{E}\left(e^{t \sum_{i=1}^n X_i}\right) \\ &= \mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^n e^{t X_i}\right) \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{E}\left(e^{t X_i}\right) \quad \text{par indépendance des } (e^{t X_i})_i \\ &= \prod_{i=1}^n \phi_{X_i}(t) \\ &= e^{n\lambda(e^t - 1)} \\ &= \phi_{\mathcal{P}(n\lambda)}(t) \end{aligned}$$

ce dont on conclut que  $\sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{P}(n\lambda)$ .

En définitive la loi de  $\hat{\lambda}_1$  est caractérisée par

$$\forall k \in \mathbb{Q}, \mathbb{P}\left(\hat{\lambda}_1 = k\right) = \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n X_i = nk\right) = e^{-n\lambda} \frac{(n\lambda)^{nk}}{(nk)!} \mathbf{1}_{nk \in \mathbb{N}}$$

(on notera que la statistique  $\hat{\lambda}_1$  n'est **pas** entière a priori, ce qui justifie l'indicatrice).

Autre Méthode : On peut aussi directement calculer pour  $t \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}\left(\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{t}{n}\right) &= \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n = t) \\
 &= \sum_{x_1 + \dots + x_n = t} \mathbb{P}(X_1 = x_1 \wedge \dots \wedge X_n = x_n) \\
 &= \sum_{x_1 + \dots + x_n = t} \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = x_i) \quad \text{car les } (X_i)_i \text{ sont indépendants} \\
 &= \sum_{x_1 + \dots + x_n = t} \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_i}}{x_i!} \\
 &= \sum_{x_1 + \dots + x_n = t} \frac{e^{-n\lambda} \lambda^{x_1 + \dots + x_n}}{x_1! \dots x_n!} \\
 &= \frac{e^{-n\lambda} \lambda^t}{t!} \sum_{x_1 + \dots + x_n = t} \frac{t!}{x_1! \dots x_n!} \\
 &= \frac{e^{-n\lambda} \lambda^t}{t!} (1 + \dots + 1)^t \\
 &= \boxed{\frac{e^{-n\lambda} (n\lambda)^t}{t!}}
 \end{aligned}$$

- (d) Pour déterminer la loi limite jointe de  $\begin{pmatrix} \hat{\lambda}_1 \\ \hat{\lambda}_2 \end{pmatrix}$ , on serait tenté de poser  $Z_i = \begin{pmatrix} X_i \\ (X_i - \bar{X})^2 \end{pmatrix}$  et d'appliquer le Théorème Central Limite à  $Z_i$ ; la difficulté est que les  $Z_i$  ne sont plus i.i.d dans ce cas, du fait de  $\bar{X}$ . C'est pourquoi on pose  $Y_i = \begin{pmatrix} X_i \\ X_i^2 \end{pmatrix}$ , et on constate que

$$\sqrt{n}(Y_i - \mathbb{E}(Y_i)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbb{V}(Y_i)\right)$$

ce qui s'écrit

$$\sqrt{n}\left(\begin{pmatrix} \bar{X} \\ \bar{X}^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda(1 + \lambda) \end{pmatrix}\right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbb{V}(X_i) & \text{Cov}(X_i, X_i^2) \\ \text{Cov}(X_i, X_i^2) & \mathbb{V}(X_i^2) \end{pmatrix}\right)$$

Par ailleurs on calcule successivement

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X_i) &= \lambda \\ \mathbb{V}(X_i^2) &= \mathbb{E}(X_i^4) - \mathbb{E}(X_i^2)^2 \\ &= \lambda(1 + 6\lambda + 4\lambda^2) \\ \text{Cov}(X_i, X_i^2) &= \mathbb{E}(X_i^3) - \mathbb{E}(X_i)\mathbb{E}(X_i^2) \\ &= \lambda(1 + 2\lambda)\end{aligned}$$

Enfin, posons  $g : \left( \begin{array}{c} \mathbb{R}^2 \\ \left( \begin{array}{c} u \\ v \end{array} \right) \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \mathbb{R}^2 \\ \left( \begin{array}{c} u \\ v - u^2 \end{array} \right) \end{array} \right)$ , de sorte que

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i\right), \text{ car } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\bar{X})^2.$$

Alors  $g$  est de classe  $C^\infty$ , et de plus  $Jac g \left( \begin{array}{c} u \\ v \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2u & 1 \end{pmatrix}$ , donc d'après le théorème de Slutsky

$$\begin{aligned}& \sqrt{n} \left( g \left( \begin{array}{c} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{array} \right) - g \left( \begin{array}{c} \lambda \\ \lambda(1 + \lambda) \end{array} \right) \right) \\ \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} & \mathcal{N} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2\lambda & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \lambda & \lambda(1 + 2\lambda) \\ \lambda(1 + 2\lambda) & \lambda(1 + \lambda) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -2\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)\end{aligned}$$

soit

$$\sqrt{n} \left( \begin{pmatrix} \hat{\lambda}_1 \\ \hat{\lambda}_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \end{pmatrix} \right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & \lambda \\ \lambda & \lambda(1 + 2\lambda) \end{pmatrix} \right)$$

Enfin, remarquant que

$$\begin{pmatrix} \hat{\lambda}_1 \\ \hat{\lambda}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{n}{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\lambda}_1 \\ \hat{\lambda}_2 \end{pmatrix} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \end{pmatrix}$$

il vient

$$\sqrt{n} \left( \begin{pmatrix} \hat{\lambda}_1 \\ \hat{\lambda}_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda \\ \frac{n}{n-1} \lambda \end{pmatrix} \right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & \lambda \\ \lambda & \lambda(1 + 2\lambda) \end{pmatrix} \right)$$

et comme par ailleurs  $\frac{n}{n-1} \lambda \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \lambda$  on conclut que

$$\sqrt{n} \left( \begin{pmatrix} \hat{\lambda}_1 \\ \hat{\lambda}_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \end{pmatrix} \right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & \lambda \\ \lambda & \lambda(1 + 2\lambda) \end{pmatrix} \right)$$

- (e) On a  $\mathbb{E}(\widehat{\lambda}_\infty(X)) = \alpha \mathbb{E}(\widehat{\lambda}_1(X)) + \beta \mathbb{E}(\widehat{\lambda}_3(X)) = (\alpha + \beta)\lambda$ ,  
donc  $\widehat{\lambda}_\infty$  est sans biais ssi  $\alpha + \beta = 1$ .

Par ailleurs,  $\widehat{\lambda}_\infty$  est le meilleur estimateur sans biais de  $\lambda$  s'il est de variance minimale ; or pour  $n \rightarrow +\infty$

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(\widehat{\lambda}_\infty(X)) &= \alpha^2 \mathbb{V}(\widehat{\lambda}_1(X)) + 2\alpha(1-\alpha) \text{Cov}(\widehat{\lambda}_1(X), \widehat{\lambda}_3(X)) + (1-\alpha)^2 \mathbb{V}(\widehat{\lambda}_3(X)) \\ &= \begin{cases} \left( \mathbb{V}(\widehat{\lambda}_1(X)) + \mathbb{V}(\widehat{\lambda}_3(X)) - 2\text{Cov}(\widehat{\lambda}_1(X), \widehat{\lambda}_3(X)) \right) \alpha^2 \\ + 2 \left( \text{Cov}(\widehat{\lambda}_1(X), \widehat{\lambda}_3(X)) - \mathbb{V}(\widehat{\lambda}_3(X)) \right) \alpha \\ + \mathbb{V}(\widehat{\lambda}_3(X)) \end{cases} \end{aligned}$$

Ce polynôme de degré 2 en  $\alpha$  a un coefficient  $\mathbb{V}(\widehat{\lambda}_1(X)) + \mathbb{V}(\widehat{\lambda}_3(X)) - 2\text{Cov}(\widehat{\lambda}_1(X), \widehat{\lambda}_3(X)) = \mathbb{V}(\widehat{\lambda}_1(X) - \widehat{\lambda}_3(X)) \geq 0$  en  $\alpha^2$ , donc est maximal aux bornes et minimal au milieu des racines, soit en

$$\begin{aligned} \alpha^* &= -\frac{2 \left( \text{Cov}(\widehat{\lambda}_1(X), \widehat{\lambda}_3(X)) - \mathbb{V}(\widehat{\lambda}_3(X)) \right)}{2 \times \left( \mathbb{V}(\widehat{\lambda}_1(X)) + \mathbb{V}(\widehat{\lambda}_3(X)) - 2\text{Cov}(\widehat{\lambda}_1(X), \widehat{\lambda}_3(X)) \right)} \\ &= -\frac{2n(\lambda - \lambda(1 + 2\lambda))}{2n(\lambda + \lambda(1 + 2\lambda) - 2\lambda)} \\ &= -\frac{2(\lambda - \lambda - 2\lambda^2)}{2(\lambda + \lambda + 2\lambda^2 - 2\lambda)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Ainsi,  $\widehat{\lambda}_\infty^* = \widehat{\lambda}_1$ , de sorte que  $\widehat{\lambda}_1 = (x \mapsto \bar{x}) = \widehat{\lambda}_{emv}$  est le meilleur estimateur asymptotiquement sans biais de  $\lambda$ .

☞ Q3 (a) Rappel : l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur  $\widehat{\theta}$  de  $\theta$  est définie comme  $\mathbb{E} \left( (\widehat{\theta} - \theta)^2 \right)$ .

– On a  $\widehat{\lambda}_1 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$ , de sorte que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left( (\widehat{\lambda}_1 - \lambda)^2 \right) &= \mathbb{E}(\widehat{\lambda}_1^2) - \lambda^2 \\ &= \frac{1}{4} \left( \mathbb{E}(X_1^2) + 2\text{Cov}(X_1, X_2) + \mathbb{E}(X_2^2) \right) - \lambda^2 \\ &= \frac{1}{4} (2\lambda(1 + \lambda) + 2\lambda^2) - \lambda^2 \\ &= \frac{\lambda}{2} \end{aligned}$$



– De façon similaire

$$\begin{aligned}\widehat{\lambda}_2 &= \frac{1}{2} \left( \left( X_1 - \frac{X_1 + X_2}{2} \right)^2 + \left( X_2 - \frac{X_1 + X_2}{2} \right)^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( X_1^2 - X_1(X_1 + X_2) + \frac{(X_1 + X_2)^2}{4} + X_2^2 - X_2(X_1 + X_2) + \frac{(X_1 + X_2)^2}{4} \right) \\ &= \frac{1}{4} (X_1^2 + X_2^2 - 2X_1X_2)\end{aligned}$$

de sorte que

$$\mathbb{E} \left( (\widehat{\lambda}_2 - \lambda)^2 \right) = \mathbb{E} (\widehat{\lambda}_2^2) - 2\lambda \mathbb{E} (\widehat{\lambda}_2) + \lambda^2$$

Or  $\mathbb{E} (\widehat{\lambda}_2) = \frac{\lambda}{2}$ , et en outre

$$\begin{aligned}\mathbb{E} (\widehat{\lambda}_2^2) &= \frac{1}{16} \mathbb{E} \left( (X_1^2 + X_2^2 - 2X_1X_2)^2 \right) \\ &= \frac{1}{16} \mathbb{E} \left( (X_1^2 + X_2^2)^2 - 4X_1X_2(X_1^2 + X_2^2) + 4X_1^2X_2^2 \right) \\ &= \frac{1}{16} \mathbb{E} (X_1^4 + 2X_1^2X_2^2 + X_2^4 - 4X_1^3X_2 - 4X_1X_2^3 + 4X_1^2X_2^2) \\ &= \frac{1}{8} (\mathbb{E} (X_1^4) + 3\mathbb{E} (X_1^2)\mathbb{E} (X_2^2) - 4\mathbb{E} (X_1^3)\mathbb{E} (X_2)) \quad \text{par indépendance} \\ &= \frac{1}{8} (\lambda + 6\lambda^2)\end{aligned}$$

et donc

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \left( (\widehat{\lambda}_2 - \lambda)^2 \right) &= \frac{1}{8} (\lambda + 6\lambda^2) - 2\lambda \left( \frac{\lambda}{2} \right) + \lambda^2 \\ &= \frac{3}{4}\lambda^2 + \frac{1}{8}\lambda\end{aligned}$$

– Enfin,  $\widehat{\lambda}_3 = 2\widehat{\lambda}_2$  et donc

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \left( (\widehat{\lambda}_3 - \lambda)^2 \right) &= \mathbb{E} (\widehat{\lambda}_3^2) - \lambda^2 \\ &= 4\mathbb{E} (\widehat{\lambda}_2^2) - \lambda^2 \\ &= 2\lambda^2 + \frac{1}{2}\lambda\end{aligned}$$

(b) Au sens de l'erreur quadratique moyenne,  $\hat{\lambda}_1$  est toujours préférable à  $\hat{\lambda}_3$ .

De plus,

$$\begin{aligned} \hat{\lambda}_2 \text{ est préférable à } \hat{\lambda}_3 &\Leftrightarrow \mathbb{E} \left( (\hat{\lambda}_2 - \lambda)^2 \right) < \mathbb{E} \left( (\hat{\lambda}_3 - \lambda)^2 \right) \\ &\Leftrightarrow \left( 2\lambda^2 + \frac{1}{2}\lambda \right) - \left( \frac{3}{4}\lambda^2 + \frac{1}{8}\lambda \right) > 0 \\ &\Leftrightarrow \left( 2 - \frac{3}{4} \right) \lambda^2 + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) \lambda > 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda > -\frac{3}{8} \quad \text{cd qui est toujours vrai car } \lambda > 0 \end{aligned}$$

et de façon analogue

$$\begin{aligned} \hat{\lambda}_2 \text{ est préférable à } \hat{\lambda}_1 &\Leftrightarrow \mathbb{E} \left( (\hat{\lambda}_2 - \lambda)^2 \right) < \mathbb{E} \left( (\hat{\lambda}_1 - \lambda)^2 \right) \\ &\Leftrightarrow \left( \frac{\lambda}{2} \right) - \left( \frac{3}{4}\lambda^2 + \frac{1}{8}\lambda \right) > 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(c) On a  $L(k, \lambda) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ , donc  $\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda}(k, \lambda) = -1 + \frac{k}{\lambda}$  et par suite  $\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \lambda^2}(k, \lambda) = -\frac{k}{\lambda^2}$ . donc

$$\begin{aligned} I_1(\lambda) &= -\mathbb{E} \left( \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \lambda^2}(k, \lambda) \right) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k}{\lambda^2} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \frac{e^{-\lambda}}{\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

de sorte que la borne FDCR est  $\frac{\lambda}{2}$ . En particulier,  $\hat{\lambda}_3$  est efficace ssi  $2\lambda^2 + \frac{1}{2}\lambda = \frac{\lambda}{2}$ , c'est-à-dire jamais puisque  $\lambda > 0$ .

\*  
\* \*

## Énoncé de l'exercice 2

On considère une population de  $n$  individus infectés par un virus; on étudie leurs durées d'incubation  $(T_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ , dont on suppose qu'elle est observable.

Pour modéliser l'hétérogénéité de la population, on suppose qu'on peut caractériser chaque individu  $i$  par un "facteur de risque" inobservable, réalisation de la variable aléatoire  $\Lambda_i$ , de telle sorte que :

- la loi de  $T_i$ , conditionnellement à  $\Lambda_i$  est la loi exponentielle de paramètre  $\lambda_i$  (de densité  $\lambda_i e^{-\lambda_i t} \mathbf{1}_{t \geq 0}$ );
- la famille  $(\Lambda_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  est identiquement distribuée selon la loi  $\mathcal{L}$  de densité

$$f(\lambda) = \frac{\alpha^r}{\Gamma(r)} \lambda^{r-1} e^{-\alpha \lambda} \mathbf{1}_{\mathbb{R}^+}$$

où  $\alpha > 0$  et  $r > 2$ ;

- les couples  $(T_i, \Lambda_i)$  sont indépendants entre eux.

☞ Q1 Donner la vraisemblance de  $(T_1, \dots, T_n)$ .

☞ Q2 Calculer, lorsqu'il existe, le moment d'ordre  $k$   $\mathbb{E}(T_i^k)$ .

☞ Q3 Calculer l'information de Fisher du modèle.

Dans le cas où  $\alpha$  est connu, calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance de  $r$ .

Que se passe-t-il si  $\alpha$  et  $r$  sont tous deux inconnus ?

☞ Q4 On suppose  $\alpha$  connu.

Déterminer au moyen de la méthode des moments un estimateur convergent de  $r$ .

Cet estimateur est-il sans biais ? Est-il asymptotiquement efficace ?

☞ Q5 On suppose  $\alpha$  et  $r$  inconnus.

(a) En utilisant les deux premiers moments de  $T_i$ , trouver des estimateurs convergents  $\tilde{\alpha}$  et  $\tilde{r}$  de  $\alpha$  et  $r$ .

(b) Donner la loi limite du vecteur

$$\sqrt{n} \begin{pmatrix} \bar{T} - \mathbb{E}(T) \\ \bar{T}^2 - \mathbb{E}(T)^2 \end{pmatrix}$$

En déduire la loi asymptotique du vecteur  $(\tilde{\alpha}, \tilde{r})$ .

## Corrigé de l'exercice 2

⇨ Q1 Connaissant les lois de  $T_i|\Lambda_i$  et de  $\Lambda_i$ , cherchons celle de  $T_i$  : on a pour  $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f_{T_i}(t) &= \int_{\mathbb{R}} f_{T_i|\Lambda_i=\lambda}(t) f_{\Lambda_i}(\lambda) d\lambda \\ &= \int_{\mathbb{R}} (\lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{t \geq 0}) \left( \frac{\alpha^r}{\Gamma(r)} \lambda^{r-1} e^{-\alpha \lambda} \mathbf{1}_{\lambda \geq 0} \right) d\lambda \\ &= \frac{\alpha^r}{\Gamma(r)} \left( \int_0^{+\infty} \lambda^r e^{-(\alpha+t)\lambda} d\lambda \right) \mathbf{1}_{t \geq 0} \end{aligned}$$

Or par définition de la fonction  $\Gamma$

$$\int_0^{+\infty} \lambda^r (\alpha+t)^{r+1} e^{-(\alpha+t)\lambda} d\lambda = \Gamma(r+1)$$

donc

$$f_{T_i}(t) = \frac{\alpha^r}{\Gamma(r)} \frac{\Gamma(r+1)}{(\alpha+t)^{r+1}} \mathbf{1}_{t \geq 0}$$

Or  $\forall x \in \mathbb{R}^{+*}, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ , donc finalement

$$f_{T_i}(t) = \frac{r\alpha^r}{(\alpha+t)^{r+1}} \mathbf{1}_{t \geq 0}$$

Les  $(T_i)_i$  étant indépendants il vient en conséquence

$$L_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n; \alpha, r) = r^n \alpha^{nr} \frac{1}{(\prod_{i=1}^n (\alpha+t_i))^{r+1}} \mathbf{1}_{\min_i t_i \geq 0}$$

⇨ Q2 Pour  $k \in \mathbb{N}^*$  on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(T_i^k) \text{ existe} &\Leftrightarrow \int_0^{+\infty} t^k \frac{r\alpha^r}{(\alpha+t)^{r+1}} dt \text{ converge} \\ &\Leftrightarrow r+1-k > 1 \\ &\Leftrightarrow k < r \end{aligned}$$

Soit donc  $k \in \llbracket 1, r-1 \rrbracket$ , et notons  $M_k^r = \mathbb{E}(T_i^k) < +\infty$ . Alors

$$\begin{aligned} M_k^r &= \int_0^{+\infty} \left( \frac{r\alpha^r}{(\alpha+t)^{r+1}} \right) (t^k) dt \\ &\text{par parties : } u = -\frac{\alpha^r}{(\alpha+t)^r} \text{ et } v = t^k \\ &= \left[ \left( -\frac{\alpha^r}{(\alpha+t)^r} t^k \right) \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -\frac{\alpha^r}{(\alpha+t)^r} k t^{k-1} dt \\ &= +\frac{k\alpha}{r-1} \int_0^{+\infty} \frac{(r-1)\alpha^{r-1}}{(\alpha+t)^{(r-1)+1}} t^{k-1} dt \\ &= \frac{k\alpha}{r-1} M_{k-1}^{r-1} \end{aligned}$$

Donc par une récurrence immédiate pour  $r \geq 2$  et  $k < r$

$$\begin{aligned} M_k^r &= \alpha^k \frac{k!}{\prod_{i=1}^k (r-i)} M_0^{r-k} \\ &= \alpha^k \frac{k!}{\frac{(r-1)!}{(r-k-1)!}} \text{ car } M_0^{r-k} = 1 \end{aligned}$$

c'est-à-dire (en notant  $C_n^p$  le coefficient binomial  $\frac{n!}{p!(n-p)!}$ )

$$\mathbb{E}(T_i^k) = \frac{\alpha^k}{C_{r-1}^k}$$

On notera en particulier que lorsque  $r > 2$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(T_i) &= \frac{\alpha}{r-1} \\ \mathbb{E}(T_i^2) &= \frac{2\alpha^2}{(r-1)(r-2)} \\ \mathbb{V}(T_i) &= \frac{2\alpha^2}{(r-1)(r-2)} - \left( \frac{\alpha}{r-1} \right)^2 \\ &= \frac{r\alpha^2}{(r-1)^2(r-2)} \end{aligned}$$

☞ Q3 – La vraisemblance s'écrit pour  $t_1, \dots, t_n > 0$

$$\ln L_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n; \alpha, r) = n \ln r + nr \ln \alpha - (r+1) \sum_{i=1}^n \ln(\alpha + t_i)$$

et donc

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ln L_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n; \alpha, r)}{\partial r} &= \frac{n}{r} + n \ln \alpha - \sum_{i=1}^n \ln(\alpha + t_i) \\ \frac{\partial \ln L_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n; \alpha, r)}{\partial \alpha} &= \frac{nr}{\alpha} - (r+1) \sum_{i=1}^n \frac{1}{\alpha + t_i}\end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \ln L_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n; \alpha, r)}{\partial r^2} &= -\frac{n}{r^2} \\ \frac{\partial^2 \ln L_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n; \alpha, r)}{\partial r \partial \alpha} &= \frac{n}{\alpha} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{\alpha + t_i} \\ \frac{\partial^2 \ln L_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n; \alpha, r)}{\partial \alpha^2} &= -\frac{nr}{\alpha^2} + (r+1) \sum_{i=1}^n \frac{1}{(\alpha + t_i)^2}\end{aligned}$$

Pour calculer la matrice d'information de Fisher il reste à calculer

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \left( \frac{1}{(\alpha + t_i)^p} \right) &= \int_0^{+\infty} \frac{r\alpha^r}{(\alpha + t_i)^{r+p-1}} dt \\ &= r\alpha^r \left[ -\frac{1}{(r+p)} (\alpha + t_i)^{-(r+p-1)-1} \right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{r}{(r+p)\alpha^p}\end{aligned}$$

En conséquence on a

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \left( \frac{\partial^2 \ln L_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n; \alpha, r)}{\partial r^2} \right) &= -\frac{n}{r^2} \\ \mathbb{E} \left( \frac{\partial^2 \ln L_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n; \alpha, r)}{\partial r \partial \alpha} \right) &= \frac{n}{\alpha} - \frac{nr}{(r+1)\alpha} \\ &= \frac{n}{\alpha(r+1)} \\ \mathbb{E} \left( \frac{\partial^2 \ln L_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n; \alpha, r)}{\partial \alpha^2} \right) &= -\frac{nr}{\alpha^2} + n(r+1) \frac{r}{(r+2)\alpha^2} \\ &= -\frac{nr}{(r+2)\alpha^2}\end{aligned}$$

et finalement

$$I_1(r, \alpha) = \begin{pmatrix} \frac{1}{r^2} & -\frac{1}{\alpha(r+1)} \\ -\frac{1}{\alpha(r+1)} & \frac{r}{(r+2)\alpha^2} \end{pmatrix}$$

- Lorsque  $\alpha$  est connu, le modèle est paramétré par  $r$  uniquement et la vraisemblance s'écrit pour  $t_1, \dots, t_n > 0$

$$\ln L_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n; r) = n \ln r + nr \ln \alpha - (r+1) \sum_{i=1}^n \ln(\alpha + t_i)$$

et donc l'estimateur du maximum de vraisemblance  $\hat{r}$  de  $r$  vérifie

$$\frac{n}{\hat{r}} + n \ln \alpha - \sum_{i=1}^n \ln(\alpha + t_i) = 0$$

d'où on tire

$$\hat{r} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(\alpha + t_i) - \ln \alpha}$$

(la réciproque étant immédiate par concavité).

- Mais dans le cas où le modèle est paramétré  $(\alpha, r)$  l'estimateur du maximum de vraisemblance  $(\hat{\alpha}, \hat{r})$  du paramètre vérifie

$$\begin{cases} \hat{r} &= \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(\hat{\alpha} + t_i) - n \ln \hat{\alpha}} \\ \hat{\alpha} &= \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\hat{\alpha} + t_i}}{\frac{n}{\hat{\alpha}} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{\hat{\alpha} + t_i}} \end{cases}$$

dont la résolution semble hors de portée (*i.e.*  $\hat{\alpha}$  n'admet pas d'expression analytique, sauf dans le cas dégénéré où  $t = (0)$ ).

- ⇒ Q4 Constatant que  $\bar{t} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \mathbb{E}(T_i) = \frac{\alpha}{r-1}$ , posons  $\hat{r} = 1 + \frac{\alpha}{\bar{t}}$ ; alors  $\hat{r}$  est un estimateur convergent (presque sûr) de  $r$  puisque  $(u \mapsto \frac{1}{u})$  est continue. Cependant, à distance finie on observe que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{r}) &= \mathbb{E}\left(1 + \frac{\alpha}{\bar{T}}\right) \\ &> 1 + \frac{\alpha}{\mathbb{E}(\bar{T})} \quad \text{d'après Jensen} \\ &= r \end{aligned}$$

de sorte que  $\hat{r}$  est biaisé et sur-estime systématiquement  $r$  (et n'est a fortiori pas efficace à distance finie).

Enfin, appliquant le Théorème Central Limite à  $\bar{T}$  il vient

$$\sqrt{n} (\bar{T} - \mathbb{E}(\bar{T})) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \mathbb{V}(T_1))$$

car  $T_1, \dots, T_n$  sont indépendants.

Soit alors  $g : \begin{pmatrix} \mathbb{R}^{+*} & \rightarrow & \mathbb{R}^{+*} \\ s & \mapsto & 1 + \frac{\alpha}{s} \end{pmatrix}$ ;  $g$  est de classe  $C^\infty$  et donc d'après Slutsky

$$\sqrt{n} (g(\bar{T}) - g(\mathbb{E}(\bar{T}))) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, g' \left( \frac{\alpha}{r-1} \right)^2 \left( \frac{r\alpha^2}{(r-1)^2(r-2)} \right)\right)$$

soit

$$\sqrt{n}(\hat{r} - r) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \frac{r(r-1)^2}{r-2}\right)$$

Constatant finalement que  $\frac{r(r-1)^2}{r-2} > r^2$  pour  $r > 2$ , on conclut que  $\hat{r}$  n'est **pas** asymptotiquement efficace.

☞ Q5 (a) Observant la réalisation empirique  $\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^2 \end{pmatrix}$  des moments théoriques

$$\begin{pmatrix} \mathbb{E}(T_i) \\ \mathbb{E}(T_i^2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\alpha}{r-1} \\ \frac{2\alpha^2}{(r-1)(r-2)} \end{pmatrix}, \text{ on détermine } (\tilde{\alpha}, \tilde{r}) \text{ de façon à ce que}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\tilde{\alpha}}{\tilde{r}-1} \\ \frac{2\tilde{\alpha}^2}{(\tilde{r}-1)(\tilde{r}-2)} \end{pmatrix}$$

En l'occurrence on pose

$$\boxed{\begin{cases} \tilde{\alpha} = \frac{\bar{t} \bar{t}^2}{\bar{t}^2 - 2(\bar{t})^2} \\ \tilde{r} = \frac{2(\bar{t}^2 - (\bar{t})^2)}{\bar{t}^2 - 2(\bar{t})^2} \end{cases}} \text{ en notant } \begin{cases} \bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \\ \bar{t}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^2 \neq (\bar{t})^2 \end{cases}$$

ce qui assure que  $(\tilde{\alpha}, \tilde{r})$  est un estimateur convergent (presque sûr) de  $(\alpha, r)$ .

(b) On a successivement

$$\mathbb{V}(T_i) = \frac{r\alpha^2}{(r-1)^2(r-2)}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(T_i^2) &= \mathbb{E}(T_i^4) - (\mathbb{E}(T_i^2))^2 \\ &= \frac{24\alpha^4}{(r-1)(r-2)(r-3)(r-4)} - \frac{4\alpha^4}{(r-1)^2(r-2)^2} \\ &= \frac{4r\alpha^4(5r-11)}{(r-1)^2(r-2)^2(r-3)(r-4)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(T_i, T_i^2) &= \mathbb{E}(T_i^3) - \mathbb{E}(T_i)\mathbb{E}(T_i^2) \\ &= \frac{6\alpha^3}{(r-1)(r-2)(r-3)} - \frac{2\alpha^3}{(r-1)^2(r-2)} \\ &= \frac{4r\alpha^3}{(r-1)^2(r-2)(r-3)} \end{aligned}$$

de sorte que d'après le Théorème Central Limite

$$\sqrt{n} \begin{pmatrix} \bar{T} - \mathbb{E}(T_i) \\ \bar{T}^2 - \mathbb{E}(T_i^2) \end{pmatrix} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{r\alpha^2}{(r-1)^2(r-2)} & \frac{4r\alpha^3}{(r-1)^2(r-2)(r-3)} \\ \frac{4r\alpha^3}{(r-1)^2(r-2)(r-3)} & \frac{4r\alpha^4(5r-11)}{(r-1)^2(r-2)^2(r-3)(r-4)} \end{pmatrix} \right)$$



Posons donc  $g : \begin{pmatrix} \mathbb{R}^{+*2} & \rightarrow & \mathbb{R}^{+*2} \\ (m_1, m_2) & \mapsto & \left( \frac{m_1 m_2}{m_2 - 2m_1^2}, \frac{2(m_2 - m_1)}{m_2 - 2m_1^2} \right) \end{pmatrix}$  ;  
 $g$  est de classe  $C^\infty$  et de Jacobienne

$$Jac g(m_1, m_2) = \begin{pmatrix} \frac{m_2(m_2+2m_1^2)}{(m_2-2m_1^2)^2} & \frac{4m_1 m_2}{(m_2-2m_1^2)^2} \\ \frac{-2m_1^3}{(m_2-2m_1^2)^2} & \frac{-2m_1^2}{(m_2-2m_1^2)^2} \end{pmatrix}$$

En définitive on a<sup>10</sup>

$$\sqrt{n} \left( \begin{pmatrix} \tilde{\alpha} \\ \tilde{r} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \alpha \\ r \end{pmatrix} \right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{m_2(m_2+2m_1^2)}{(m_2-2m_1^2)^2} & \frac{-2m_1^3}{(m_2-2m_1^2)^2} \\ \frac{4m_1 m_2}{(m_2-2m_1^2)^2} & \frac{-2m_1^2}{(m_2-2m_1^2)^2} \end{pmatrix} \\ \times \begin{pmatrix} \frac{r\alpha^2}{(r-1)^2(r-2)} & \frac{4r\alpha^3}{(r-1)^2(r-2)(r-3)} \\ \frac{4r\alpha^3}{(r-1)^2(r-2)(r-3)} & \frac{4r\alpha^4(5r-11)}{(r-1)^2(r-2)^2(r-3)(r-4)} \end{pmatrix} \\ \times \begin{pmatrix} \frac{m_2(m_2+2m_1^2)}{(m_2-2m_1^2)^2} & \frac{4m_1 m_2}{(m_2-2m_1^2)^2} \\ \frac{-2m_1^3}{(m_2-2m_1^2)^2} & \frac{-2m_1^2}{(m_2-2m_1^2)^2} \end{pmatrix} \end{pmatrix} \right)$$

\*  
\* \*

### Enoncé de l'exercice 3

On considère les réalisations de  $T$  variables aléatoires i.i.d.  $Y_1, Y_2, \dots, Y_T$ , issues d'une loi de Poisson de paramètre  $\lambda$  inconnu.

On s'intéresse au test de l'hypothèse :

$$H_0 : " \lambda = \lambda_0 " \text{ contre } H_a : " \lambda \neq \lambda_0 "$$

où  $\lambda_0$  est un réel donné.

☞ Q1 Pour tester ce type d'hypothèse, on dispose de trois tests asymptotiques usuels : test de **Wald**, du **score** et du **rapport de maximum de vraisemblance**. Rappeler rapidement leur principe et définir les statistiques de test sur lesquelles ils s'appuient.

☞ Q2 Pratiquer explicitement chacun de ces tests, en calculant l'expression de la statistique de test  $\xi_T^{test}$  et en définissant la région critique au seuil  $\alpha \in [0, 1]$  :  $W_\alpha = \{(y_1, \dots, y_T) / \xi_T^{test}(y_1, \dots, y_T) > q_{1-\alpha}^{\chi_1^2}\}$

☞ Q3 On veut tester  $\lambda_0 = 1$  au seuil  $\alpha = 5\%$ .

Décider de chacun des tests dans le cas où l'échantillon observé  $(y_1, \dots, y_T)$  est tel que :

- $T = 100$  et  $\bar{y} = 1, 2$  ;
- $T = 200$  et  $\bar{y} = 1, 1$  .

Discuter de l'acceptation de  $H_0$  et expliquer pourquoi certains tests ne conduisent pas à la même décision.

Conclure.

<sup>10</sup>Nous ne chercherons pas à simplifier davantage cette expression malgré l'intérêt manifeste que cela présenterait ...

### Corrigé de l'exercice 3

☞ Q1 Rappel : Étant donné un modèle statistique paramétré par  $\theta$ , et une hypothèse  $H_0$  sur  $\theta$ , construire un *test* de niveau  $\alpha \in [0, 1[$ , c'est déterminer une statistique dont la loi  $\mathcal{L}_0$ , si  $H_0$  est vraie, est :

- complètement déterminée
- “sympathique” (*i.e.*, bien connue et tabulée)

Effectuer le test revient alors à comparer à  $1 - \alpha$  la vraisemblance de la réalisation de la statistique, au moyen de la table de la loi  $\mathcal{L}_0$ .

On appelle alors *erreur de première espèce*  $\alpha$  du test considéré la probabilité de rejeter  $H_0$  alors qu'elle est vraie, et *erreur de seconde espèce*  $\beta$  la probabilité d'accepter  $H_0$  alors qu'elle est fautive. Si  $R$  désigne la zone de rejet (ensemble des observations conduisant à  $\neg H_0$ ), on a  $\alpha = \mathbb{P}_{H_0}(W)$  et  $\beta = 1 - \mathbb{P}_{\neg H_0}(W)$  (qui est donc difficilement calculable). Enfin, on définit habituellement  $\rho = 1 - \beta$  la *puissance* du test.

On cherche ici à tester l'hypothèse  $H_0 : \lambda = \lambda_0$  contre  $H_a = \neg H_0$ .

- Test de Wald :

Constatant que si  $\hat{\lambda}$  est un estimateur asymptotiquement efficace de  $\lambda$ , alors

$$\sqrt{n} (\hat{\lambda} - \lambda_0) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, I_1(\lambda_0)^{-1})$$

si  $H_0$  est vraie, et donc

$$n (\hat{\lambda} - \lambda_0)' I_1(\lambda_0) (\hat{\lambda} - \lambda_0) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_k^2$$

où  $k$  est le nombre de contraintes (supposées linéaires) imposées par l'hypothèse  $H_0$ ; dans le cas présent, on a  $k = 1$ . En se fondant sur l'approximation convergente  $I_1(\hat{\lambda})$  de  $I_1(\lambda_0)$  on pose donc

$$\xi_n^W = n (\hat{\lambda} - \lambda_0)' I_1(\hat{\lambda}) (\hat{\lambda} - \lambda_0) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_k^2$$

- Test du score :

La normalité asymptotique de l'estimateur du maximum de vraisemblance permet d'en déduire celle du score grâce au théorème de Slutsky :

$$\sqrt{n} (S(\hat{\lambda}) - S(\lambda_0)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \frac{\partial g}{\partial \lambda}(\lambda_0)^2 I_1(\lambda_0)^{-1}\right)$$

où  $g : x \mapsto \frac{\partial \ln \mathcal{L}}{\partial \lambda}(x)$  D'après le théorème central limite

$$\frac{1}{n} g(\hat{\lambda})^2 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \mathbb{E}(g(\lambda_0)^2) = -I_1(\lambda_0)$$

de sorte que finalement

$$\sqrt{n} (S(\lambda) - S(\lambda_0)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} (0, (nI_1(\lambda_0))^2 I_1(\lambda_0)^{-1})$$

Donc

$$\frac{\sqrt{n}}{n} (S(\lambda) - S(\lambda_0)) I_1(\hat{\lambda}) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} (0, 1)$$

et par conséquent

$$\frac{1}{n} S(\lambda_0)' I_1(\lambda_0)^{-1} S(\lambda_0) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_k^2$$

On définit donc

$$\xi_n^S = \frac{1}{n} S(\lambda_0)' I_1(\lambda_0)^{-1} S(\hat{\lambda}) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_k^2$$

– Test du *rapport des maxima de vraisemblance* :

Sous réserve que la vraisemblance soit suffisamment régulière et que le modèle statistique soit homogène et dominé on a en développant à l'ordre deux

$$\begin{aligned} \ln \mathcal{L}_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \lambda) &= \ln \mathcal{L}_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \lambda_0) + \frac{\partial \ln \mathcal{L}_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \lambda_0)}{\partial \lambda} (\lambda - \lambda_0) \\ &+ \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \lambda_0)}{\partial \lambda^2} (\lambda - \lambda_0)^2 + o_{\mathbb{P}_{\lambda_0}}((\lambda - \lambda_0)^2) \end{aligned}$$

et donc par la loi forte des grands nombres

$$\ln \mathcal{L}_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \lambda) - \ln \mathcal{L}_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \lambda_0) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \mathbb{E}(S(\lambda_0)) - \frac{1}{2} I_n(\lambda_0) (\lambda - \lambda_0)^2 + o(\lambda - \lambda_0)^2$$

et comme

$$\sqrt{n} (\hat{\lambda} - \lambda_0) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} (0, I_1(\lambda_0)^{-1})$$

il s'ensuit que

$$2 (\ln \mathcal{L}_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \lambda_0) - \ln \mathcal{L}_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \hat{\lambda})) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_k^2$$

On pose donc

$$\xi_n^{mv} = 2 (\ln L^{-H_0}(\hat{\lambda}) - \ln L^{H_0}(\lambda_0)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_k^2$$

Pour chacun de ces tests  $\xi_n^{\dots}$ , on accepte finalement l'hypothèse  $H_0$  au niveau  $\alpha$  *ssi*

$$\xi_n^{\dots}(y_1, \dots, y_n) < q_{1-\alpha}^{\chi_k^2}$$

où  $q_{1-\alpha}^{\chi_k^2}$  désigne le fractile de niveau  $1 - \alpha$  de la loi du  $\chi^2$  à  $k$  degrés de liberté.

Notons que ces trois tests sont asymptotiquement équivalents.

⇨ Q2 On a pour  $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{N}^n$

$$L(y_1, \dots, y_n; \lambda) = \prod_{i=1}^n \left( e^{-\lambda} \frac{\lambda_i^{y_i}}{y_i!} \right)$$

dont on tire que  $\hat{\lambda} = \bar{y}$ ; il reste à calculer explicitement  $\xi^W$ ,  $\xi^S$  et  $\xi^{mv}$ .

– Test de Wald :

On sait d'après le Théorème Central Limite que

$$\sqrt{n} (\hat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \lambda)$$

car  $I(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$ , donc sous forme centrée réduite il vient

$$\sqrt{n} \frac{\hat{\lambda} - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$$

et donc

$$n \frac{(\hat{\lambda} - \lambda)^2}{\lambda} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_1^2$$

et comme  $\hat{\lambda} = \bar{y} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \lambda$  on pose

$$\xi^W(y_1, \dots, y_n) = n \frac{(\bar{y} - \lambda_0)^2}{\bar{y}}$$

De cette façon, si  $H_0$  est vraie alors  $\xi^W(y_1, \dots, y_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \chi_1^2$ , tandis que sinon

$$\xi^W(y_1, \dots, y_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} (+\infty).$$

– Test du score :

On a

$$\ln L(y_1, \dots, y_n; \lambda) = -n\lambda + \left( \sum_{i=1}^n y_i \right) \ln(\lambda) - \sum_{i=1}^n \ln(y_i!)$$

d'où on tire

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda}(y_1, \dots, y_n; \lambda_0) = -n + \frac{n\bar{y}}{\lambda_0}$$

Le théorème central limite appliqué au vecteur score s'écrit

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \left( \frac{\partial \ln L}{\partial \lambda}(y_1, \dots, y_n; \lambda_0) \right) \sqrt{\lambda_0} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{\lambda_0}\right)$$

si  $H_0$  est vraie, auquel cas

$$\xi_n^S = n \frac{(\bar{y} - \lambda_0)^2}{\lambda_0} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_1^2$$

– Test du rapport des maxima de vraisemblance :

On a

$$\ln L^{-H_0}(y_1, \dots, y_n; \hat{\lambda}) = -n\bar{y} + \left( \sum_{i=1}^n y_i \right) \ln(\bar{y}) - \sum_{i=1}^n \ln(y_i!)$$

et

$$\ln L^{H_0}(y_1, \dots, y_n; \lambda_0) = -n\lambda_0 + \left( \sum_{i=1}^n y_i \right) \ln(\lambda_0) - \sum_{i=1}^n \ln(y_i!)$$

et donc finalement

$$\xi^{mv}(y_1, \dots, y_n) = 2n(\bar{y}(\ln \bar{y} - 1) + \lambda_0 - \ln \lambda_0) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_1^2$$

si  $H_0$  est vraie.

On en tire alors  $W_\alpha^{test} = \{(y_1, \dots, y_T) / \xi_T^{test}(y_1, \dots, y_T) > q_{1-\alpha}^{\chi_1^2}\}$  pour  $test \in \{W, S, mv\}$ .

☞ Q3 Application numérique :  $\lambda_0 = 1, q_{1-5\%}^{\chi_1^2} = 3,84$

Test	$n = 100$ $\bar{y} = 1,2$	$n = 200$ $\bar{y} = 1,1$
Wald	$\xi_{100}^W = 3,33$ $H_0$ acceptée	$\xi_{200}^W = 1,82$ $H_0$ acceptée
Score	$\xi_{100}^S = 4$ $H_0$ <b>rejetée</b>	$\xi_{200}^S = 2$ $H_0$ acceptée
M.V.	$\xi_{100}^{mv} = 3,76$ $H_0$ acceptée	$\xi_{200}^{mv} = 1,94$ $H_0$ acceptée

Il apparaît que pour  $n = 200, H_0$  est unanimement acceptée au seuil de 5% ; la situation est moins nette lorsque  $n = 100$  :

- à la fois parce que le test du score conduit à rejeter  $H_0$  au contraire des deux autres tests ;
- et parce que même pour ceux-là la statistique est proche du fractile  $q_{1-5\%}^{\chi_1^2}$

Sachant que ces tests devraient être asymptotiquement équivalents (donc en particulier conduire à la même décision, pour une observation donnée), on peut en conclure hardiment que  $n = 100$  n'est **pas** "asymptotiquement grand".

Quant à décider de l'acceptation, une première solution serait d'affiner ou d'élargir le seuil d'acceptation, par exemple en choisissant  $\alpha = 10\%$  (ce qui conduirait à accepter unanimement  $H_0$ ) ou à l'inverse  $\alpha = 1\%$  (ce qui conduirait à rejeter unanimement  $H_0$ ) ; mais modifier a posteriori le problème posé de façon à savoir le résoudre est une démarche un peu discutable . . .

On remarquera plutôt que l'issue d'un test pour  $n_2 > n_1$  est toujours préférable à celle pour  $n_1$  puisque ce test n'est justifié qu'asymptotiquement ; comme en outre ces tests sont asymptotiquement équivalents, à partir d'un certain rang il seront tous unanimes, et c'est cette décision qu'il faut retenir. Dans le cas présent, on retiendra donc l'issue (unanime) des tests pour  $n = 200$ , à savoir l'**acceptation** de  $H_0$  au seuil 5%.

★  
★ ★

## 7 Travaux Dirigés n°7

### Énoncé de l'exercice 1

Pour étudier l'arrivée des appels dans un central téléphonique, on comptabilise lors de 200 observations consécutives, le nombre d'appels observés par seconde, ce qui produit les résultats suivants :

Nombre d'appels par seconde	Effectifs observés
0	6
1	15
2	40
3	42
4	37
5	30
6	10
7	9
8	5
9	3
10	2
11	1

On suppose les arrivées des appels indépendantes, et en outre que la probabilité élémentaire  $\lambda dt$  qu'il arrive un appel entre les instants  $t$  et  $t + dt$  est indépendante de la date  $t$ .

Autrement dit

- le nombre  $N_t$  d'appels observés sur l'intervalle de temps  $[0, t]$  suit une loi de Poisson de paramètre  $\lambda t$ .
- plus généralement  $N_{t+s} - N_t$  est indépendant de  $N_t$  et suit une loi de Poisson de paramètre  $\lambda s$ .

- ☞ Q1 (a) Tester l'adéquation de la loi empirique à la famille des lois de Poisson.  
(b) Quel est le niveau limite permettant d'accepter l'adéquation à la loi de Poisson ?
- ☞ Q2 A une date antérieure le nombre d'appels sur un intervalle de temps  $[0, t]$  suivait une loi de Poisson de paramètre 4.  
Tester la stabilité du comportement entre les deux dates.
- ☞ Q3 Que donnerait un test d'adéquation à une loi de Poisson de paramètre 3,7 ? Conclure.

Table de la loi de Poisson :

	$\mathbb{P}_{3,7}(X = k)$	$\mathbb{P}_4(X = k)$
0	0.0247	0,0183
1	0.0915	0,0733
2	0.1684	0,1465
3	0.2087	0,1957
4	0.1930	0,1954
5	0.1428	0,1563
6	0.0881	0,1042
7	0.0465	0,0595
8	0.0215	0,0298
9	0.0099	0,0132
10	0.0046	0,0053
11	0.0021	0,0019
12	0.0001	0,0006
13	< 0.0001	0,0002
14	< 0.0001	0,0001

## Corrigé de l'exercice 1

⇒ Q1 (a) Rappel :

Essentiellement, si  $(X_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \stackrel{iid}{\rightsquigarrow} \mathcal{L}$  loi discrète sur  $\llbracket 1, m \rrbracket$ , et si  $p_k = \mathbb{P}(X_i = k)$  et  $N_k = |\{i/X_i = k\}|$  est le nombre de réalisations de  $k \in \llbracket 1, m \rrbracket$ , alors (en appliquant le Théorème Central Limite centré réduit à  $(N_1, \dots, N_m)$  puis en l'"élevant au carré") on a

$$\xi_n^{\text{adéq}} = \sum_{k=1}^m \frac{(N_k - np_k)^2}{np_k} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_{m-1}^2$$

(cf cours de Paul Doukhan, théorème 9.2) On en déduit une région de test asymptotique de niveau  $\alpha \in ]0, 1[$  :  $W_n^{\text{adéq}} = \{\xi_n^{\text{adéq}} > q_{1-\alpha}^{\chi_{m-1}^2}\}$ . A distance finie on s'assurera avant d'appliquer ce test asymptotique que  $\forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket, np_k > 5$ , quitte à fusionner plusieurs classes : cette condition est requise pour que l'approximation d'une binômiale en normale soit raisonnable. Enfin, dans le cas d'une loi continue on se ramènera au cas précédent en discrétisant l'espace des réalisations en  $m$  classes.

Pourquoi ne pas utilise le test de Kolmogorov-Smirnov ? (cf théorème 9.3)

D'une certaine façon ce test se fonde sur la distance en  $\|\cdot\|_\infty$  tandis que le test du  $\chi^2$  se fonde sur la distance en  $\|\cdot\|_2$  entre la loi théorique et la loi empirique. De plus, ce test

utilise une statistique dont on ne sait pas exprimer la loi limite (mais on sait la tabuler) ; à l'inverse le test du  $\chi^2$  utilise une statistique dont la loi limite est bien connue mais nécessite de discrétiser l'univers continu en classes ce qui introduit une erreur. De toute façon ce test est inapplicable ici car la loi de Poisson est discrète, tandis que le test du  $\chi^2$  est bien adapté.

Pour tester l'adéquation à une famille de lois paramétrée, une idée naturelle est de tester l'adéquation simple à la loi la plus vraisemblable, c'est-à-dire à la loi dont le paramètre est l'estimateur du maximum de vraisemblance.

Considérons donc le modèle statistique  $(\mathbb{N}^{200}, \tau, (\mathcal{P}(\lambda)^{\otimes 200})_{\lambda \in \mathbb{R}^{+*}})$ . Dans ce modèle la vraisemblance s'écrit  $L_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \lambda) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}$  et l'estimateur du maximum de vraisemblance est donc  $\hat{\lambda} = \bar{X}$  ; on a numériquement

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{6 \cdot 0 + 15 \cdot 1 + 40 \cdot 2 + 42 \cdot 3 + 37 \cdot 4 + 30 \cdot 5 + 10 \cdot 6 + 9 \cdot 7 + 5 \cdot 8 + 9 \cdot 3 + 2 \cdot 10 + 1 \cdot 11}{200} \\ &\simeq 3,7 \end{aligned}$$

En conséquence, si la famille  $(X_i)_i$  suivait bien une loi de Poisson, celle-ci serait de paramètre  $\hat{\lambda} \simeq 3,7$  et par conséquent on aurait

$$\begin{aligned} \forall k \in \llbracket 0, 11 \rrbracket, \hat{p}_k &= \mathbb{P}_{\hat{\lambda}}(X_i = k) \\ &= e^{-\hat{\lambda}} \frac{\hat{\lambda}^k}{k!} \\ &\simeq e^{-3,7} \frac{3,7^k}{k!} \end{aligned}$$

et il ne reste plus qu'à pratiquer un test d'adéquation simple à la loi  $\mathcal{P}(\hat{\lambda})$ .

Pour ce faire, afin de préserver la légitimité du test asymptotique à distance finie on s'assure que  $\forall k \in \llbracket 0, 11 \rrbracket, N_k < 5$ , ce qui conduit à fusionner les quatre dernières modalités selon le tableau suivant :

Modalité	Effectif observé
$X_i = 0$	$N_0 = 6$
$X_i = 1$	$N_1 = 15$
$X_i = 2$	$N_2 = 40$
$X_i = 3$	$N_3 = 42$
$X_i = 4$	$N_4 = 37$
$X_i = 5$	$N_5 = 30$
$X_i = 6$	$N_6 = 10$
$X_i = 7$	$N_7 = 9$
$X_i \geq 8$	$N_8 = 11$

Par conséquent  $\xi_{200}^{\text{adéq}} = \sum_{k=0}^8 \frac{(N_k - n\hat{p}_k)^2}{n\hat{p}_k} \simeq 7,58$ . Or si  $(X_i)_i$  suit bien une certaine loi de poisson, alors  $\xi_{200}^{\text{adéq}}$  suit une loi du  $\chi^2$  à  $(9 - 1) - \dim(\mathbb{R}^{+*}) = 7$  degrés de liberté (puisque l'on n'a conservé que 9 classes). Le fractile de niveau 5% valant  $q_{95\%}^{\chi_7^2} \simeq 14,1$ , on



**accepte** finalement au seuil 5% l'hypothèse d'adéquation de la vrai loi inconnue de  $(X_i)_i$  à la famille des lois de Poisson ; on peut en outre affirmer que  $(X_i)_i$  suit vraisemblablement une loi de Poisson de paramètre 3,7.

- (b) Le niveau limite entre l'acceptation et le rejet de l'hypothèse pour l'échantillon observé est par définition la *p-value*, qui est telle que  $\xi_{200}^{\text{adéq}} = q_{p\text{-value}}^{\chi^2_7}$  ; on a ici *p-value*  $\simeq 19\%$ , ce qui est assez élevé : l'hypothèse est rejetée au seuil 20%, mais acceptée à tout niveau  $\alpha \leq 18\%$ .

☞ Q2 On cherche cette fois à tester l'adéquation simple de la loi des  $(X_i)_i$  à la loi de Poisson de paramètre 4.

De la même façon que dans le cas précédent les quatre dernières classes doivent être regroupées, et on calcule successivement  $p_k = e^{-4} \cdot \frac{4^k}{k!}$  pour  $k \in \llbracket 0, 8 \rrbracket$ , puis  $\xi_{200}^{\text{adéq}} = \sum_{k=0}^8 \frac{(N_k - np_k)^2}{np_k} \simeq 16,8$ , qui est censée suivre une loi du  $\chi^2$  à  $(9 - 1) = 8$  degrés de liberté (il n'y a pas de paramètre à estimer ici, donc  $\dim(\Theta) = 0$ ). Comme  $q_{99\%}^{\chi^2_8} \simeq 20,09$  on **accepte** l'hypothèse de stabilité au niveau 1%.

☞ Q3 De façon similaire, on reprend  $p_k = e^{-3,7} \frac{3,7^k}{k!}$  pour  $k \in \llbracket 0, 8 \rrbracket$ , ce dont on tire  $\xi_{200}^{\text{adéq}} \simeq 7,58$ , qui est censée suivre une loi du  $\chi^2$  à 8 degrés de liberté (là encore,  $\lambda = 3,7$  est donné a priori et il n'y a pas de paramètre à estimer). Bien évidemment, 3,7 étant la valeur de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le modèle statistique d'une famille de lois de Poisson de paramètre inconnu, à laquelle l'adéquation a déjà été acceptée au niveau  $\alpha$ , l'adéquation simple à la loi de paramètre  $\hat{\lambda} = 3,7$  est **nécessairement** acceptée au même niveau  $\alpha$  puisque  $1 - F_{\chi^2_8}(x) > 1 - F_{\chi^2_7}(x)$  pour tout  $x$ .

En définitive, en notant  $p^{\chi^2}(k)$  la p-value de la loi du  $\chi^2$  à  $k$  degrés de liberté on a :

$\xi_{200}^{\text{adéq}}$	Adéquation à la famille $\mathcal{P}(\lambda)_\lambda$	Adéquation simple à la loi $\mathcal{P}(3,7)$
$[0, q^{\chi^2}(7)[$	acceptée	acceptée
$]q^{\chi^2}(7), q^{\chi^2}(8)[$	rejetée	acceptée
$]q^{\chi^2}(8), +\infty[$	rejetée	rejetée

\*  
\* \*

## Enoncé de l'exercice 2

On s'intéresse à la proportion des ménages équipés d'un magnétoscope. Pour cela, on tire de manière équiprobable avec remise un échantillon de  $n$  ménages, et on observe pour chaque ménage  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  la variable

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{si le ménage } i \text{ est équipé} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- ☞ Q1 Réaliser un test de l'hypothèse nulle : "la proportion des ménages équipés n'excède pas 20 %".
- ☞ Q2 On se demande si la probabilité qu'un ménage  $i$  soit équipé n'est pas fonction d'une variable (scalaire)  $x_i$  donnée (revenu, âge du chef de famille...).
- On définit à cet effet un modèle statistique conditionnel à  $X_i$  de la façon suivante :

$$\mathbb{P}(y_i = 1 \mid x_i) = \frac{e^{a+bx_i}}{1 + e^{a+bx_i}}$$

où  $a$  et  $b$  sont deux paramètres réels inconnus.

On cherche alors à tester  $H_0 : b = 0$ .

- (a) Calculer le score et la matrice d'information de Fisher du modèle pour  $n$  observations.
- (b) Expliciter le modèle contraint par  $H_0$ .

Calculer les estimateurs du maximum de vraisemblance  $\hat{a}^0$  et  $\hat{b}^0$  de  $a$  et  $b$  dans ce modèle, puis évaluer le score en  $(\hat{a}^0, \hat{b}^0)$ .

- (c) Donner un estimateur  $\hat{I}_1^{H_0}$  de  $I_1$ , convergent sous  $H_0$  et fonction des estimateurs contraints des paramètres.
- (d) Exprimer la statistique du test du score de l'hypothèse  $H_0$ .  
Quelle est sa loi asymptotique sous  $H_0$ ? Sur quelle corrélation repose le test?

## Corrigé de l'exercice 2

- ☞ Q1 Soit  $p$  la vraie probabilité qu'un ménage soit équipé en magnétophone (on identifiera la proportion de ménages équipés à  $p$ ). On a immédiatement  $\hat{p}(y_1, \dots, y_n) = \bar{y}$ , pour lequel  $\sqrt{n}(\hat{p} - p) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, p(1-p))$

En appliquant la même méthode que pour l'exercice exercice 3,  
on montre qu'on accepte  $H_0 : "p \leq p_0 = 20\%"$  ssi  $\bar{y} < k_\alpha$  avec

$$k_\alpha = p_0 + q_{1-\alpha}^{\mathcal{N}(0,1)} \sqrt{\frac{\bar{y}((1-\bar{y}))}{n}}$$

- ☞ Q2 (a) La vraisemblance du modèle s'écrit pour  $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{+n}$  et  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$$L_{Y_1, \dots, Y_n \mid X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n}(y_1, \dots, y_n; a, b) = \prod_{i=1}^n \frac{(e^{a+bx_i})^{y_i}}{1 + e^{a+bx_i}}$$

Le score s'écrit donc

$$\frac{\partial L_{Y_1, \dots, Y_n \mid X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n}}{\partial \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}}(y_1, \dots, y_n; a, b) = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n \left( y_i - \frac{e^{a+bx_i}}{1+e^{a+bx_i}} \right) \\ \sum_{i=1}^n \left( y_i - \frac{e^{a+bx_i}}{1+e^{a+bx_i}} \right) x_i \end{pmatrix}$$

et l'information de Fisher est donc

$$I_n(a, b) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E} \left( \frac{e^{a+bx_i}}{(1 + e^{a+bx_i})^2} \begin{pmatrix} 1 & x_i \\ x_i & x_i^2 \end{pmatrix} \right)$$

qu'on ne peut expliciter davantage sans hypothèse sur la distribution de  $(X_i)_i$ .

(b) Sous l'hypothèse  $H_0$  : " $b = 0$ " il vient

$$\forall x_i \in \mathbb{R}, \mathbb{P}_{H_0}(Y_i = 1 | X_i = x_i) = \frac{e^a}{1 + e^a}$$

c'est-à-dire que  $(Y_i | X_i)$  suit une binômiale de paramètre  $p_0 = \frac{e^a}{1+e^a}$  indépendant de  $x_i$ .

La vraisemblance conditionnelle sous  $H_0$  est donc

$$L_{Y_1, \dots, Y_n | X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n}^{H_0}(y_1, \dots, y_n; a, b) = \frac{e^{a \sum_{i=1}^n y_i}}{(1 + e^a)^n}$$

et un estimateur  $\hat{a}^0$  de  $a$  vérifie donc, sous  $H_0$ ,  $\frac{e^{\hat{a}^0}}{1+e^{\hat{a}^0}} = \bar{y}$ , soit  $\hat{a}^0 = \ln \frac{\bar{y}}{1-\bar{y}}$ . On a bien entendu  $\hat{b}^0 = 0$ .

Il vient alors

$$\frac{\partial L_{Y_1, \dots, Y_n | X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n}^{H_0}}{\partial \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}}(y_1, \dots, y_n; \hat{a}^0, \hat{b}^0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) x_i \end{pmatrix}$$

(c) La matrice d'information de Fisher sous  $H_0$  est

$$I_n(a, b) =_{|H_0} \frac{e^a}{(1 + e^a)^2} \mathbb{E} \left( \sum_{i=1}^n \begin{pmatrix} 1 & x_i \\ x_i & x_i^2 \end{pmatrix} \right)$$

Or  $\frac{e^{\hat{a}^0}}{1+e^{\hat{a}^0}} = \bar{y}$ , donc  $\frac{e^{\hat{a}^0}}{(1+e^{\hat{a}^0})^2} = \bar{y}(1 - \bar{y})$  et par conséquent (en notant  $\bar{x}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$ )

$$\widehat{I}_1^{H_0} = \bar{y}(1 - \bar{y}) \begin{pmatrix} 1 & \bar{x} \\ \bar{x} & \bar{x}^2 \end{pmatrix}$$

est un estimateur convergent de  $I_1$  si  $H_0$  est vraie.

(d) On a par définition

$$\xi_n^S = \frac{1}{n} \widehat{S}^0 \left( \widehat{I}_1^{H_0} \right)^{-1} \widehat{S}^0$$

en notant  $\widehat{S}^0 = \frac{\partial L_{Y_1, \dots, Y_n | X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n}}{\partial (a, b)'}(y_1, \dots, y_n; \hat{a}^0, \hat{b}^0)$ .

Or

$$\begin{aligned} \left( \widehat{I}_1^{H_0} \right)^{-1} &=_{|H_0} \frac{1}{\bar{y}(1 - \bar{y})} \cdot \left( \begin{pmatrix} 1 & \bar{x} \\ \bar{x} & \bar{x}^2 \end{pmatrix} \right)^{-1} \\ &=_{|H_0} \frac{1}{\bar{y}(1 - \bar{y})} \cdot \frac{1}{\bar{x}^2 - (\bar{x})^2} \cdot \begin{pmatrix} \bar{x}^2 & -\bar{x} \\ -\bar{x} & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 & \xi_n^S(y_1, \dots, y_n) \\
 =_{|H_0} & \frac{1}{n} \left( 0, \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) x_i \right) \times \left( \frac{1}{\bar{y}(1-\bar{y})} \frac{1}{\bar{x}^2 - (\bar{x})^2} \begin{pmatrix} \bar{x}^2 & -\bar{x} \\ -\bar{x} & 1 \end{pmatrix} \right) \times \begin{pmatrix} 0 \\ \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) x_i \end{pmatrix} \\
 =_{|H_0} & \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) x_i \right) \cdot \frac{1}{\bar{y}(1-\bar{y})} \frac{1}{\bar{x}^2 - (\bar{x})^2} \cdot \left( \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) x_i \right) \\
 =_{|H_0} & \frac{1}{\bar{y}(1-\bar{y})} \cdot \frac{(\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) x_i)^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}
 \end{aligned}$$

Par construction, si  $H_0$  est vraie alors

$$\xi_n^S \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_1^2$$

ce qui permet de tester effectivement  $H_0$ .

Remarquons que  $\xi_n^S$  est une fonction de  $(X_i)_{i \in [1, n]}$  uniquement à travers sa variance et sa covariance avec  $(Y_i)_{i \in [1, n]}$ ; en outre elle est croissante avec cette dernière, comme le suggère l'intuition : dire que la loi de  $Y_i$  conditionnellement à  $X_i$  dépend effectivement de  $X_i$  (ce qui revient à dire " $\neg H_0$ "), c'est dire que les observations  $Y_i$  sont significativement corrélées avec celles de  $X_i$ , et inversement.

★  
★ ★

### Énoncé de l'exercice 3

Un industriel reçoit  $K$  lots de  $n$  pièces, avec la garantie que la proportion  $p$  de pièces défectueuses est la même dans chaque lot et inférieure à 5%. Pour vérifier que la garantie est exacte, on tire avec remise des pièces dans chaque lot, jusqu'à obtenir une pièce défectueuse par lot.

Soit  $Y_k$ , la variable aléatoire désignant le nombre de tirages nécessaires dans le lot  $k$ .

☞ Q1 Calculer la loi de  $Y_k$ .

Calculer  $\mathbb{E}(Y_k)$  et  $\mathbb{V}(Y_k)$ .

☞ Q2 Proposer un test de Wald de l'hypothèse :

$$H_0 : p = 5\%$$

☞ Q3 Soit  $A_k = \{\bar{Y} < k_\alpha\}$ , pour  $k_\alpha$  donné; calculer  $\mathbb{P}_p(A_k)$  en fonction de  $p = p_0$ .

Montrer que  $\sup_{p \leq 5\%} (\lim_{K \rightarrow \infty} \mathbb{P}_p(A_k)) = \lim_{K \rightarrow \infty} \mathbb{P}_{p=5\%}(A_k)$ .

En déduire un test asymptotique de l'hypothèse :

$$H_0 : p \leq 5\%$$

### Corrigé de l'exercice 3

☞ Q1 Dans la pratique la variable  $Y_k$  est tronquée, c'est-à-dire l'opérateur n'attend pas plus de  $N \geq 1$  tirages successifs qu'une pièce soit défectueuse. Les calculs pourraient être menés directement dans le cas où  $N = +\infty$ , ce qui revient à supprimer tous les termes en facteur de " $x^N$ " dans les lignes qui suivent.

On a pour  $k \in \llbracket 1, K \rrbracket$  et  $n \in \llbracket 1, N \rrbracket$ , en notant  $M = \sum_{n=N+1}^{+\infty} p(1-p)^{n-1}$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y_k = n) &= \mathbb{P}(\text{"Les } n-1 \text{ premières pièces tirées sont conformes et la } n\text{-ième est défectueuse"}) \\ &= \frac{1}{M}(1-p)^{n-1} \cdot p \quad (\text{le tirage s'effectue avec remise}) \end{aligned}$$

Le tirage s'effectuant avec remise, le nombre de tirages nécessaires  $n$  pour obtenir une pièce défectueuse n'est pas borné (avec toutefois  $\mathbb{P}(n = +\infty) = 0$ ).

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y_k) &= \sum_{n=0}^N n \mathbb{P}(Y_k = n) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{n=0}^N np(1-p)^{n-1} \\ &= \frac{1}{M} p \sum_{n=0}^N \left( \frac{\partial}{\partial x} (x \mapsto x^n) \right)_{(1-p)} \\ &= \frac{1}{M} p \left( \left( \frac{\partial}{\partial x} (x \mapsto \sum_{n=0}^N x^n) \right)_{(1-p)} \right) \\ &= \frac{1}{M} p \left( \left( \frac{\partial}{\partial x} (x \mapsto \frac{1-x^{N+1}}{1-x}) \right)_{(1-p)} \right) \\ &= \frac{1}{M} p \left( x \mapsto \frac{-(N+1)x^N(1-x) + (1-x^{N+1})}{(1-x)^2} \right)_{(1-p)} \\ &= \frac{1}{M} p \left( x \mapsto \frac{1 + Nx^{N+1} - (N+1)x^N}{(1-x)^2} \right)_{(1-p)} \\ &= \frac{1}{M} \frac{1}{p} (1 - (1-p)^N ((N+1)p + 1 - p)) \\ &\xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1}{p} \end{aligned}$$

et d'autre part que

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(Y_k^2) &= \sum_{n=0}^N n^2 \mathbb{P}(Y_k = n) \\
 &= \frac{1}{M} \sum_{n=0}^N n^2 p (1-p)^{n-1} \\
 &= \frac{1}{M} p \left( (1-p) \sum_{n=2}^N n(n-1)(1-p)^{n-2} + \sum_{n=1}^N n(1-p)^{n-1} \right) \\
 &= \frac{1}{M} p \left( (1-p) \left( \sum_{n=2}^N \frac{\partial^2}{\partial x^2} (x \mapsto x^n) \right)_{(1-p)} + \left( \sum_{n=1}^N \frac{\partial}{\partial x} (x \mapsto x^n) \right)_{(1-p)} \right) \\
 &= \frac{1}{M} p \left( (1-p) \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} (x \mapsto \frac{1-x^{N+1}}{1-x}) \right)_{(1-p)} + \left( \frac{\partial}{\partial x} (x \mapsto \frac{1-x^{N+1}}{1-x}) \right)_{(1-p)} \right) \\
 &= \frac{1}{M} \left\{ \begin{aligned} &p(1-p) \left( x \mapsto \frac{(N(N+1)x^N - (N+1)Nx^{N-1})(1-x) + 2(1+Nx^{N+1} - (N+1)x^N)}{(1-x)^3} \right)_{(1-p)} \\ &+ p \left( x \mapsto \frac{1+Nx^{N+1} - (N+1)x^N}{(1-x)^2} \right)_{(1-p)} \end{aligned} \right. \\
 &= \frac{1}{M} \left\{ \begin{aligned} &p(1-p) \left( x \mapsto \frac{2-N(N+1)x^{N-1} + 2N^2x^N - N(N-1)x^{N+1}}{(1-x)^3} \right)_{(1-p)} \\ &+ p \left( x \mapsto \frac{1+Nx^{N+1} - (N+1)x^N}{(1-x)^2} \right)_{(1-p)} \end{aligned} \right. \\
 &= \frac{1}{p^2} \left\{ \begin{aligned} &2(1-p) - N(N+1)(1-p)^N + 2N^2(1-p)^{N+1} - N(N+1)(1-p)^{N+2} \\ &\dots + p - (N+1)p(1-p)^N - (1-p)^{N+1} \end{aligned} \right. \\
 &= \frac{1}{M} \frac{2-p - (1-p)^N (N(N+1) - 2N^2(1-p) + N(N-1)(1-p)^2 + (N+1)p)}{p^2} \\
 &\xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{2-p}{p^2}
 \end{aligned}$$

de sorte que

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(Y_k) &= \mathbb{E}(Y_k^2) - (\mathbb{E}(Y_k))^2 \\
 &= \frac{1}{M} \frac{1}{p^2} \left\{ \begin{aligned} &1-p \\ &-(1-p)^N [N(N+1) - 2N^2(1-p) + N(N-1)(1-p)^2 - ((N+1)p + 2 - 2p)] \\ &-(1-p)^{2N} [N(N+1) - 2N^2(1-p) + N(N-1)(1-p)^2 + (N+1)p]^2 \end{aligned} \right. \\
 &\xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1-p}{p^2}
 \end{aligned}$$

On se placera dans toute la suite dans le cas où  $N = +\infty$

☞ Q2 Le test de Wald se fonde sur la normalité asymptotique de l'estimateur du maximum de vraisemblance, qui vaut ici  $\hat{p} = \frac{1}{y}$ . Ecrire le Théorème Central Limite implique donc de l'écrire en

$\bar{y}$  puis d'appliquer le théorème de Slutsky à  $g : (x \mapsto \frac{1}{x})$ . On en tirerait alors la statistique de Wald habituelle, dont on saurait qu'elle suit asymptotiquement une loi du  $\chi^2$  à un degré de liberté.

Pour autant, comme  $g$  est bijective, nous préférons appliquer le Théorème Central Limite à  $\bar{y}$  (comparé à  $g^{-1}(p_0) = \frac{1}{p_0}$ ), et reconstruire de façon analogue à la construction de la statistique de Wald une statistique qui suit un  $\chi^2$  à un degré de liberté.

On a en effet d'après le Théorème Central Limite

$$\sqrt{K} \left( \bar{y} - \frac{1}{p} \right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( 0, \frac{1-p}{p^2} \right)$$

donc

$$\sqrt{K} \frac{\bar{y} - \frac{1}{p}}{\sqrt{\frac{1-p}{p^2}}} \xrightarrow[K \infty]{\mathcal{N}} (0, 1)$$

et donc

$$K \frac{\left( \bar{y} - \frac{1}{p} \right)^2}{\frac{1-p}{p^2}} \xrightarrow[K \infty]{} \chi_1^2$$

Enfin, en approchant la variance  $\frac{1-p}{p^2}$  par  $\frac{1-\frac{1}{\bar{y}}}{\bar{y}^2} = \frac{\bar{y}-1}{\bar{y}^2}$  il vient

$$\xi_n^W(y_1, \dots, y_n) = K \frac{\left( \bar{y} - \frac{1}{p_0} \right)^2}{\bar{y}(\bar{y}-1)} \xrightarrow[K \infty]{H_0} \chi_1^2$$

☞ Q3 On cherche à tester l'hypothèse  $H_0 : "p \leq p_0 = 5\%"$  au seuil  $\alpha \in [0, 1[$  en comparant  $\hat{p} = \bar{y}$  à un certain fractile  $k_\alpha$ . L'idée est donc d'exploiter la normalité asymptotique de l'estimateur  $\hat{p}$  pour en déduire la forme explicite (et tabulable) de  $k_\alpha$

Considérons donc  $k_\alpha \in \mathbb{R}$ ; on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_p(A_k) &= \mathbb{P}_p(\bar{y} < k_\alpha) \\ &= \mathbb{P}_p \left( \sqrt{K} \frac{\bar{y} - \frac{1}{p}}{\sqrt{\bar{y}(\bar{y}-1)}} < \sqrt{K} \frac{k_\alpha - \frac{1}{p}}{\sqrt{\bar{y}(\bar{y}-1)}} \right) \end{aligned}$$

Remarque : | Même si cela ne change rien à la méthode, rien n'implique que  $k_\alpha$  ne dépende pas de la taille  $K$  de l'échantillon. On est donc amené à exprimer  $k_\alpha$  en tant que fonction de  $K$ , supposée suffisamment régulière.

Ainsi, si  $k_\alpha : (\mathbb{N} \mapsto \mathbb{R})$  est une fonction de  $K$  qui admet une limite finie lorsque  $K \rightarrow +\infty$ , on a

$$\mathbb{P}_p(A_k) \xrightarrow[K \infty]{} \Phi \left( \lim_{K \infty} \sqrt{K} \frac{k_\alpha(K) - \frac{1}{p}}{\sqrt{\bar{y}(\bar{y}-1)}} \right)$$

où  $\Phi$  est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite; il reste déterminer  $\sup_{p \leq p_0} \lim_{K \infty} \mathbb{P}_p(A_k)$ .

Or si  $p_2 \leq p_1 \leq p_0$ , on a

$$\sqrt{K} \frac{k_\alpha(K) - \frac{1}{p_2}}{\sqrt{\bar{y}(\bar{y} - 1)}} \leq \sqrt{K} \frac{k_\alpha(K) - \frac{1}{p_1}}{\sqrt{\bar{y}(\bar{y} - 1)}}$$

et par conséquent

$$\Phi \left( \lim_{K \rightarrow \infty} \sqrt{K} \frac{k_\alpha(K) - \frac{1}{p_2}}{\sqrt{\bar{y}(\bar{y} - 1)}} \right) \leq \Phi \left( \lim_{K \rightarrow \infty} \sqrt{K} \frac{k_\alpha(K) - \frac{1}{p_1}}{\sqrt{\bar{y}(\bar{y} - 1)}} \right)$$

soit encore

$$\mathbb{P}_{p_2}(A_k) \leq \mathbb{P}_{p_1}(A_k)$$

Il s'ensuit que

$$\begin{aligned} \sup_{p \leq p_0} \lim_{K \rightarrow \infty} \mathbb{P}_p(A_k) &= \lim_{K \rightarrow \infty} \sup_{p \leq p_0} \mathbb{P}_p(A_k) \quad \text{par continuité uniforme} \dots \\ &= \lim_{K \rightarrow \infty} \mathbb{P}_{p=p_0}(A_k) \\ &= \Phi \left( \lim_{K \rightarrow \infty} \sqrt{K} \frac{k_\alpha(K) - \frac{1}{p}}{\sqrt{\bar{y}(\bar{y} - 1)}} \right) \end{aligned}$$

Pour  $K$  asymptotiquement grand et  $\alpha \in [0, 1[$  on accepte donc  $H_0$  ssi

$$\sqrt{K} \frac{k_\alpha(K) - \frac{1}{p_0}}{\sqrt{\bar{y}(\bar{y} - 1)}} > q_\alpha^{\mathcal{N}(0,1)}$$

où  $q_\alpha^{\mathcal{N}(0,1)}$  désigne le fractile de niveau  $\alpha$  de la loi normale centrée réduite.

L'idée est alors de définir  $k_\alpha$  de façon à ce que  $\Phi(T(k_\alpha)) = q_\alpha^{\mathcal{N}(0,1)}$ , où  $T(x) = \sqrt{K} \frac{x - \frac{1}{p}}{\sqrt{\bar{y}(\bar{y} - 1)}}$ ; de cette façon, tester si  $p \leq p_0$  au seuil  $\alpha$ , c'est-à-dire comparer  $\sup_{p \leq p_0} \mathbb{P}_{p, k_\alpha}(A_k)$  à  $\alpha$ , revient juste à comparer  $\bar{y}$  à  $k_\alpha$ .

Plus précisément,  $H_0$  est acceptée ssi  $\bar{y} > k_\alpha(K)$  avec

$$k_\alpha(K) = \frac{1}{p_0} + q_\alpha^{\mathcal{N}(0,1)} \sqrt{\frac{\bar{y}(\bar{y} - 1)}{K}}$$

(et on vérifie a posteriori que  $\lim_{K \rightarrow \infty} k_\alpha(K) = \frac{1}{p_0}$  existe).

★  
★ ★



## Énoncé de l'exercice 4

On dispose de  $n$  observations i.i.d. d'un couple de variables aléatoires positives scalaires  $(W_i, X_i)$ .

Le but de l'exercice est de suggérer une procédure pour tester l'hypothèse  $H_0$  selon laquelle la loi conditionnelle de  $W_i$  sachant  $X_i$  est une loi de Pareto, de densité :

$$f(W|X, b) = \frac{bX}{W_0} \left(\frac{W_0}{W}\right)^{bX+1} \mathbb{1}_{W \geq W_0}$$

pour  $b > 0$  et  $W_0 > 0$

☞ Q1 On suppose dans un premier temps que les  $X_i$  sont tous égaux à  $X \in \mathbb{R}$  connu, et que  $W_0$  est connu, de sorte que le seul paramètre inconnu du modèle est  $\alpha = bX + 1$ .

- Calculer l'espérance et la variance de  $W$ , notées  $m$  et  $v$ .  
A quelle condition sur  $\alpha$ , supposée vérifiée par la suite, les moments  $m$  et  $v$  existent-ils ?
- Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance  $\hat{\alpha}$  de  $\alpha$ .
- Déterminer le score et l'information de Fisher du modèle.  
En déduire  $\mathbb{E}(\ln W)$  et  $\mathbb{E}((\ln W)^2)$ .
- Soit  $s = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\ln(W_i) - \overline{\ln W})^2$ , où  $\overline{\ln W}$  est la moyenne empirique des logarithmes de  $W_i$ .

On se propose de fonder un test de  $H_0$  sur la différence :

$$s - \frac{1}{(\hat{\alpha} - 1)^2}$$

Justifier un tel test.

- Ecrire le Théorème Central Limite pour  $(\ln W_i, (\ln W_i)^2)_{i \in \llbracket 1, N \rrbracket}$ , et tester l'hypothèse  $H_0$  (On donnera la forme de la matrice de variance-covariance sans pour autant la calculer explicitement).

☞ Q2 On suppose toujours  $W_0$  connu, mais les  $X_i$  prennent désormais des valeurs a priori distinctes.

- Calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance de  $b$ .
- Montrer que :  $\mathbb{E} \left( X^2 \left( \ln \frac{W_0}{W} \right)^2 - \frac{2X}{b} \ln \frac{W_0}{W} \right) = 0$ .  
Comment testeriez-vous alors l'hypothèse  $H_0$  ?

☞ Q3 On suppose enfin que  $W_0$  est inconnu.

- Calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance de  $W_0$ .
- Peut-on adapter la procédure de test précédemment mise-en-œuvre ?

## Corrigé de l'exercice 4

☞ Q1 (a) On a

$$\begin{aligned}
 m &= \mathbb{E}(W) \\
 &= \int_{\mathbb{R}} \frac{bx}{W_0} \left(\frac{W_0}{W}\right)^\alpha \mathbf{1}_{W \geq W_0} W dW \\
 &= (\alpha - 1)(\alpha - 1)W_0^{\alpha-1} \int_{W_0}^{+\infty} W^{1-\alpha} dW \\
 &= (\alpha - 1)W_0^{\alpha-1} \left[ \frac{W^{2-\alpha}}{2-\alpha} \right]_{W_0}^{+\infty} \\
 &= \boxed{\frac{\alpha-1}{\alpha-2} W_0}
 \end{aligned}$$

aussitôt que  $\alpha > 2$ , et par ailleurs

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(W^2) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{bx}{W_0} \left(\frac{W_0}{W}\right)^\alpha \mathbf{1}_{W \geq W_0} W^2 dW \\
 &= (\alpha - 1)W_0^{\alpha-1} \int_{W_0}^{+\infty} W^{2-\alpha} dW \\
 &= (\alpha - 1)W_0^{\alpha-1} \left[ \frac{W^{3-\alpha}}{3-\alpha} \right]_{W_0}^{+\infty} \\
 &= \frac{\alpha - 1}{\alpha - 3} W_0^2
 \end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned}
 v &= \mathbb{E}(W^2) - (\mathbb{E}(W))^2 \\
 &= \left( \frac{\alpha - 1}{\alpha - 3} - \left( \frac{\alpha - 1}{\alpha - 2} \right)^2 \right) W_0^2 \\
 &= \boxed{\frac{\alpha-1}{(\alpha-2)^2(\alpha-3)} W_0^2}
 \end{aligned}$$

aussitôt que  $\alpha > 3$ .

En toute rigueur, il faudrait encore prouver que lorsque  $\alpha < 2$ ,

$\mathbb{E}(W^2) - (\mathbb{E}(W))^2 = (+\infty) - (+\infty)$  diverge effectivement, en écrivant

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(W^2) - (\mathbb{E}(W))^2 &= \int_{\mathbb{R}} W^2 f(W|\alpha) dW - \left( \int_{\mathbb{R}} W f(W|\alpha) dW \right)^2 \\
 &= \lim_{M \rightarrow \infty} \left( \left( \int_{W_0}^M W^2 f(W|\alpha) dW \right) - \left( \int_{W_0}^M W f(W|\alpha) dW \right)^2 \right) \\
 &= \lim_{M \rightarrow \infty} \left( \left( \int_{W_0}^M W^2 f(W|\alpha) dW \right) - \left( \int_{W_0}^M W f(W|\alpha) dW \right) \left( \int_{W_0}^M \omega f(\omega|\alpha) d\omega \right) \right) \\
 &= \lim_{M \rightarrow \infty} \left( \int_{W_0}^M \left( W^2 - W \left( \int_{W_0}^M \omega f(\omega|\alpha) d\omega \right) \right) f(W|\alpha) dW \right) \\
 &= \lim_{M \rightarrow \infty} \left( \int_{W_0}^M \left( W^2 - W \left[ \frac{W^{2-\alpha}}{2-\alpha} \right]_{W_0}^M \right) f(W|\alpha) dW \right) \\
 &= \lim_{M \rightarrow \infty} \left( \int_{W_0}^M W \left( W - \frac{M^{2-\alpha}}{2-\alpha} + \frac{W_0^{2-\alpha}}{2-\alpha} \right) (\alpha-1) W_0^{\alpha-1} W^{-\alpha} dW \right) \\
 &= (\alpha-1) W_0^{\alpha-1} \lim_{M \rightarrow \infty} \left( \int_{W_0}^M W^{2-\alpha} - \left( \frac{M^{2-\alpha}}{2-\alpha} + \frac{W_0^{2-\alpha}}{2-\alpha} \right) W^{1-\alpha} dW \right) \\
 &\underset{M \rightarrow \infty}{\approx} (\alpha-1) W_0^{\alpha-1} \left( \frac{M^{3-\alpha}}{3-\alpha} - \frac{M^{4-2\alpha}}{(2-\alpha)^2} \right) \\
 &\xrightarrow{M \rightarrow \infty} \pm \infty \quad \text{selon le signe de } \alpha - 1
 \end{aligned}$$

Ainsi les deux premiers moments existent ssi  $\alpha = Xb + 1 > 3$ , condition supposée vérifiée par la suite.

(b) On a pour  $(w_1, \dots, w_n) \in [W_0, +\infty[^n$

$$\begin{aligned}
 L_{W_1, \dots, W_n}(w_1, \dots, w_n; \alpha) &= \prod_{i=1}^n \frac{\alpha-1}{W_0} \left( \frac{W_0}{w_i} \right)^\alpha \\
 &= (\alpha-1)^n W_0^{n(\alpha-1)} \frac{1}{\prod_{i=1}^n w_i^\alpha}
 \end{aligned}$$

Par suite l'estimateur du maximisation de vraisemblance  $\hat{\alpha}$  de  $\alpha$  vérifie

$$\frac{n}{\hat{\alpha} - 1} - \sum_{i=1}^n \ln \frac{w_i}{W_0} = 0$$

de sorte que

$$\hat{\alpha} = 1 + \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln \frac{w_i}{W_0}}$$

(et on vérifie que cette condition est bien suffisante)

(c) On a pour une observation  $w \in [W_0, +\infty[$

$$\begin{aligned} S_1(w; \alpha) &= \frac{\partial \ln L_{W_1}(w; \alpha)}{\partial \alpha} \\ &= \frac{1}{\alpha - 1} - \ln \frac{w}{W_0} \end{aligned}$$

Or le score est centré, ce qui s'écrit  $\mathbb{E} \left( \frac{1}{\alpha - 1} - \ln \frac{W}{W_0} \right) = 0$ , soit

$$\mathbb{E}(\ln W) = \frac{1}{\alpha - 1} + \ln W_0$$

De façon similaire on a

$$\begin{aligned} I_1(\alpha) &= -E \frac{\partial^2 \ln L_{W_1}(w; \alpha)}{\partial \alpha^2} \\ &= \frac{1}{(\alpha - 1)^2} \end{aligned}$$

Or  $I_1(\alpha) = \mathbb{V}(S_1(W; \alpha)) = \mathbb{E}(S_1(W; \alpha)^2)$ , donc finalement

$$\mathbb{V}(\ln W) = \frac{1}{(\alpha - 1)^2}$$

et

$$\mathbb{E}((\ln W)^2) = \frac{1}{(\alpha - 1)^2} + \left( \frac{1}{\alpha - 1} + \ln W_0 \right)^2$$

(d) Notons  $Y_i = \ln W_i$  pour  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ; alors

$$s = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$

est la variance empirique de  $(\ln W_1, \dots, \ln W_n)$ .

Or si  $H_0$  est vraie, alors  $\mathbb{V}(\ln W_i) = \frac{1}{(\alpha - 1)^2}$  dont un estimateur convergent est  $\frac{1}{(\hat{\alpha} - 1)^2}$ , d'où l'idée de construire une statistique de test fondée sur  $s - \frac{1}{(\hat{\alpha} - 1)^2}$ .

Un tel test est habituellement appelé *test d'indépendance de Fisher*.

(e) On a

$$\sqrt{n} \left( \begin{pmatrix} \frac{\overline{\ln W}}{(\overline{\ln W})^2} \\ \overline{(\ln W)^2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \mathbb{E}(\ln W) \\ \mathbb{E}((\ln W)^2) \end{pmatrix} \right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \Omega \right)$$

avec  $\Omega = \begin{pmatrix} \mathbb{V}(\ln W) & \text{Cov}(\ln W, (\ln W)^2) \\ \text{Cov}(\ln W, (\ln W)^2) & \mathbb{V}((\ln W)^2) \end{pmatrix}$  que l'on n'explicitera pas davantage.

Soit alors  $g : \left( \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (m, v) & \mapsto & v - m^2 \end{array} \right)$ ; alors d'après le théorème de Slutsky

$$\sqrt{n} \left( s - \frac{1}{(\alpha - 1)^2} \right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, M(\alpha))$$

avec  $M(\alpha) = \frac{\partial g}{\partial \alpha}(\alpha)' \times \Omega \times \frac{\partial g}{\partial \alpha}(\alpha) \in \mathbb{R}^+$ .

Enfin, en considérant l'estimateur convergent  $\widehat{M}(\hat{\alpha}) = M(\hat{\alpha})$  de  $M(\alpha)$  on en tire que

$$\sqrt{n} \left( \frac{s - \frac{1}{(\alpha-1)^2}}{\sqrt{M(\hat{\alpha})}} \right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$$

de sorte que finalement si  $H_0$  est vraie

$$\xi_n^F = n \frac{\left( s - \frac{1}{(\alpha-1)^2} \right)^2}{M(\hat{\alpha})} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_1^2$$

⇒ Q2 (a) On a pour  $(w_1, \dots, w_n, x_1, \dots, x_n) \in [W_0, +\infty[^{2n}$

$$\begin{aligned} L_{W_1, \dots, W_n | X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n}(w_1, \dots, w_n, x_1, \dots, x_n; b) &= \prod_{i=1}^n \frac{bx_i}{W_0} \left( \frac{W_0}{w_i} \right)^{bx_i+1} \\ &= b^n \left( \prod_{i=1}^n x_i \right) W_0^{b \sum_{i=1}^n x_i} \frac{1}{\prod_{i=1}^n w_i^{bx_i+1}} \end{aligned}$$

Par suite l'estimateur du maximum de vraisemblance  $\hat{b}$  de  $b$  vérifie

$$\frac{n}{\hat{b}} + \sum_{i=1}^n x_i \ln W_0 - \sum_{i=1}^n x_i \ln w_i = 0$$

ce dont on tire

$$\hat{b} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i \ln \frac{w_i}{W_0}}$$

(et on vérifie que cette condition est bien suffisante)

(b) Le score s'écrit cette fois pour une observation

$$\begin{aligned} S_1(w | X = x; b) &= \frac{\partial \ln L_{W_1 | X=x}(w; b)}{\partial b}(w; b) \\ &= \frac{1}{b} - x \ln \frac{w}{W_0} \end{aligned}$$

Il est centré, et donc

$$\mathbb{E} \left( X \ln \frac{W}{W_0} \right) = \frac{1}{b}$$

Par ailleurs l'information de Fisher s'écrit

$$\begin{aligned} I_1(b) &= -E \frac{\partial^2 \ln L_{W_1|X_1}(w; b)}{\partial b^2} \\ &= \frac{1}{b^2} \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} I_1(b) &= \mathbb{V}(S_1(W|X; b)) \\ &= \mathbb{E}(S_1(W|X; b)^2) \\ &= \mathbb{E} \left( \left( \frac{1}{b} - X \ln \frac{W}{W_0} \right)^2 \right) \\ &= \mathbb{E} \left( \frac{1}{b^2} - 2 \frac{X}{b} \ln \frac{W}{W_0} + X^2 \left( \ln \frac{W}{W_0} \right)^2 \right) \\ &= \frac{1}{b^2} + \mathbb{E} \left( X^2 \left( \ln \frac{W}{W_0} \right)^2 - 2 \frac{X}{b} \ln \frac{W}{W_0} \right) \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\mathbb{E} \left( X^2 \left( \ln \frac{W}{W_0} \right)^2 - 2 \frac{X}{b} \ln \frac{W}{W_0} \right) = 0$$

De façon similaire au cas où les  $X_i$  étaient constants, on cherche alors à tester  $H_0$  en considérant l'estimateur empirique de cette expression, à savoir

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \left( \ln \frac{w_i}{W_0} \right)^2 - \frac{1}{b} \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n x_i \ln \frac{w_i}{W_0}$$

Il suffit alors, en s'appuyant sur la loi asymptotique de  $\begin{pmatrix} X \ln \frac{W}{W_0} \\ X^2 \left( \ln \frac{W}{W_0} \right)^2 \end{pmatrix}$  obtenue par le Théorème Central Limite, d'appliquer le théorème de Slutsky en considérant  $g : \begin{pmatrix} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (m, v) & \mapsto & v - \frac{2}{b}m \end{pmatrix}$ , ce qui conduit à

$$\sqrt{n}(t - 0) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, N(b))$$

où  $t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \left( \ln \frac{w_i}{W_0} \right)^2 - \frac{2}{n^2} \left( \sum_{i=1}^n x_i \ln \frac{w_i}{W_0} \right)^2$  (en substituant  $\hat{b}$  à  $b$ )

et  $N(b) = \frac{\partial g}{\partial b}(b)' \times \mathbb{V} \left( \begin{pmatrix} X \ln \frac{W}{W_0} \\ X^2 \left( \ln \frac{W}{W_0} \right)^2 \end{pmatrix} \right) \times \frac{\partial g}{\partial b}(b)$ .

On en tire en définitive la statistique de test

$$\xi_n^F = n \frac{\left(t - \frac{1}{b^2}\right)^2}{N(\hat{b})} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_1^2$$

si  $H_0$  est vraie.

☞ Q3 (a) On a pour  $(w_1, \dots, w_n, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{2n}$

$$L_{W_1, \dots, W_n | X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n}(w_1, \dots, w_n; W_0, b) = b^n \left( \prod_{i=1}^n \frac{x_i}{(w_i)^{bx_i+1}} \right) W_0^{b \sum_{i=1}^n x_i} \mathbb{1}_{\min_i w_i \geq W_0}$$

En particulier l'estimateur du maximum de vraisemblance  $\widehat{W}_0$  de  $W_0$  est

$$\widehat{W}_0 = \min_i w_i$$

(b) La difficulté est que le modèle statistique n'est plus régulier; en particulier, la log-vraisemblance n'est plus dérivable, donc ni le score ni la matrice d'information de Fisher ne sont définis. La procédure de test utilisée précédemment, fondées sur leurs propriétés statistiques, n'est donc plus applicable.

\*  
\* \*

## 8 Travaux Dirigés n°8

### Énoncé de l'exercice 1

Soit un échantillon  $X_1, \dots, X_n$  de variables aléatoires i.i.d telles que :

- $X_i$  a une probabilité  $\alpha$  de valoir  $a$ , et
  - une probabilité  $(1 - \alpha)$  de suivre une loi normale  $\mathcal{N}(0, 1)$ ,
- ce qui s'écrit encore :

$$X_1 = a \cdot \mathbb{1}_{Z_1=1} + Y_1 \cdot \mathbb{1}_{Z_1=0}$$

où  $Z_1 \rightsquigarrow \mathcal{B}(1, \alpha)$  est indépendante de  $Y_1 \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$ .

☞ Q1 Montrer que  $(\delta_a + \lambda)^{\otimes n}$  est une mesure dominante pour le modèle considéré.

☞ Q2 Montrer que :

$$\frac{dP_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n)}{d(\delta_a + \lambda)^{\otimes n}} = \prod_{i=1}^n (\alpha \mathbb{1}_a(x_i) + (1 - \alpha)(1 - \mathbb{1}_a(x_i))\phi(x_i))$$

où  $\phi$  est la densité d'une loi normale  $\mathcal{N}(0, 1)$ .

### Corrigé de l'exercice 1

☞ Q1 Posons  $\mu = \delta_a + \lambda$  et  $\mu_n = \mu^{\otimes n}$ .

*Remarque :* nous restreindrons les démonstrations au cas où une seule observation  $X_1$  est disponible, dans la mesure où car la généralisation à  $n$  observations i.i.d. se réduit à un passage au produit immédiat :

$$\begin{aligned} dP_{X_1, \dots, X_n} &= \prod_{i=1}^n dP_{X_i} \\ \frac{dP_{X_1, \dots, X_n}}{d\mu_n} &= \prod_{i=1}^n \frac{dP_{X_i}}{d\mu} \end{aligned}$$

*Remarque préliminaire*

Pour  $\mathcal{A}$  ensemble mesurable, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 \in \mathcal{A}) &= \mathbb{P}(X_1 \in \mathcal{A} | X_1 = a)\mathbb{P}(X_1 = a) + \mathbb{P}(X_1 \in \mathcal{A} | X_1 \neq a)\mathbb{P}(X_1 \neq a) \\ &= \alpha \mathbb{P}(X_1 \in \mathcal{A} | X_1 = a) + (1 - \alpha) \int_{\mathcal{A}} \varphi(x) d\lambda(x) \end{aligned}$$

où  $\varphi$  désigne la densité de la loi normale centrée réduite.



Or  $\mathbb{P}(X_1 \in \mathcal{A} | X_1 = a)$  vaut 1 si  $a \in \mathcal{A}$  et 0 sinon, de sorte que

$$\mathbb{P}(X_1 \in \mathcal{A}) = \alpha \mathbb{1}_{a \in \mathcal{A}} + (1 - \alpha) \int_{\mathcal{A}} \varphi(x) d\lambda(x) \tag{2}$$

Or  $\mu$  est une mesure dominante d'une variable  $X_1$  ssi :

$$\forall \mathcal{A} \text{ mesurable, } \mu(\mathcal{A}) = 0 : P_{X_1}(\mathcal{A}) = 0$$

En l'occurrence pour tout  $\mathcal{A}$  mesurable :

-  $\mu(\mathcal{A}) = 0 : \delta_a(\mathcal{A}) = 0$

-  $\delta_a(\mathcal{A}) = 0 : a \notin \mathcal{A}$ , donc d'après 2  $\lambda(\mathcal{A}) = 0 : P_{X_1}(\mathcal{A}) = 0$

Donc  $(\delta_a + \lambda)^{\otimes n}$  est une mesure dominante.

⇒ Q2 On a  $\mathbb{1}_{a \in \mathcal{A}} = \int_{\mathcal{A}} \delta_a(x)$ ,

donc en reportant dans l'équation 2 il vient

$$P(X_1 \in \mathcal{A}) = \int_{\mathcal{A}} (\alpha \delta_a(x) + (1 - \alpha) \varphi(x)) d\lambda(x)$$

d'où on tire facilement

$$P(X_1 \in \mathcal{A}) = \int_{\mathcal{A}} (\alpha \mathbb{1}_a(x) + (1 - \alpha) \varphi(x) (1 - \mathbb{1}_a(x))) d\mu(x)$$

de sorte qu'en définitive

$$\frac{dP_{X_1}(x_1)}{d(\delta_a + \lambda)} = \alpha \mathbb{1}_a(x_1) + (1 - \alpha) (1 - \mathbb{1}_a(x_1)) \varphi(x_1)$$

d'où le résultat par indépendance de  $(X_1, \dots, X_n)$ .

★  
★ ★

## Enoncé de l'exercice 2

*Cet exercice s'inspire librement des travaux de Dov Samet, 2003.<sup>11</sup>*

On s'intéresse pour tout couple  $(X, Y)$  de variables aléatoires réelles à la propriété  $\mathcal{P}$  suivante :

$$(\mathcal{P}) \quad \forall \mathcal{A} \text{ mesurable, } \begin{cases} \mathbb{P}(X < Y \text{ et } X \in \mathcal{A}) = \mathbb{P}(X > Y \text{ et } X \in \mathcal{A}) = \frac{1}{2} \mathbb{P}(X \in \mathcal{A}) \\ \mathbb{P}(Y < X \text{ et } Y \in \mathcal{A}) = \mathbb{P}(Y > X \text{ et } Y \in \mathcal{A}) = \frac{1}{2} \mathbb{P}(Y \in \mathcal{A}) \end{cases}$$

⇒ Q1 Comment s'interprète la propriété  $\mathcal{P}$  ?

<sup>11</sup>Résultats présentés à la 14<sup>ième</sup> conférence internationale de Théorie des jeux, Stony Brook 2003. Voir [Http ://www.sunysb.edu/gametheory/Conf03/twopuzzles.pdf](http://www.sunysb.edu/gametheory/Conf03/twopuzzles.pdf) pour un exposé plus complet.

## ■ Partie 1 “Devinez quel est le plus grand !”

On s'intéresse au problème suivant, présenté originellement par Blackwell (1951) :

Deux nombres réels sont tirés aléatoirement, et chacun est placé dans une enveloppe. L'une d'elle est (indépendamment) tirée au hasard et vous est présentée. Vous devez deviner, au vu du nombre qu'elle contient, s'il s'agit du plus grand ou le plus petit des deux. Sauriez-vous deviner juste plus d'une fois sur deux en moyenne ?

Pour simplifier la présentation, supposons que vous gagnez +1 si vous avez deviné juste et -1 sinon ; ce problème revient à savoir si vous pouvez vous garantir un gain espéré strictement positif.

☞ Q1 Soient  $X$  et  $Y$  les deux nombres tirés aléatoirement, et supposons que  $(X, Y)$  vérifie  $\mathcal{P}$ . Quel est votre meilleur gain espéré ? Interpréter.

☞ Q2 Cherchons néanmoins à construire une stratégie gagnante.

Pour ce faire, donnons-nous  $s \in \mathbb{R}$  et soit  $\sigma_s : \begin{pmatrix} \mathbb{R} & \rightarrow & \{-1, 1\} \\ x & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x > s \\ -1 & \text{sinon} \end{cases} \end{pmatrix}$  la *stratégie de seuil* associée à  $s$ .

- Soit  $(x \neq y)$  une réalisation du tirage ; le nombre qui vous est présenté est soit  $x$ , soit  $y$ . Quel est votre gain espéré en jouant selon  $\sigma_s$  sachant que  $x < s$  et  $y < s$  ?
- Quel est votre gain espéré sachant que  $x < s < y$  ?
- En déduire que si votre gain espéré (sur tous les tirages possibles) est strictement positif.

☞ Q3 En déduire qu'aucune paire de variables aléatoires réelles  $(X, Y)$  ne peut vérifier  $\mathcal{P}$ .

## ■ Partie 2 Le jeu des enveloppes

On s'intéresse désormais au célèbre jeu dit *des enveloppes*, introduit par Kraitchik (1953) sous la forme suivante :

On considère deux enveloppes contenant une certaine somme d'argent, mais l'une contenant le double de l'autre ; chacune a autant de chances que l'autre de contenir la plus grosse somme. L'une d'elles vous est donnée au hasard, et vous devez choisir entre la prendre, ou prendre l'autre.

A supposer qu'elle contienne  $x$ , l'autre a une chance sur deux de contenir  $2x$  et une chance sur deux de contenir  $\frac{x}{2}$  ; donc le contenu espéré de l'autre enveloppe est  $\frac{5}{4}x > x$ , de sorte que vous avez intérêt à changer d'enveloppe. Mais le même raisonnement s'applique aussi à la nouvelle enveloppe, de sorte que vous avez à nouveau intérêt à changer d'enveloppe, et ainsi de suite ...

Que faire dans cette situation ?


Résoudre ce paradoxe a été le prétexte à une littérature foisonnante ; voici une solution.

Notons  $X$  la somme (variable aléatoire réelle) contenue dans l'enveloppe qui vous est présentée, et  $Y$  celle contenue dans l'autre.

- ☞ Q1 Quel sens donner à l'expression  $\mathcal{H}_x$  : "l'autre a une chance sur deux de contenir  $2x$  et une chance sur deux de contenir  $\frac{x}{2}$ " ?
- ☞ Q2 En déduire que si cette hypothèse est vraie, alors la distribution de  $(X, Y)$  vérifie  $\mathcal{P}$ .
- ☞ Q3 Conclure.

## Corrigé de l'exercice 2

- ☞ Q1 Si un couple de variables aléatoires réelles  $(X, Y)$  vérifie  $\mathcal{P}$ , alors au voisinage de tout  $X$ , la probabilité est la même pour  $Y$  d'être au-dessus ou au-dessous de  $X$ , comme illustré sur la figure suivante :



Pour simplifier la présentation, supposons que vous gagnez  $+1$  si vous avez deviné juste et  $-1$  sinon ; ce problème revient à savoir si vous pouvez vous garantir un gain espéré strictement positif.

- ☞ Q1 Soit  $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \{-1, +1\}$  votre stratégie, et soient  $(x, y)$  une réalisation du tirage.
  - Si  $x$  vous est présenté :
    - Si  $x > y$ , votre gain est  $\sigma(x)$  ; si  $x < y$ , votre gain est  $-\sigma(x)$ . Votre gain espéré, sachant que  $x$  vous est présenté, est donc nul.
  - Si  $y$  vous est présenté, il en va de même.

Le choix de l'enveloppe étant indépendant du tirage de  $X$  et de  $Y$ , votre gain espéré est toujours nul, quelle que soit votre stratégie.

Comme l'hypothèse  $\mathcal{P}$  semble "raisonnable", l'intuition suggère qu'à ce jeu vous ne pourrez jamais obtenir un gain espéré strictement positif. Cette intuition est cependant erronée.

☞ Q2 (a) On a dans tous les cas  $\sigma(x) = \sigma(y) = -1$  car  $x < s$  et  $y < s$ .

Or si  $x < y$ , le gain espéré est

$$\mathbb{P}(\text{le nombre présenté est } x) \cdot 1 + \mathbb{P}(\text{le nombre présenté est } y) \cdot (-1) = 0$$

puisque ces deux alternatives sont équiprobables et que le choix de l'enveloppe est indépendant du tirage de  $X$  et de  $Y$ .

Il en va de même lorsque  $x > y$ , de sorte que le gain espéré, sachant que  $x < s$  et  $y < s$ , est nul.

(b) Si le nombre présenté est  $x$ , on a  $\sigma(x) = -1$  car  $x < s$ ; or  $x < y$ , donc la réponse est juste et le gain est  $+1$ .

Si le nombre présenté est  $y$ , on a  $\sigma(y) = +1$  car  $y > s$ ; or  $y > x$ , donc la réponse est encore juste et le gain est toujours  $+1$ .

Ainsi dans tous les cas le gain espéré, sachant que  $x < s < y$ , est  $+1$ . Il en va de même bien-sûr sachant que  $y < s < x$ .

(c) D'après les résultats précédents le gain espéré en jouant  $\sigma_s$  est donc

$$g(s) = \mathbb{P}(X < s < Y) + \mathbb{P}(Y < s < X)$$

Or ces deux probabilités ne peuvent être simultanément nulles pour tout  $s$  : en effet

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}(X < s < Y) + \mathbb{P}(Y < s < X) ds &= \int_{\mathbb{R}} \left( \int_{\mathbb{R}^2} (\mathbf{1}_{x < s < y} + \mathbf{1}_{y < s < x}) f_{X,Y}(x, y) dx dy \right) ds \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \left( \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{x < s < y} ds + \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{y < s < x} ds \right) f_{X,Y}(x, y) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} (\mathbf{1}_{x < y} (y - x) + \mathbf{1}_{y < x} (y - x)) f_{X,Y}(x, y) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} |x - y| \mathbf{1}_{x \neq y} f_{X,Y}(x, y) dx dy \\ &= \mathbb{E}(|X - Y|) \end{aligned}$$

Si  $\mathbb{P}(X \neq Y) = 0$  alors  $\mathbb{P}(X = Y) = 1$  et le jeu devient trivial : la stratégie qui prétend que le nombre tiré est le plus grand est presque sûrement toujours gagnante ; en particulier lorsque  $s = 0$   $g(0) > 0$ .

Et si  $\mathbb{P}(X \neq Y) \neq 0$  alors  $\mathbb{E}(|X - Y|) > 0$ , et donc  $\int_{\mathbb{R}} g(s) ds > 0$ .

Donc dans tous les cas

$$\exists s \in \mathbb{R} / g(s) > 0$$

En fait, si  $(X, Y)$  est distribué de telle sorte que toute partie de mesure non-nulle a une probabilité non-nulle, alors *n'importe quel* seuil  $s$  assure un gain espéré strictement positif.

☞ Q3 Si une telle distribution sur  $\mathbb{R}^2$  existait, alors d'après la question (1) dans le jeu de Blackwell associé nul ne saurait gagner plus que zéro en moyenne, ce qui est pourtant possible d'après la question (2).

☞ Q1 La formulation du paradoxe suggère que l'on se donne une distribution de probabilité a priori sur les deux sommes  $X$  et  $Y$ ; cette distribution est nécessairement telle que  $\mathbb{P}(X = 2Y \text{ ou } Y = 2X) = 1$ .

Étant donné  $x \in \mathbb{R}$  et à supposer que  $X = x$ , l'hypothèse  $\mathcal{H}_x$  s'exprime en termes mathématiques sous la forme

$$\mathbb{P}(Y = 2x | X = x) = \mathbb{P}\left(Y = \frac{x}{2} | X = x\right) = \frac{1}{2}$$

☞ Q2 L'hypothèse  $\mathcal{H}_y$  analogue à la précédente en  $Y = y \in \mathbb{R}$  s'écrit

$$\mathbb{P}(X = 2y | Y = y) = \mathbb{P}\left(X = \frac{y}{2} | Y = y\right) = \frac{1}{2}$$

Dans l'énoncé du paradoxe, l'hypothèse selon laquelle "chacune a autant de chances que l'autre de contenir la plus grosse somme" se traduit alors en  $\mathcal{H}_x$  quelle que soit la somme  $x$  de la première enveloppe, et  $\mathcal{H}_y$  quelle que soit la somme  $y$  de la deuxième enveloppe.

En d'autres termes

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(Y = 2x | X = x) &= \mathbb{P}\left(Y = \frac{x}{2} | X = x\right) = \frac{1}{2} \\ \forall y \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(X = 2y | Y = y) &= \mathbb{P}\left(X = \frac{y}{2} | Y = y\right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Or pour tout  $x \in \mathbb{R}$  l'événement  $Y = 2x$  est égal à l'événement  $Y > x$ , et l'événement  $Y = \frac{x}{2}$  à  $Y < x$ . Par suite

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(Y > x | X = x) &= \mathbb{P}(Y < x | X = x) = \frac{1}{2} \\ \forall y \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(X > y | Y = y) &= \mathbb{P}(X < y | Y = y) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Par conséquent pour toute partie mesurable  $\mathcal{A}$  de  $\mathbb{R}$  telle que  $\mathbb{P}(X \in \mathcal{A}) \neq 0$  et  $\mathbb{P}(Y \in \mathcal{A}) \neq 0$  il vient

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y > X | X \in \mathcal{A}) &= \mathbb{P}(Y < X | X \in \mathcal{A}) = \frac{1}{2} \\ \mathbb{P}(X > Y | Y \in \mathcal{A}) &= \mathbb{P}(X < Y | Y \in \mathcal{A}) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

de sorte que  $(X, Y)$  vérifie la propriété  $\mathcal{P}$ .

☞ Q3 Ainsi, à supposer que l'on se donne une distribution a priori sur les sommes d'argent de chacune des deux enveloppes, il n'est pas possible de traduire l'hypothèse "chacune a autant de chances que l'autre de contenir la plus grosse somme" comme il est suggéré, car la distribution vérifierait alors la propriété  $\mathcal{P}$  ce qui n'est pas possible.

La démarche proposée, bien qu'intuitive, n'est donc pas raisonnable : en particulier il est faux qu'après un nombre quelconque de changements d'enveloppe on ait "à nouveau intérêt à changer d'enveloppe".

★  
★ ★

### Enoncé de l'exercice 3

Soient  $X_1, \dots, X_n$   $n$  variables aléatoires i.i.d dans  $\mathbb{R}^k$ , de loi paramétrique  $\mathcal{P}_\theta$  de densité

$$\frac{d\mathcal{P}_\theta(x)}{d\lambda} = f(x - \theta)$$

$\theta \in \mathbb{R}^k$  est appelé *paramètre de position*.

On cherche à étudier les estimateurs  $T$  du paramètre  $\theta$ . On se restreint pour cela à la classe des estimateurs *équivariants*, c'est-à-dire des estimateurs  $T$  vérifiant :

$$\forall c \in \mathbb{R}^k, T(X_1 + c, \dots, X_n + c) = T(X_1, \dots, X_n) + c$$

Cette restriction est naturelle : en effet, pour tout  $c \in \mathbb{R}^k$ ,  $X_i + c \sim \mathcal{P}_{\theta+c}$ , et on ne peut admettre qu'un simple changement d'échelle puisse mener à une estimation différente.

☞ Q1 Montrer que :

$$T \text{ équivariant} \Leftrightarrow \begin{cases} \exists T_1 : (\mathbb{R}^{k-1} \rightarrow \mathbb{R}^k) / \forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^k \\ T(x_1, \dots, x_n) = T_1(x_2 - x_1, \dots, x_n - x_1) + x_1 \end{cases}$$

☞ Q2 Soit  $W(x, y) = w(x - y)$  une fonction de perte. Montrer que, si un estimateur  $T$  est équivariant, le risque associé, pour la perte  $W$ , ne dépend pas de  $\theta$ .

Un estimateur équivariant  $T$  qui minimise le risque  $R_w(T, \theta)$  (c'est-à-dire au point  $\theta = 0$ ) est alors un estimateur optimal (parmi les équivariants) pour la fonction de perte  $W$ .

☞ Q3 Soit la fonction

$$\psi(x) = \int_{\mathbb{R}^k} w(x - u) \prod_{i=1}^n f(X_i - u) du$$

et l'estimateur  $T^*$  défini par

$$\psi(T^*) = \inf_{x \in \mathbb{R}^k} \psi(x)$$

$T^*$  est appelé *l'estimateur de Pitman* (on suppose ici que  $w$  est telle que l'équation  $\psi(x^*) = \inf_{x \in \mathbb{R}^k} \psi(x)$  admette une solution et une seule).

(a) Montrer que  $T^*$  est équivariant.

(b) Montrer que, pour toute fonction  $\varphi$  telle que  $\mathbb{E}(\|\varphi(X_1, \dots, X_n)\|) < +\infty$ , on a :

$$E_\theta[\varphi(X_1, \dots, X_n) | X_2 - X_1, \dots, X_n - X_1] = \int_{\mathbb{R}^k} \varphi(X_1 + \theta - u, \dots, X_n + \theta - u) \frac{\prod_{i=1}^n f(X_i - u)}{\int_{\mathbb{R}^k} \prod_{i=1}^n f(X_i - v) dv} du$$

(c) Montrer finalement que  $T^*$  est optimal pour  $w$ .

☞ Q4 Donner l'expression de  $T^*$  lorsque  $w(x - y) = \|x - y\|^2$ .

☞ Q5 Dans ce cas, que vaut  $T^*$  lorsque  $X_i \sim \mathcal{N}(\theta, 1)$  ?

Et lorsque  $X_i \sim \mathcal{U}_{[-\frac{1}{2}+\theta, \frac{1}{2}+\theta]}$  ?

### Corrigé de l'exercice 3

☞ Q1 Il suffit de poser  $c = -x_1$  dans la définition de l'équivariance.

☞ Q2 Le risque associé vérifie :

$$\begin{aligned}
 R_w(T, \theta) &= E_\theta[w(T - \theta)] \\
 &= \int_{(\mathbb{R}^k)^n} w(T(x_1, \dots, x_n) - \theta) \prod_{i=1}^n f(x_i - \theta) dx_i \\
 &= \int_{(\mathbb{R}^k)^n} w(T(x_1 - \theta, \dots, x_n - \theta)) \prod_{i=1}^n f(x_i - \theta) dx_i \\
 &= \int_{(\mathbb{R}^k)^n} w(T(u_1, \dots, u_n)) \prod_{i=1}^n f(u_i) du_i \\
 &= R_w(T, 0)
 \end{aligned}$$

en effectuant un changement de variable  $u_i = x_i - \theta$ .

☞ Q3 (a) Soit  $c \in \mathbb{R}^k$  ; on a

$$\begin{aligned}
 \psi(x + c) &= \int w(x + c - u) \prod_{i=1}^n f(X_i - u) du \\
 &= \int w(x - v) \prod_{i=1}^n f(X_i - c - v) dv
 \end{aligned}$$

en effectuant le changement de variable  $v = u - c$ .

En particulier  $\psi(x + X_1) = \int w(x - v) f(-v) \prod_{i=2}^n f((X_i - X_1) - v) dv$

Donc  $\psi(x + X_1)$  ne dépend que de  $x$  et des variables aléatoires  $X_2 - X_1, \dots, X_n - X_1$  : soit donc  $T_1$  tel que  $\arg \min_{x \in \mathbb{R}^k} \psi(x + X_1) = T_1(X_2 - X_1, \dots, X_n - X_1)$ .

Or  $\forall \phi, \forall c \in \mathbb{R}^k, \arg \inf (x \mapsto \phi(x + c)) = (\arg \inf (x \mapsto \phi(x))) - c$ .

Donc en définitive

$$T_1(X_2 - X_1, \dots, X_n - X_1) = (\arg \inf \psi) - X_1 = T^* - X_1$$

Autrement dit  $T^*$  est équivariant d'après la question précédente.

(b)

$$\begin{aligned}
 &E_\theta[\varphi(X_1, \dots, X_n) | X_2 - X_1 = y_2, \dots, X_n - X_1 = y_n] \\
 &= \int \varphi(x_1, x_1 + y_2, \dots, x_1 + y_n) d\mathbb{P}(X_1 = x_1 | X_2 - X_1 = y_2, \dots, X_n - X_1 = y_n) \\
 &= \int \varphi(x_1, x_1 + y_2, \dots, x_1 + y_n) \frac{f(x_1 - \theta) \prod_{i=2}^n f(x_1 + y_i - \theta)}{[\int f(x_1 - \theta) \prod_{i=2}^n f(x_1 + y_i - \theta) dx_1]} dx_1
 \end{aligned}$$

Effectuons le changement de variables  $u = \theta - x_1 + c$  ( $c$  constante quelconque) dans les deux intégrales :

$$E_\theta[\varphi(X_1, \dots, X_n) | X_2 - X_1 = y_2, \dots, X_n - X_1 = y_n]$$

$$= \int \varphi(c + \theta - u, c + y_2 + \theta - u, \dots) \frac{f(c - u) \prod_{i=2}^n f(c + y_i - u)}{\left[ \int f(c - u) \prod_{i=2}^n f(c + y_i - u) du \right]} du$$

La relation suivante est alors vraie pour tout  $c \in \mathbb{R}^k$  :

$$E_\theta[\varphi(X_1, \dots, X_n) | X_2 - X_1, \dots, X_n - X_1]$$

$$= \int \varphi(c + \theta - u, c + X_2 - X_1 + \theta - u, \dots) \frac{f(c - u) \prod_{i=2}^n f(c + X_i - X_1 - u)}{\left[ \int f(c - u) \prod_{i=2}^n f(c + X_i - X_1 - u) du \right]} du$$

elle est donc vraie aussi pour  $c = X_1$  :

$$E_\theta[\varphi(X_1, \dots, X_n) | X_2 - X_1, \dots, X_n - X_1]$$

$$= \int \varphi(X_1 + \theta - u, X_2 + \theta - u, \dots) \frac{\prod_{i=1}^n f(X_i - u)}{\left[ \int f(X_1 - u) \prod_{i=2}^n f(X_i - u) du \right]} du$$

- (c) Soit  $T$  un estimateur équivariant quelconque. On va montrer que  $T^*$  domine  $T$ . Pour cela, il suffit de prouver que  $R_w(T, 0) \geq R_w(T^*, 0)$ , selon le résultat de la question (2).

$$R_w(T, 0) = \mathbb{E}_0[w(T)]$$

$$= \mathbb{E}_0[\mathbb{E}_0[w(T) | X_2 - X_1, \dots, X_n - X_1]]$$

$$= \mathbb{E}_0 \left[ \int_{\mathbb{R}} w(T - u) \frac{\prod_{i=1}^n f(X_i - u)}{\int_{\mathbb{R}} \prod_{i=1}^n f(X_i - u) du} du \right]$$

Or par définition de  $T^*$ , pour tous  $x \in \mathbb{R}^n$  et  $t \in \mathbb{R}$

$$\int_{\mathbb{R}} w(T^*(x) - u) \prod_{i=1}^n f(x_i - u) du \leq \int_{\mathbb{R}} w(t - u) \prod_{i=1}^n f(x_i - u) du$$

donc

$$R_w(T, 0) \geq \mathbb{E}_0 \left[ \int_{\mathbb{R}} w(T^*(X) - u) \frac{\prod_{i=1}^n f(X_i - u)}{\int_{\mathbb{R}} \prod_{i=1}^n f(X_i - u) du} du \right]$$

$$= R_w(T^*, 0)$$

Donc  $T^*$  domine  $T$ .

☞ Q4 Si  $w(x - y) = \|x - y\|^2$ ,  $\psi$  vaut :

$$\psi(x) = \int_{\mathbb{R}^k} \|x - u\|^2 \prod_{i=1}^n f(X_i - u) du$$

et le gradient  $\psi'(x)$  vaut :  $\psi'(x) = \int_{\mathbb{R}^k} 2(x - u) \prod_{i=1}^n f(X_i - u) du$ .  $T^*$  est défini par l'équation  $\psi'(T^*) = 0$ , qui se réduit ici à :

$$T^* = \frac{\int_{\mathbb{R}^k} u \prod_{i=1}^n f(X_i - u) du}{\int_{\mathbb{R}^k} \prod_{i=1}^n f(X_i - u) du}$$



☞ Q5 Lorsque  $X_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ , on a

$$T^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Si  $X_i \sim \mathcal{U}(0, 1)$ , il vient

$$T^* = \frac{\min(X_i) + \max(X_i)}{2}$$

★  
★ ★

## Énoncé de l'exercice 4

On considère une loi multinomiale à  $K$  modalités ( $K \geq 3$ ) de probabilités  $p_1, p_2, \dots, p_K$ . On dispose de  $n$  observations indépendantes issues de cette loi. On notera  $N_k$  le nombre d'observations de la modalité  $k \in \llbracket 1, K \rrbracket$ .

On veut tester l'hypothèse :  $H_0 : "p_1 + p_2 = \frac{1}{2}"$

☞ Q1 Donner les estimateurs du maximum de vraisemblance contraints  $(\hat{p}_k^0)_k$  et non contraints  $(\hat{p}_k)_k$  de  $p_1, \dots, p_K$ .

☞ Q2 Calculer la statistique  $\xi^W$  du test de Wald de l'hypothèse  $H_0$ .

☞ Q3 (a) En constatant que  $\hat{p}_3^0$  est asymptotiquement efficace sous  $H_0$ , montrer que

$$\text{Cov}_{as}(\hat{p}_3^0, \hat{p}_3 - \hat{p}_3^0) = 0$$

et en déduire que

$$\mathbb{V}_{as}(\hat{p}_3 - \hat{p}_3^0) = \mathbb{V}_{as}(\hat{p}_3) - \mathbb{V}_{as}(\hat{p}_3^0)$$

(b) Calculer la loi limite de  $(\hat{p}_3^0 - p_3)$ , et en déduire  $\mathbb{V}_{as}(\hat{p}_3^0)$ .

(c) Donner un estimateur  $\widehat{\mathbb{V}_{as}(\hat{p}_3 - \hat{p}_3^0)}$  convergent sous  $H_0$  de  $\mathbb{V}_{as}(\hat{p}_3 - \hat{p}_3^0)$ .  
En déduire l'expression de la statistique du test d'Hausman de  $H_0$

$$\xi^H = n \frac{(\hat{p}_3 - \hat{p}_3^0)^2}{\widehat{\mathbb{V}_{as}(\hat{p}_3 - \hat{p}_3^0)}}$$

(d) Vérifier que le test d'Hausman est convergent.

(e) Montrer que les statistiques  $\xi^W$  et  $\xi^H$  sont asymptotiquement équivalentes sous  $H_0$ .

### Corrigé de l'exercice 4

☞ Q1 Les observations étant les effectifs  $N_k$  de chaque classe  $k \in \llbracket 1, K \rrbracket$ , la vraisemblance s'écrit

$$L_{N_1, \dots, N_K}(n_1, \dots, n_K; p_1, \dots, p_K) = \frac{n!}{n_1! \cdots n_K!} \prod_{k=1}^K p_k^{n_k} \quad \text{en notant } n = n_1 + \cdots + n_K$$

La maximisation sans hypothèse conduit aux conditions nécessaires du premier ordre, en n'omettant la contrainte  $p_1 + \cdots + p_K = 1$

$$\begin{aligned} \max_{p_1, \dots, p_K} & \left( \sum_{k=1}^K n_k \ln p_k \right) \\ \text{s.c. } & \{ p_1 + \cdots + p_K = 1 \end{aligned}$$

Le lagrangien associé s'écrit

$$\mathcal{L}(p_1, \dots, p_K, \lambda) = \sum_{k=1}^K n_k \ln p_k + \lambda \left( 1 - \sum_{k=1}^K p_k \right)$$

et il vient

$$\forall k \in \llbracket 1, K \rrbracket, \quad \frac{n_k}{\widehat{p}_k} - \lambda = 0$$

Or en sommant de 1 à  $K$  il vient

$$n = \sum_{k=1}^K n_k = \lambda \sum_{k=1}^K p_k = \lambda$$

de sorte que finalement

$$\forall k \in \llbracket 1, K - 1 \rrbracket, \quad \widehat{p}_k = \frac{n_k}{n}$$

(et on vérifie que cette condition est également suffisante).

La maximisation sous l'hypothèse  $H_0$  correspond au programme de maximisation sous contrainte

$$\begin{aligned} \max_{p_1, \dots, p_K} & \left( \sum_{k=1}^K n_k \ln p_k \right) \\ \text{s.c. } & \begin{cases} p_1 + \cdots + p_K = 1 \\ p_1 + p_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Le lagrangien associé s'écrit

$$\mathcal{L}(p_1, \dots, p_K, \lambda, \mu) = \sum_{k=1}^K n_k \ln p_k + \lambda \left( 1 - \sum_{k=1}^K p_k \right) + \mu \left( \frac{1}{2} - p_1 - p_2 \right)$$

et il vient

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_1} = \frac{n_1}{p_1} - \lambda - \mu \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_2} = \frac{n_2}{p_2} - \lambda - \mu \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_k} = \frac{n_k}{p_k} - \lambda, \quad \forall k \in \llbracket 3, K \rrbracket \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 1 - \sum_{k=1}^K p_k \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mu} = \frac{1}{2} - p_1 - p_2 \end{cases}$$

d'où finalement

$$\begin{cases} \widehat{p}_1^0 = \frac{n_1}{2(n_1+n_2)} \\ \widehat{p}_2^0 = \frac{n_2}{2(n_1+n_2)} \\ \widehat{p}_k^0 = \frac{n_k}{2(n_3+\dots+n_K)}, \quad \forall k \in \llbracket 3, K \rrbracket \end{cases}$$

⇒ Q2 Pour déterminer la statistique de Wald, appliquons le Théorème Central Limite à  $\begin{pmatrix} \widehat{p}_1 \\ \vdots \\ \widehat{p}_K \end{pmatrix}$ ;

pour ce faire, calculons tout d'abord sa variance.

On a en effet pour  $k \in \llbracket 1, K \rrbracket$ ,  $\widehat{p}_k = \frac{n_k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \in C_k}$  où  $C_k$  désigne la  $k$ -ième classe; or

$$\mathbb{V}(\mathbb{1}_{X_i \in C_k}) = p_k \cdot 1 - (p_k)^2 = p_k(1 - p_k)$$

et

$$\text{Cov}(\mathbb{1}_{X_i \in C_k}, \mathbb{1}_{X_j \in C_l}) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_{X_i \in C_k} \cdot \mathbb{1}_{X_j \in C_l}) - \mathbb{E}(\mathbb{1}_{X_i \in C_k})\mathbb{E}(\mathbb{1}_{X_j \in C_l}) = -p_k p_l \mathbb{1}_{i=j}$$

de sorte que

$$\sqrt{n} \begin{pmatrix} \widehat{p}_1 - p_1 \\ \vdots \\ \widehat{p}_K - p_K \end{pmatrix} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( 0, \begin{pmatrix} p_1(1-p_1) & -p_1 p_2 & \cdots & -p_1 p_K \\ -p_2 p_1 & p_2(1-p_2) & \cdots & -p_2 p_K \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -p_K p_1 & -p_K p_2 & \cdots & p_K(1-p_K) \end{pmatrix} \right)$$

Posons finalement  $g : \begin{pmatrix} \mathbb{R}^K & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x_1, \dots, x_K & \mapsto & x_1 + x_2 \end{pmatrix}$ ; alors d'après le théorème de Slutsky, si  $H_0$  est vraie on a

$$\begin{aligned} \sqrt{n} \left( \widehat{p}_1 + \widehat{p}_2 - \frac{1}{2} \right) &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( 0, \left( \frac{\partial g}{\partial p_1, \dots, p_K} \right)' \mathbb{V} \left( \begin{pmatrix} \widehat{p}_1 \\ \vdots \\ \widehat{p}_K \end{pmatrix} \right) \left( \frac{\partial g}{\partial p_1, \dots, p_K} \right) \right) \\ &= \mathcal{N} (0, (p_1 + p_2)(1 - p_1 - p_2)) \end{aligned}$$

d'où en centrant et en réduisant, puis en élevant au carré

$$\xi_n^W = n \frac{(\widehat{p}_1 + \widehat{p}_2 - \frac{1}{2})^2}{(\widehat{p}_1 + \widehat{p}_2)(1 - \widehat{p}_1 - \widehat{p}_2)} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_1^2$$

⇒ Q3 (a) On sait que  $\widehat{p}_3^0 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} p_3$  et que  $\widehat{p}_3 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} p_3$ .

Soit donc pour  $\lambda \in \mathbb{R}$   $p_3(\lambda) = \lambda \widehat{p}_3^0 + (1 - \lambda) \widehat{p}_3 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} p_3$ .

Alors

$$\begin{aligned} \mathbb{V}_{as}(p_3(\lambda)) &= \mathbb{V}_{as}\left(\widehat{p}_3^0 + \lambda\left(\widehat{p}_3^0 - \widehat{p}_3\right)\right) \\ &= \mathbb{V}_{as}\left(\widehat{p}_3^0\right) + 2\lambda\mathbb{Cov}_{as}\left(\widehat{p}_3^0, \widehat{p}_3^0 - \widehat{p}_3\right) + \lambda^2\mathbb{V}_{as}\left(\widehat{p}_3^0 - \widehat{p}_3\right) \\ &\geq \mathbb{V}_{as}\left(\widehat{p}_3^0\right) \end{aligned}$$

car  $\widehat{p}_3^0$  est asymptotiquement efficace, car sa variance est égale à la borne FDCR  $I(p_3)^{-1}$ .

Par conséquent le polynôme du second degré  $P(\mathbb{X}) = \mathbb{V}_{as}\left(\widehat{p}_3^0 - \widehat{p}_3\right)\mathbb{X}^2 + 2\mathbb{Cov}_{as}\left(\widehat{p}_3^0, \widehat{p}_3^0 - \widehat{p}_3\right)\mathbb{X}$  est de signe constant. En particulier,

$$\mathbb{Cov}_{as}\left(\widehat{p}_3^0, \widehat{p}_3^0 - \widehat{p}_3\right) = 0$$

et donc

$$\begin{aligned} \mathbb{V}_{as}\left(\widehat{p}_3\right) &= \mathbb{V}_{as}\left(\widehat{p}_3^0 - \left(\widehat{p}_3^0 - \widehat{p}_3\right)\right) \\ &= \mathbb{V}_{as}\left(\widehat{p}_3^0\right) + \mathbb{V}_{as}\left(\widehat{p}_3^0 - \widehat{p}_3\right) \end{aligned}$$

ce qui s'écrit encore

$$\mathbb{V}_{as}\left(\widehat{p}_3 - \widehat{p}_3^0\right) = \mathbb{V}_{as}\left(\widehat{p}_3\right) - \mathbb{V}_{as}\left(\widehat{p}_3^0\right)$$

(b) La loi asymptotique de  $\left(\widehat{p}_3 - \widehat{p}_3^0\right)$  se déduit de celle de  $\begin{pmatrix} \widehat{p}_1 \\ \vdots \\ \widehat{p}_K \end{pmatrix}$  déterminée précédemment.

Soit en effet  $g : \left( \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^K & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_K) & \mapsto & \frac{x_3}{2(1-x_1-x_2)} \end{array} \right)$ ; ainsi  $g\left(\widehat{p}_3\right) = \widehat{p}_3^0$ . Alors

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x_1}(p_1, \dots, p_K) &= \frac{p_3}{2(1-p_1-p_2)^2} \\ &= 2p_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x_2}(p_1, \dots, p_K) &= \frac{p_3}{2(1-p_1-p_2)^2} \\ &= 2p_3 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial g}{\partial x_3}(p_1, \dots, p_K) = 1$$

$$\frac{\partial g}{\partial x_k}(p_1, \dots, p_K) = 0, \quad \forall k \in \llbracket 3, K \rrbracket$$

Donc d'après le théorème de Slutsky

$$\begin{aligned}
\sqrt{n} \left( \widehat{p}_3^0 - p_3 \right) &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N} \left( 0, \begin{pmatrix} 2p_3 \\ 2p_3 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}' \begin{pmatrix} p_1(1-p_1) & -p_1p_2 & \cdots & -p_1p_K \\ -p_2p_1 & p_2(1-p_2) & \cdots & -p_2p_K \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -p_Kp_1 & -p_Kp_2 & \cdots & p_K(1-p_K) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2p_3 \\ 2p_3 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right) \\
&= \mathcal{N} \left( 0, \begin{pmatrix} 2p_3 \\ 2p_3 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}' \times \begin{pmatrix} 2p_3p_1(1-p_1) - 2p_1p_2p_3 - p_1p_3 \\ -2p_1p_2p_3 + 2p_3p_2(1-p_2) - p_2p_3 \\ -2p_3^2p_1 - 2p_3^2p_2 + p_3(1-p_3) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right) \\
&= \mathcal{N} \left( 0, \begin{cases} 4p_3^2p_1(1-p_1) - 4p_1p_2p_3^2 - 2p_1p_3^2 \\ -4p_1p_2p_3^2 + 4p_3^2p_2(1-p_2) - 2p_2p_3^2 \\ -2p_3^2p_1 - 2p_3^2p_2 + p_3(1-p_3) \end{cases} \right) \\
&= \mathcal{N} \left( 0, \begin{cases} [4p_1(1-p_1) - 4p_1p_2 - 2p_1 - 4p_1p_2 + \\ 4p_2(1-p_2) - 2p_2 - 2p_1 - 2p_2] p_3^2 \\ -p_3^2 + p_3 \end{cases} \right) \\
&= \mathcal{N} \left( 0, \{-4(p_1 + p_2)^2 p_3^2 - p_3^2 + p_3\} \right) \\
&= \boxed{\mathcal{N}(0, p_3(1-2p_3))} \quad \text{sous } H_0 : " p_1 + p_2 = \frac{1}{2} "
\end{aligned}$$

Ainsi  $\boxed{\mathbb{V}_{as}(\widehat{p}_3^0) = p_3(1-2p_3)}$ .

(c) On a

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}_{as}(\widehat{p}_3 - \widehat{p}_3^0) &= \mathbb{V}_{as}(\widehat{p}_3) - \mathbb{V}_{as}(\widehat{p}_3^0) \\
&= p_3(1-p_3) - p_3(1-2p_3) \\
&= \boxed{p_3^2}
\end{aligned}$$

Posons donc  $\widehat{\mathbb{V}}_{as}(\widehat{p}_3 - \widehat{p}_3^0) = \widehat{p}_3^2 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \mathbb{V}_{as}(\widehat{p}_3 - \widehat{p}_3^0)$ . On a par ailleurs

$$\begin{aligned}
\widehat{p}_3 - \widehat{p}_3^0 &= \frac{n_3}{n} - \frac{n_3}{2(n - n_1 - n_2)} \\
&= \frac{n_3}{n} \left( 1 - \frac{1}{2(1 - \frac{n_1}{n} - \frac{n_2}{n})} \right) \\
&= \widehat{p}_3 \left( 1 - \frac{1}{2(1 - \widehat{p}_1 - \widehat{p}_2)} \right) \\
&= \widehat{p}_3 \frac{1 - 2\widehat{p}_1 - 2\widehat{p}_2}{2 - 2\widehat{p}_1 - 2\widehat{p}_2}
\end{aligned}$$

de sorte que

$$\begin{aligned} \xi_n^H &= n \frac{\widehat{p}_3^2 \left( \frac{1-2\widehat{p}_1-2\widehat{p}_2}{2-2\widehat{p}_1-2\widehat{p}_2} \right)^2}{\widehat{p}_3^2} \\ &= \boxed{n \left( \frac{1-2\widehat{p}_1-2\widehat{p}_2}{2-2\widehat{p}_1-2\widehat{p}_2} \right)^2} \\ &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_1^2 \end{aligned}$$

(d) Si  $H_0$  est fausse, alors  $p_1 + p_2 \neq \frac{1}{2}$  et donc

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \xi_n^H &= \left( \frac{1-2\widehat{p}_1-2\widehat{p}_2}{2-2\widehat{p}_1-2\widehat{p}_2} \right)^2 \\ &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \left( \frac{p_1 + p_2 - \frac{1}{2}}{1 - p_1 - p_2} \right) \\ &> 0 \end{aligned}$$

de sorte que

$$\xi_n^H \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} (+\infty)$$

Ainsi, si  $H_0$  est fausse alors  $\mathbb{P} \left( \xi_n^H < q_{1-\alpha}^{\chi_1^2} \right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \mathbb{P} \left( (+\infty) < q_{1-\alpha}^{\chi_1^2} \right) = 0$  : le test d'Hausman est donc convergent.

(e) On a enfin

$$\begin{aligned} \frac{\xi_n^H}{\xi_n^W} &= \frac{n \left( \frac{1-2\widehat{p}_1-2\widehat{p}_2}{2-2\widehat{p}_1-2\widehat{p}_2} \right)^2}{n \frac{(\widehat{p}_1 + \widehat{p}_2 - \frac{1}{2})^2}{(\widehat{p}_1 + \widehat{p}_2)(1 - \widehat{p}_1 - \widehat{p}_2)}} \\ &= \frac{\widehat{p}_1 + \widehat{p}_2}{1 - \widehat{p}_1 - \widehat{p}_2} \\ &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} (1) \end{aligned}$$

Ainsi, les deux statistiques de test  $\xi_n^H$  et  $\xi_n^W$  sont asymptotiquement équivalentes.

★  
★ ★

### Énoncé de l'exercice 5

La mise en œuvre de nombreuses techniques d'analyse, et notamment la quasi-totalité des techniques d'estimation et de test de modèles statistiques, nécessitent d'engendrer des réalisations  $x$  d'une variable aléatoire réelle  $X$  de loi  $\mathcal{L}$  donnée.

L'objet de cet exercice est de présenter quelques techniques permettant à un ordinateur, machine essentiellement déterministe, d'engendrer de telles variables. Il s'agit donc de construire pour toute loi  $\mathcal{L}$  une fonction récursive  $f^{\mathcal{L}} : \mathbb{N} \rightarrow I$  qui énumère des réalisations d'un variable  $X \sim \mathcal{L}$ , i.e. telle que la distribution empirique des  $(f^{\mathcal{L}}(n))_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers la vraie distribution  $F^{\mathcal{L}}$ .

☞ Q1 Cherchons tout d'abord à engendrer une variable aléatoire **entière** uniforme.

Soit  $N \in \mathbb{N}^*$  et considérons  $\mathcal{L} = \mathcal{U}_{[0, N-1]}$ .

(a) Définissons pour  $\phi : [0, N-1] \rightarrow [0, N-1]$  et  $s \in [0, N-1]$

$$f_{\phi,s} : \begin{pmatrix} [0, N-1] & \rightarrow & [0, N-1] \\ t & \mapsto & \phi^t(s) \end{pmatrix}$$

Montrer que  $f_{\phi,s}$  est périodique à partir d'un certain rang ; on note  $T_{\phi,s}$  sa période.

En quel sens peut-on dire que  $f_{\phi,s}$  "génère" une variable uniformément distribuée sur  $[0, N-1]$  ?

(b) En quel sens peut-on dire que  $f_{\phi,s}$  est d'autant meilleure que  $T_{\phi,s}$  est grande ?

(c) Soient  $a \in [2, N-1]$ ,  $c \in [0, N-1]$  et  $p \in [2, N-1]$  et définissons  $\psi_{a,c,p} :$

$$\begin{pmatrix} \mathbb{N} & \rightarrow & [0, N-1] \\ n & \mapsto & (an + c) \bmod p \end{pmatrix}.$$

A quelles conditions  $f_{\psi_{a,c,p},s}$  est-elle un bon générateur uniforme sur  $[0, N-1]$  ?

☞ Q2 Cherchons à engendrer une variable aléatoire réelle uniforme sur  $[0, 1]$ .

(a) Soit  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in [0, 1]^{\mathbb{N}}$ , et définissons pour  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  continue et  $n \in \mathbb{N}^*$

$$S_n^x(f) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$$

On dit de  $x$  qu'elle vérifie le *critère de Weyl* si pour toute  $f$  continue

$$S_n^x(f) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f$$

Comment s'interprète ce critère ?

(b) Soit  $r \in \mathbb{R}$ , et définissons  $x = (\text{frac}(rk))_{k \in \mathbb{N}}$  où  $\text{frac}(u) = u - E(u) \in [0, 1[$  désigne la partie fractionnaire de  $u \in \mathbb{R}$ .

Montrer que  $x$  vérifie le critère de Weyl ssi  $r$  est irrationnel.

☞ Q3 On cherche désormais à engendrer des réalisations d'une variable aléatoire de loi quelconque.

(a) Soit  $\mathcal{L}$  la loi de densité  $f_{\mathcal{L}} = \frac{1}{3}\delta_1 + \frac{1}{4}\delta_2 + \frac{5}{12}\delta_3$ .

Tracer la fonction de répartition  $F_{\mathcal{L}}$  de  $\mathcal{L}$ .

En déduire son inverse généralisée

$$F^{-1} : \begin{pmatrix} [0, 1] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ s & \mapsto & \inf\{x \in \mathbb{R} / F_{\mathcal{L}}(x) \geq s\} \end{pmatrix}$$

Soit  $U \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$  et définissons  $X = F_{\mathcal{L}}^{-1}(U)$  ; quelle est la loi de  $X$  ?

- (b) Soit alors  $F_{\mathcal{L}}$  la fonction de répartition supposée continue et strictement croissante d'une loi  $\mathcal{L}$  quelconque.  
On définit de même  $X = F_{\mathcal{L}}^{-1}(U)$  pour  $U \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$ ; quelle est la loi de  $X$  ?
- (c) Proposer un algorithme qui génère des réalisations successives d'une variable  $X$  de loi exponentielle  $\mathcal{E}(\lambda)$  de densité  $f_{\mathcal{E}(\lambda)}(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{[0,+\infty[}(x)$  pour  $\lambda > 0$ .
- (d) Soit  $(X, Y) \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \sigma^2 I_2\right)$ .  
Soient  $R^2 = X^2 + Y^2$  et  $\theta = \arctan \frac{Y}{X}$ .  
Montrer que  $R^2$  et  $\theta$  sont indépendantes, et donner leurs lois.  
En déduire un algorithme de génération d'une variable gaussienne.
- (e) Même question si  $X$  suit une loi de Weibull  $\mathcal{W}(\alpha, \beta)$  de densité  $f_{\mathcal{W}(\alpha, \beta)}(x) = \alpha \beta x^{\beta-1} e^{-\alpha x^\beta} \mathbf{1}_{x \geq 0}$ .
- (f) Même question si  $X$  suit une loi de Poisson  $\mathcal{P}(\lambda)$  de densité  $f_{\mathcal{P}(\lambda)}(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ .  
On pourra comparer  $x_n = u_1 \times \dots \times u_n$ , où chaque  $u_n$  est une réalisation de  $U \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$ , à  $e^{-\lambda}$ .

## Corrigé de l'exercice 5

- ☞ Q1 (a) Comme  $\llbracket 0, N-1 \rrbracket \subsetneq \mathbb{N}$   $f_{\phi,s}$  n'est pas injective, soient  $i < j$  les deux premiers entiers tels que  $f_{\phi,s}(i) = f_{\phi,s}(j)$ , et posons  $T = j - i \geq 1$ . Alors  $f_{\phi,s}(i+T) = f_{\phi,s}(i)$ , donc  $f_{\phi,s}(i+1+T) = f_{\phi,s}(i+1)$  et par récurrence  $\forall k \geq i, f_{\phi,s}(k+T) = f_{\phi,s}(k)$  et donc  $f_{\phi,s}$  est périodique au-delà de  $i$ .  
Remarquons que la suite  $(f_{\phi,s}(k))_{k \in \mathbb{N}}$  est *déterministe* et pas aléatoire; il s'agit de déterminer si elle peut être la suite des *réalisations* d'une variable aléatoire uniformément distribuée sur  $\llbracket 0, N-1 \rrbracket$ .  
Définissons  $g(k) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} |\{i \in \mathbb{N} / y(i) = k\}|$  la fréquence empirique de  $k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$ ; alors  $f_{\phi,s}$  "génère" une variable distribuée selon la loi  $\mathcal{L}$  sur  $\llbracket 0, N-1 \rrbracket$  si la fréquence empirique de tout  $k$  est égale à sa probabilité selon  $\mathcal{L}$ .  
En particulier,  $f_{\phi,s}$  est uniformément distribuée ssi  $\forall k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket f_{\phi,s}(k) = \frac{1}{N-1}$ .
- (b) On a  $T \leq N$ : en effet pour tout  $a \in \mathbb{N}$ ,  $t \mapsto f_{\phi,s}(a+t)$  ne peut pas être injective de  $\llbracket 0, N \rrbracket$  vers  $\llbracket 0, N-1 \rrbracket$ , donc il existe  $i < j \in \llbracket 0, N \rrbracket$  tel que  $f_{\phi,s}(a+j) = f_{\phi,s}(a+i)$ , et par suite  $T_{\phi,s} \leq N$ .  
Or si  $T_{\phi,s} < N$ , alors  $f_{\phi,s}(\llbracket i, +\infty \rrbracket) = \{f_{\phi,s}(i), f_{\phi,s}(i+1), \dots, f_{\phi,s}(i+T_{\phi,s}-1)\}$ , donc  $|f_{\phi,s}(\llbracket i, +\infty \rrbracket)| \leq T_{\phi,s} < N$ , et donc  $f_{\phi,s}(\llbracket i, +\infty \rrbracket) \subsetneq \llbracket 0, N-1 \rrbracket$ . Ainsi l'un au moins des entiers de  $\llbracket 0, N-1 \rrbracket$  n'est plus jamais atteint au-delà de  $i$ , et sa fréquence empirique est donc nulle:  $f_{\phi,s}$  ne "génère" pas une loi uniforme sur  $\llbracket 0, N-1 \rrbracket$ .  
Remarquons réciproquement que si  $f_{\phi,s}$  est périodique de période exactement  $N$ , alors elle est uniforme.



Ainsi, un “bon générateur” de nombres pseudo-aléatoires sur  $\llbracket 0, N - 1 \rrbracket$  est périodique de période  $N$ .

- (c) Par définition de la division euclidienne,  $f_{\psi_{a,c,p,s}}$  est à valeur dans  $\llbracket 0, p - 1 \rrbracket$  donc pour qu'elle soit un bon générateur sur  $\llbracket 0, N - 1 \rrbracket$  il est nécessaire que  $p = N$ .

Par ailleurs dans  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  la suite  $(a^n)_{n \in \mathbb{N}}$  est périodique et sa période divise  $p$ . Donc si  $c = 0$  et si  $p$  est premier,  $f_{\psi_{a,c,p,s}}$  est de période 1 ou  $p$ , donc  $p$  (car  $a \geq 2$ ), et est donc un bon générateur uniforme sur  $\llbracket 0, N - 1 \rrbracket$  (en fait il suffit que  $p$  soit premier avec  $a$ , et il n'est pas nécessaire que  $c = 0$ ).

Ces générateurs ont été introduits par Lehmer et sont encore souvent utilisés<sup>12</sup>. On sait notamment que  $2^{31} - 1 = 2147483647$  est premier (vérifié par Euler en 1750), ainsi que  $2^{61} - 1$  (Pervouchine 1883) et  $2^{127} - 1$  (Lucas, 1876).<sup>13</sup>

- ☞ Q2 (a) Il s'agit d'une sorte de critère ergodique : la suite  $x$  est suffisamment “équi-répartie” et “équilibrée” pour que sommer aux points chargés par  $x$  ou sommer en tout point de  $[0, 1]$  soit équivalent.

- (b) Supposons que  $r$  est rationnel.

– Supposons tout d'abord que  $f_p = x \mapsto e^{2\pi i p x}$ ,  $p \in \mathbb{Z}$ . Par définition  $rk = \text{frac}(rk) + E(rk)$  et donc

$$\begin{aligned} S_n^x(f_p) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{2\pi i p x_k} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{(2p\pi i) rk} \text{ car } e^{(2p\pi i)E(rk)} = 1 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (e^{(2p\pi i)r})^k \end{aligned}$$

Comme  $r$  est irrationnel, si  $p \neq 0$ , alors  $e^{(2p\pi i)r} \neq 1$  et donc

$$\begin{aligned} S_n^x(f_p) &= \frac{1}{n} \frac{e^{(2p\pi i)r} - (e^{(2p\pi i)r})^{n+1}}{1 - e^{(2p\pi i)r}} \\ &= \frac{1}{n} e^{(2p\pi i)r \frac{n+1}{2}} \frac{\sin(\pi n r)}{\sin(\pi r)} \end{aligned}$$

et donc

$$|S_n^x(f_p)| \leq \frac{1}{n} \frac{1}{|\sin(\pi r)|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

soit

$$S_n^x(f_p) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} e^{2\pi i u} du$$

<sup>12</sup>cf Knuth, D.E., 1981 ; The Art of Computer Programming, Volume 2 Seminumerical Algorithms, Addison-Wesley, Reading Mass., 688 pages, ISBN 0-201-03822-6

<sup>13</sup>Parmi les nombres sous la forme  $2^n - 1$  seuls ceux où  $n \in \{2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 127\}$  sont premiers, et non pas seulement pour  $n \in \{2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257\}$  comme prétendu incorrectement par Marin Mersenne dans la préface de Cogitata Physica-Mathematica (1644). Parmi les  $2^{2^n} - 1$  courants en informatique, ceux pour  $n \in \{2, 3, 5, 7\}$  sont premiers.

- Lorsque  $p = 0$ , on a bien-sûr  $S_n^x(f_0) = 1 = \int_{[0,1]} f_0$ .
- Le résultat reste donc vrai par linéarité de l'intégrale pour tout polynôme trigonométrique.
  - Soit enfin  $f$  continue sur  $[0, 1]$ ; d'après le théorème de Dirichlet  $f$  est limite *uniforme* d'une suite  $(P_l)_{l \in \mathbb{N}}$  de polynômes trigonométriques. Donc

$$\begin{aligned}
 S_n^x(f) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \lim_{l \rightarrow \infty} P_l(x_k) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} S_{nb}^x(P_k) \quad \text{car la somme } \sum_{k=1}^n \text{ est finie} \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} P_l \quad \text{d'après le résultat précédent} \\
 &= \int_{[0,1]} \lim_{k \rightarrow \infty} P_l \quad \text{cqr la convergence de } (P_l)_{l \in \mathbb{N}} \text{ est uniforme} \\
 &= \int_{[0,1]} f
 \end{aligned}$$


ce qui achève la preuve.

Dans le cas en revanche où  $r = \frac{a}{b}$  est rationnel, alors  $(rk)_{k \in \mathbb{N}} = \{0, \frac{1}{b}, \dots, \frac{b-1}{b}\}$  : la suite  $x$  ne prend que  $b$  valeurs distinctes et le résultat est faux, par exemple lorsque  $f$  est la fonction affine par morceaux telle que

$$\begin{cases} f\left(\frac{k}{b}\right) = 1 \\ f\left(\frac{k+\frac{1}{2}}{b}\right) = 2 \end{cases}$$

car alors  $S_n^x(f) = 1 < \frac{3}{2} = \int_{[0,1]} f$ .

☞ Q3 (a) Le graphe de  $F_{\mathcal{L}}$  est le suivant :



On a donc

$$F_{\mathcal{L}}^{-1}(t) = \begin{cases} -\infty & \text{si } 0 = t \\ 1 & \text{si } 0 < t < \frac{1}{3} \\ 2 & \text{si } \frac{1}{3} \leq t < \frac{7}{12} \\ 3 & \text{si } \frac{7}{12} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

Par conséquent lorsque  $U \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$ ,  $X = F_{\mathcal{L}}^{-1}(U)$  ne charge positivement que  $\{1, 2, 3\}$  et on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = 1) &= \mathbb{P}\left(0 \leq U < \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} \\ \mathbb{P}(X = 2) &= \mathbb{P}\left(\frac{1}{3} \leq U < \frac{7}{12}\right) = \frac{4}{12} \\ \mathbb{P}(X = 3) &= \mathbb{P}\left(\frac{7}{12} \leq U < 1\right) = \frac{5}{12} \end{aligned}$$

de sorte que  $X \sim \mathcal{L}$ .

(b) On a pour tout  $t \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq t) &= \mathbb{P}(F_{\mathcal{L}}^{-1}(U) \leq t) \\ &= \mathbb{P}(U \leq F_{\mathcal{L}}(t)) \quad \text{car } F_{\mathcal{L}} \text{ est croissante} \\ &= F_{\mathcal{L}}(t) \quad \text{car } U \sim \mathcal{U}_{[0,1]} \end{aligned}$$

Par conséquent  $X \sim \mathcal{L}$ .

Remarquons que  $F_{\mathcal{L}}$  étant strictement croissante, c'est sa continuité qui nous assure qu'elle est bijective.

(c)

$$F_{\mathcal{E}(\lambda)}(u) = \int_0^u \lambda e^{-\lambda x} dx = (1 - e^{-\lambda u})$$

Soit donc  $U \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$ ; alors  $-\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U) \sim \mathcal{E}(\lambda)$ ; or par ailleurs  $(1 - U) \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$ , et donc  $-\frac{1}{\lambda} \ln(U) \sim \mathcal{E}(\lambda)$ .

On génère donc  $u_n$  réalisation de  $U \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$  et on renvoie  $x_n = -\frac{1}{\lambda} \ln(u_n)$ .

(d) Soit  $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^n$  absolument continue; alors

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(G(\mathbb{R}^2, \theta)) &= \int_{\mathbb{R}^2} G\left(x^2 + y^2, \arctan \frac{y}{x}\right) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} dy dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi]} G(\rho^2, \theta) \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} \rho d\rho d\theta \end{aligned}$$

par le changement de variables en coordonnées polaires<sup>14</sup>. En particulier si  $G$  est un

<sup>14</sup>Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow E$  mesurable absolument continue, et soit à calculer  $\int_{\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy$ .  
Posons

$$\phi : \left( \begin{array}{l} \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \\ \left( \begin{array}{l} x \\ y \end{array} \right) \mapsto \left( \begin{array}{l} x^2 + y^2 \\ \left\{ \begin{array}{l} \arctan(\frac{y}{x}) \quad \text{si } x > 0 \\ \arctan(\frac{y}{x}) + \pi \quad \text{si } x < 0 \end{array} \right\} \end{array} \right) \end{array} \right)$$

$\phi$  est différentiable et de jacobienne

$$Jac(\phi)_{(x,y)} = \left( \begin{array}{cc} 2x & 2y \\ -\frac{y}{x^2} \frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2} & \frac{1}{x} \frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2} \end{array} \right)$$

produit  $G(a, b) = G_1(a)G_2(b)$  alors

$$\mathbb{E} (G_1(R^2)G_2(\theta)) = \left( \frac{1}{\sigma^2} \int_{\mathbb{R}^+} \underbrace{G_1(\rho^2)e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} \rho}_{\text{ne dépend que de } \rho} d\rho \right) \left( \frac{1}{2\pi} \int_{[0,2\pi]} \underbrace{G_2(\theta)}_{\text{que de } \theta} d\theta \right)$$

Par conséquent, les variables  $R^2$  et  $\theta$  sont indépendantes.

En outre on a pour toute  $G_1$  absolument continue

$$\begin{aligned} \mathbb{E} (G_1(R^2)) &= \int_{\mathbb{R}^+} \frac{1}{\sigma^2} G_1(\rho^2) e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} \rho d\rho \\ &= \int_{\mathbb{R}^+} \frac{1}{2\sigma^2} G_1(u) e^{-\frac{1}{2\sigma^2}u} du \end{aligned}$$

et donc  $R^2 \sim \mathcal{E}(\frac{1}{2\sigma^2})$ .

Par ailleurs pour toute  $G_2$  absolument continue

$$\mathbb{E} (G_2(\theta)) = \int_{[0,2\pi[} G_2(\theta) \frac{1}{2\pi} d\theta$$

et donc  $\theta \sim \mathcal{U}_{[0,2\pi]}$

Pour générer une réalisation d'une variable qui suivrait la loi  $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ , on génère donc  $\frac{\theta_n}{2\pi}$  uniformément sur  $[0, 1]$  et  $r_n^2$  selon la loi  $\mathcal{E}(\frac{1}{\sigma^2})$  et on renvoie le nombre

$$x_n = m + \sqrt{r_n^2} \cos \left( 2\pi \left( \frac{\theta_n}{2\pi} \right) \right)$$

(e)

$$F_{\mathcal{W}(\alpha, \beta)}(y) = \int_0^y f_{\mathcal{W}(\alpha, \beta)}(x) dx = 1 - e^{-\alpha y^\beta}$$

et donc on génère  $u_n$  réalisation de  $U \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$  et on renvoie

$$x_n = \left( -\frac{1}{\alpha} \ln(u_n) \right)^{\frac{1}{\beta}}$$

(f) La densité  $f_{\mathcal{P}(\lambda)}$  s'écrit sur  $\mathbb{R}$  comme une somme infinie de masses de Dirac  $f_{\mathcal{P}(\lambda)}(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \delta_k(s)$  donc un algorithme consiste à générer  $u$  uniformément sur  $[0, 1]$  et à le placer dans l'un des intervalles  $[S_n, S_{n+1}[$  où  $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ .

donc de jacobien

$$|Jac(\phi)_{(x,y)}| = 2x \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} - 2y \left( -\frac{y}{x^2} \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \right) = 2$$

de sorte que

$$\int_{\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \int_{\phi(\mathcal{A})} f(\phi^{-1}(\rho^2, \theta)) 2 \left( \frac{1}{2} \rho d\rho \right) d\theta$$

Le calcul des  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  peut néanmoins être dissuasif en pratique ; il est possible en fait de s'en passer.

Soient en effet  $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}} \stackrel{iid}{\rightsquigarrow} \mathcal{E}(\mu)$  ; alors  $\forall n \in \mathbb{N}^*, Y_1 + \dots + Y_n \rightsquigarrow \Gamma(n, \mu)$  (voir TD 1, exercice 2 ), et donc

$$\mathbb{P}(Y_1 + \dots + Y_n > 1) = \int_{\frac{1}{\mu}}^{+\infty} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-t} dt$$

Définissons alors  $\nu(Y) = \min\{n / Y_1 + \dots + Y_n > 1\} - 1$  ; alors

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\nu(Y) = n) &= \mathbb{P}(Y_1 + \dots + Y_{n+1} > 1) - \mathbb{P}(Y_1 + \dots + Y_n > 1) \\ &= \int_{\frac{1}{\mu}}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} e^{-t} dt - \int_{\frac{1}{\mu}}^{+\infty} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{\mu^n n!} e^{-\frac{1}{\mu}} \end{aligned}$$

et donc  $\nu(Y) \rightsquigarrow \mathcal{P}\left(\frac{1}{\mu}\right)$ .

Ainsi, engendrer une loi de Poisson de paramètre  $\lambda$  revient à engendrer une succession de lois exponentielles d'espérance  $\frac{1}{\lambda}$ . Or  $\mathcal{E}\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \mathcal{W}\left(\frac{1}{\lambda}, 1\right)$  donc d'après la question précédente si  $U \rightsquigarrow \mathcal{U}_{[0,1]}$ , alors  $-\frac{1}{\lambda} \ln U \rightsquigarrow \mathcal{E}\left(\frac{1}{\lambda}\right)$ . Par conséquent posons  $U_i = 1 - e^{-\frac{1}{\lambda} Y_i}$  ;  $U_i$  est uniforme, et en outre

$$\begin{aligned} Y_1 + \dots + Y_n > 1 &\Leftrightarrow -\frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^n \ln U_k > 1 \\ &\Leftrightarrow U_1 \dots U_n > e^{-\lambda} \\ &\Leftrightarrow X_n > e^{-\lambda} \end{aligned}$$

où  $X_n = U_1 \dots U_n$

Définissons donc finalement  $N(X) = \min\{n / X_n < e^{-\lambda}\} - 1$  ; alors  $N(X) = \nu(X)$ , donc  $N(X) \rightsquigarrow \mathcal{P}(\lambda)$ .

Pour générer une loi  $\mathcal{P}(\lambda)$ , il suffit donc de générer une suite  $u_1, \dots, u_n, \dots$  uniformes sur  $[0, 1]$ , et de renvoyer le premier entier  $n - 1$  tel que  $u_1 \dots u_n > e^{-\lambda}$ .

Un tel algorithme s'écrit : <sup>15</sup>

- 1  $n \leftarrow 0$  et  $x \leftarrow 1$
- 2 Tant que  $x > e^{-\lambda}$
- 3 Générer  $u_n$  uniformément sur  $[0, 1]$
- 4  $x \leftarrow x \times u_n$  et  $n \leftarrow n + 1$
- 5 Renvoyer  $n$

★  
★ ★

<sup>15</sup>Pour un exposé plus complet, voir D. Knuth, *The Art of Computer Programming*, vol. 2, p 132.